



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>




1877

15


17.4

MA 73 of loose

QA
33
M55









GEOMETRIA

SPECIOSA.



GEOMETRIA

SPECIOSA.



3

AD MAIOREM DEI GLORIAM

•••••

GEOMETRIÆ SPECIOSÆ ELEMENTA

PRIMUM

De potestatibus, à radice binomia, & residua.

SECUNDVM

De innumerabilibus numerosis progressionibus.

TERTIVM

De quasi proportionibus.

QVARTVM

De rationibus logarithmicis.

QVINTVM

De proprijs rationum logarithmis.

SEXTVM

De innumerabilibus quadraturis.

•••••

PETRI MENGOLI

I. V. Ph. D. Coll. Patr. Bonon. Archigymn. Mechanici.

•••••

BONONIÆ, Typis Io. Baptistæ Ferrerij 1659.

Superiorum permissu.

⁴
Vidit Ouidius Montalbanus Philosophus Moralis, Mathe-
maticus, & Iurista: & vndequaq; speciosa, & dignissima
luce publica inuenit hæc Elementa, &c. Pro Reuerendis.
P. Inquisit. Bonon.

Vidit D. Inuentius Tortus Cler. Reg. S. Pauli, Poenit. pro
Illustris. & Reuerendis. D. D. Hieronymo, Boncompa-
gno Archiep. Bonon. & Princ.

Imprimatur.

Fr. Gulielmus Fochus Inquisitor Bonon.




REGESTVM.

abcdefghijklmnopqrst
vxyz. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz. Aaa Bbb Ccc.
Omnes sunt duerniones, præter k, quæ est ternio, & c, quæ
est semifol.

Hist. Sci.
Haber
1-18-27
14049

Amplissimo, & Integerrimo Viro
D. FERDINANDO RIARIO,

Marchioni Castilionis Orciæ, Patritio Veneto,
Senatori Bononiensi, Antiquiori, & Benemerito
Patri Patriæ: PETRVS MENGOLVS Felicitatem.



Eque Speciosæ Geometrię
pulchritudini, neque tui
Nominis claritati, quid-

1-16-40 Mch.

quam appositum existimo, Vir Am-
plissime; quòd istud, in illius fronte
præfulgeat. Ipsæ satis amabiles litte-
rarum cultoribus visæ sunt, vtraque
Geometria, Archimedis antiqua, &
Indiuisibilibium noua Bonauenturæ
Cauallerij Præceptoris mei, necnon
& Viettæ Algebra: quarum, non ex
confusione, aut mixtione, sed con-

6
iunctis perfectionibus, noua quæ-
dam, & propria laboris nostri species,
nemini poterit displicere. Tuæ verò
splēdor gloriæ, Mathematicas quan-
tascunque longè prætergreditur lu-
cubrations: & quacunque versum
prudētia regit fortunam, præclarif-
simos diffundit radios; tuaque dome-
stica sinceræ insinuat virtutis exem-
pla. Inter quæ, singulare illud, ad bo-
nas artes promouendas, tuæ officium
est prouidentia; sua cuique studia
consilio partiri, munificentia instrue-
re, augere fauoribus, & auctōritate
ad Magisterij decus, & perfectio-
nem perducere. Id quod ego exper-
tus hucusque sum ab adoleſcētia, tuæ

alumnus protectionis. Nam te sua-
 fore primùm, deinde (post Caualle-
 rium defunctum) etiam præceptore,
 scholasticus Mathematicus; te Ve-
 xillifero, professor publicus Arithme-
 tices, ante lauream; & post lauream,
 te nostri Archigymnasij modera-
 tore, ad nouam vsque cathedrã Me-
 chanicarum euectus: litterariam di-
 gnitatem, & fortunas omnes, tuis de-
 beo beneficijs. Hanc itaque meam
 Geometriam, grati erga te animi
 perpetuum statuo monumentum:
 tuorumque in me munerum aliqua-
 lem censum, in illius oblatione re-
 pẽdo. Feliciori longè successu, quàm
 cum alijs plerũque scriptoribus con-

tingit, furdís vota numinibus nuncu-
pare: tabellasque appendere; quarum
dij sui ne quidem titulos intelligant.
Tibi vni, me ipsum totum, volunta-
te pariter, & intellectu deditum, cre-
ditumque deuincio: qui si forte stu-
dijs Geometriæ quidquam adiece-
ro, proposito conueniens titulo, no-
uum videlicet, atque speciosum;
tuam postulo, & expecto, nostrorum
elementorum, benigna in susceptio-
ne, sententiam. Vale. Bononiæ
IX. Kal. Ianuarias MDCLX.



Lectori Elementario.



Ibi hunc librum scripsi, Lector, & Scholaris beneuole: ideoque nihil alienum sumpsi, præterquam ex prioribus nouem Elementis Euclidis. Vt huius libri beneficio utaris, tradam breuiter, sex faciliora quædam mathemata, singula pro singulis elementis, per quæ possis, lectos quosque titulos propositionum, numerosis exemplis confirmare, nostraque demonstrationes, arithmeticæ artis certitudine, præuenire.

Caput Primum.

Primum est, pro primo elemento: constructio potestatum cuiuslibet numeri binomij, vel residui. Est autem cuiusque numeri prima potestas, ipse numerus: secunda verò, est eiusdem numeri per se ipsum multiplicationis productus, quæ dicitur, quadratus: tertia, est productus primæ potestatis in secundam, quæ dicitur, cubus: quarta, est productus primæ potestatis in tertiam, quæ dicitur, quadroquadratus: quinta, est productus primæ potestatis in quartam: & sic deinceps in infinitum.

Potestates numerorum, vsque ad decimam, & vsque ad potestates denarij, sequens exhibet tabella.

Numerorum

Potestates.

<i>Prima</i>	<i>Secunda</i>	<i>Tertia</i>	<i>Quarta</i>	<i>Quinta</i>
2	4	8	16	32
3	9	27	81	243
4	16	64	256	1024
5	25	125	625	3125
6	36	216	1296	7776
7	49	343	2401	16807
8	64	512	4096	32768
9	81	729	6561	59049
10	100	1000	10000	100000

Numerorum

Potestates.

	<i>Sexta</i>	<i>Septima</i>	<i>Octava</i>
2	64	128	256
3	729	2187	6561
4	4096	16384	65536
5	15625	78125	390625
7	46656	279936	1679616
7	117649	823543	5764801
8	262144	2097152	16777216
9	531441	4782969	43046721
10	1000000	10000000	100000000

Numerorum

Potestates.

	<i>Nona</i>	<i>Decima</i>
2	512	1024
3	19683	59049
4	262144	1048576
5	1953125	9765625
6	10077696	60466176
7	40353607	282475249
8	134217728	1073741824
9	387420489	3486784401
10	1000000000	10000000000

Porro cum Francisco Vieta, alijsque placuerit Analytici, indeterminatum quemque determinabilem numerum, cuiusque priorem potestatem, cuiuspiam simplicis litteræ caractere significare: placuit consequenter, indeterminatas determinabiles eiusdem numeri potestates alias, eiusdem litteræ caractere significare, numeris dextrorsum adscriptis, indicantibus, quæque sit potestas. ut exempli gratia, cum indeterminati numeri determinabilis prima potestas fuerit notata caractere litteræ *t*; secunda potestas, caractere significabitur *t*²; tertia potestas, caractere *t*³; quarta, *t*⁴; quinta, *t*⁵; & sic deinceps. cum verò determinatus fuerit litteræ *t*, valor ternarius, 3: tunc determinatus erit characteris *t*², valor 9; characteris *t*³, valor 27; characteris *t*⁴, valor 81; characteris *t*⁵, valor 243; & sic deinceps.

Placuit etiam duorum indeterminatorum determinabili-
 lium numerorum potestatibus inuicem multiplicatis, pro-
 ductos, pariter indeterminatos & determinabiles nume-
 ros, iisdem characteribus producentiū significare deinceps
 conscriptis, vt ex multiplicatione a per r , productum ar ;
 & ex multiplicatione a_2 per r , productum a_2r , & ex mul-
 tiplicatione a per r_2 , productum ar_2 .

Quibus characteribus à Vietta, Herigonio, Beugrand
 penes Cauallerium, vſitatis, conuenientia nos adinueni-
 mus nomina. Nam productum ar , ex multiplicatione
 primarum potestatum a , & r , vocamus, Vnprimam: &
 productum a_2r , ex multiplicatione secundæ potestatis a ,
 per primam r , vocamus, Biprimam: productum verò ar_2 ;
 ex multiplicatione primæ a , per secundam r , vocamus,
 Vnifecundam: & a_3r , productum tertiæ a , per primam r ,
 vocamus, Triprimam: & a_2r_2 , secundæ a , per secun-
 dam r , Bifecundam: & ar_3 , primæ a , per tertiam r , Vni-
 tertiam: item a_4r , Quadriprimam: a_3r_2 , Trifecundam:
 a_2r_3 , Bitertiam: ar_4 , Vniquartam. & sic reliquas

a_5r , Quintiprimam.

a_3r_4 , Triquartam.

a_4r_2 , Quadrifecundam.

a_2r_5 , Biquintam.

a_3r_3 , Tritertiam.

ar_6 , Vnifextam.

a_2r_4 , Biquartam.

a_7r , Septimiprimam.

ar_5 , Vniquintam.

a_6r_2 , Sextifecundam.

a_6r , Sextiprimam.

a_5r_3 , Quintitertiam.

a_5r_2 , Quintifecundam.

a_4r_4 , Quadriquartam.

a_4r_3 , Quadrutertiam.

a_3r_5 , Triquintam.

*a*26, Bisextam.
*a*7, Vniseptimam.
*a*8r, Octauiprimam.
*a*7r2, Septimisecondam.
*a*6r3, Sextitertiam.
*a*5r4, Quintiquartam.
*a*4r5, Quadrinquintam.
*a*3r6, Trisextam.
*a*2r7, Bisepetimam.
*a*8, Vnioctauam.

*a*9r, Noniprimam.
*a*8r2, Octauisecondam.
*a*7r3, Septimitertiam.
*a*6r4, Sextiquartam.
*a*5r5, Quintiquintam.
*a*4r6, Quadrisextam.
*a*3r7, Triseptimam.
*a*2r8, Bioctauam.
*a*9, Vnionam.

Quare si litteræ *a*, taxatus fuerit valor 3, & litteræ *r*, valor 2; erit characteris *a* vniprimæ, valor 6, productus multiplicationis 3 per 2: erit deinde characteris *a*2, valor 9; & characteris *a*2r biprimæ, valor 18: item characteris *r*2, valor erit 4; & characteris *a*r2 vnisecondæ, valor 12: & sic deinceps.

Itaque sicut Euclides in 2. 8. numerosam triangularem tabulam instituit proportionalium ab vnitae, datisque minimis à humeris, datam inter se rationem habentibus: ita eadem methode, placuit litteratam triangularem tabulam disponere proportionalium characterum, à data vnitae, propositisque duobus indeterminatis determinabilibus numeris, indeterminatam inter se rationem habentibus. Pro caractere autem vnitatis, litteram *u* collocauimus, in vertice triangularis tabulæ, & pro indeterminatis determinabilibus numeris, duas litteras *a*, & *r*.

Placuit demum ijsdem Analyſtis, ex numero indeterminato, & determinabili (ſiue poteſtate, ſiue ex poteſtatibus producto) & ex determinato numero, per multiplicationem factum productum indeterminatum pariter atque determinabilem, eodem producentis caractere ſignificari, præſcripto numero multiplicationis. vt $3a2r$, triplum productum ſub ſecunda poteſtate numeri a , & ſub prima numeri r ; vel triplam biprimam: & $10a2r3$, decuplum productum ſub ſecunda poteſtate numeri a , & ſub tertia numeri r ; vel decuplam bitertiam. & ſic de reliquis.

Præter tabulam proportionalium prædictam, oportet aliam tabulam triangularem habere in promptu, quam Analyſtæ vocant, multiplicium tabulam: in qua unitates in vertice ordinantur, & in lateribus; in area verò numeri, quorum unuſquiſque inferioris baſis numerus, duorum, ſibi, quaſi cornua fronti, adiacentium ſuperioris baſis numerorum eſt aggregatum: vt ex ipſius tabulæ patebit lectura; quam exponimus extenſam, à vertice uſque ad decimam baſim.



psciffi; quadruplo producto sub
 clui, idest quadrupla triprima;
 statibus absciffi, & residui, idest
 iplo sub prima potestate abscif-
 quadrupla vnitertia; & ex quar-
 ue deinceps, quorum præstat
 ere, quàm voces legere, quibus

binomij $a+r$.

3.

$$+4ar^3+r^4.$$

$$2+10a^2r^3+5ar^4+r^5.$$

$$r^2+20a^3r^3+15a^2r^4+6ar^5$$

$$1a^5r^2+35a^4r^3+35a^3r^4$$

$$2+56a^5r^3+70a^4r^4+56a^3r^5$$

$$2+84a^6r^3+126a^5r^4+126a^4r^5+9a^8+r^9.$$

$$5a^8r^2+120a^7r^3+210a^6r^4+120a^5r^7+45a^2r^8+10ar^9$$

monstrabuntur per inductio-
 que litteræ valore.

Esto

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

I.

I. I.

I. 2. I.

I. 3. 3. I.

I. 4. 6. 4. I.

I. 5. 10. 10. 5. I.

I. 6. 15. 20. 15. 6. I.

I. 7. 21. 35. 35. 21. 7. I.

I. 8. 28. 56. 70. 56. 28. 8. I.

I. 9. 36. 84. 126. 126. 84. 36. 9. I.

I. 10. 45. 120. 210. 252. 210. 120. 45. 10. I.

Vtriſque tabulis proportionalium & multiplicium ita compositis, vt congruant, vertex
 vertici, latera lateribus, bases basibus æqueordinatis, & vt ſingulæ proportionales con-
 gruunt ſingulis multiplicibus; ſi vnaqueque proportionalium per congruentem numerum
 fuerit multiplicata; aliaque ſimilis tabula productorum fuerit ordinata: dicitur tabula no-
 minum: quæ ſequitur, pariter à vertice vſque ad decimam baſim extenſa.

Esto litteræ a , valor 2,
 litteræ r , valor 3.
 ideoque characteris $a+r$, valor 5.

a^2 :	4
$2ar$:	12
r^2 :	9

Secunda potestas à 5 : 25

a^3 :	8
$3a^2r$:	36
$3ar^2$:	54
r^3 :	27

Tertia potestas à 5 : 125

a^4 :	16
$4a^3r$:	96
$6a^2r^2$:	216
$4ar^3$:	216
r^4 :	81

Quarta potestas à 5 : 625

Residuus dicitur numerus, qui duorum inæqualium numerorum, relinquitur, à maiore, minore subtracto ; à quibus denominatur. vt numerus binarius, tunc residuus dicitur

tur, cum à quinario, ternario dempto, relictus fuerit; & à quinario atque ternario denominatus. Characterem autem residui numeri, placuit, ex characteribus totius & abscissi denotari, à quibus denominatur, lineola, interueniente, quæ signum est subtractionis posterioris characteris à priorè. vt $5 - 3$; valet perinde atque 2. Similiter si duo numeri, à quibus residuus denominatur, fuerint indeterminati, t maior, a minor, residuus characterè significabitur ex vtrisque $t - a$.

Itaque sicut $t - a$, prima sui ipsius potestas, fit ex nominibus t, a , in prima basi tabulæ nominum iacentibus; ita secunda potestas eiusdem residui $t - a$, fit ex nominibus in secunda basi, alternatim additis, & subtractis, $t^2 - 2ta + a^2$; tertia, ex nominibus, in tertia basi $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$; quarta, ex nominibus, in quarta basi $t^4 - 4t^3a + 6t^2a^2 - 4ta^3 + a^4$: & reliquæ deinceps potestates, fiunt similiter ex nominibus, in reliquis deinceps basibus iacentibus.

Huc pariter innumerabilia pertinent huiusmodi theoremata. Si à toto quodam maiore numero, quisque minor numerus abscissus fuerit: residui secunda potestas relinquitur, ex secunda potestate totius; dempto duplo producto sub toto & abscisso, idest, dempta dupla vni prima; addita secunda potestate abscissi: tertia potestas residui, relinquitur, ex tertia potestate totius; dempto triplo producto sub secunda potestate totius & sub prima abscissi, idest dempta tripla biprima; addito triplo producto sub prima
totius

totius & sub secunda abscissi, idest addita tripla vnitecunda; dempta tertia potestate abscissi: quarta residui, relinquitur, ex quarta totius; dempto quadruplo producto sub tertia totius, & sub prima abscissi, idest, dempta quadrupla triprima; addito sexcuplo producto sub secundis potestatibus totius & abscissi, idest, addita sexcupla bisecunda; dempto quadruplo producto sub prima totius, & sub tertia abscissi, idest dempta quadrupla vnitertia; addita quarta abscissi. aliaque similia, quorum præstat characteres oculis intueri, quàm voces legere.

Potestates residui t -- a.

Prima $t - a.$

Secunda $t^2 - 2ta + a^2.$

Tertia $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3.$

Quarta $t^4 - 4t^3a + 6t^2a^2 - 4ta^3 + a^4.$

Quinta $t^5 - 5t^4a + 10t^3a^2 - 10t^2a^3 + 5ta^4 - a^5.$

Sexta $t^6 - 6t^5a + 15t^4a^2 - 20t^3a^3 + 15t^2a^4 - 6ta^5 + a^6.$

Septima $t^7 - 7t^6a + 21t^5a^2 - 35t^4a^3 + 35t^3a^4 - 21t^2a^5 + 7ta^6 - a^7.$

Octaua $t^8 - 8t^7a + 28t^6a^2 - 56t^5a^3 + 70t^4a^4 - 56t^3a^5 + 28t^2a^6 - 8ta^7 + a^8.$

Nona $t^9 - 9t^8a + 36t^7a^2 - 84t^6a^3 + 126t^5a^4 - 126t^4a^5 + 84t^3a^6 - 36t^2a^7 + 9ta^8 - a^9.$

Decima $t^{10} - 10t^9a + 45t^8a^2 - 120t^7a^3 + 210t^6a^4 - 252t^5a^5 + 210t^4a^6 - 120t^3a^7 + 45t^2a^8 - 10ta^9 + a^{10}.$

24

Quæ similiter demonstrabuntur facile per inductionem, determinato cuiusque litteræ valore.

Esto litteræ t , valor 5.
 litteræ a valor 3.
 ideoque characteris $t-a$, valor 2.

$t^2:$	25	$2ta:$	30
$a^2:$	9		
	34		
	30		

Secunda potestas à 2: 4

$t^3:$	125	$3t^2a:$	225
$3ta^2:$	135	$a^3:$	27
	260		252
	252		

Tertia potestas à 2: 8

$t^4:$	625	$4t^3a:$	1500
$6t^2a^2:$	1350	$4ta^3:$	540
$a^4:$	81		
	2056		2040
	2040		

Quarta potestas à 2: 16

Si

Similibus exemplis potest confirmari, tota constructio-
nis potestatum ars, à binomijs, & residuis: quàm pro
quantitatibus omnifariam, in primo nostro elemento ple-
niùs ostendimus.

Caput 2.

Secundum, pro secundo est elemento: multifariam pro-
gressuorum regulares collectiones; in quibus præcipua
nostri inuenti pars est. Accipiatur quilibet numerus, cu-
ius abscindantur ordinatim vnitas, binarius, ternarius, &
deinceps quicunque numeri possunt abscindi, vt vel nume-
rus, vel saltem vnitas relinquatur: & residui vsque ad vni-
tatem, totidem saluentur, quot abscissi, singuli residui è re-
gione suorum abscissorum.

Placuit autem acceptum numerum vocare quantita-
tem totam, & significare littera *t*: eiusque potestates vo-
care totas; *t*₂, totam secundam; *t*₃, totam tertiam; *t*₄
totam quartam; & sic deinceps. placuit etiam acceptos ab-
scissos vocare quantitates abscissas, & significare littera *a*:
item abscissorum potestates, vocare abscissas; *a*₂, abscif-
sam secundam; *a*₃, abscissam tertiam; *a*₄, abscissam quar-
tam; & deinceps: residuos quoque placuit vocare, quanti-
tates residuas, & significare littera *r*: item residuorum po-
testates, vocare residuas; *r*₂, residuam secundam; *r*₃, re-
siduam tertiam; *r*₄, residuam quartam; & deinceps. de-
nique sub potestatibus cuiusque abscissæ, & suæ residuæ,
placuit productos denominare vt supra, *ar* vniprimas,
*a*₂*r* biprimas, *a*₂*r*₂ vnifsecundas, *a*₃*r* triprimas, *a*₂*r*₂ bi-
secun-

secundas, *ar*3 vnitertias, & sic deinceps.

Sed ecce tabula, in qua cuiusque numeri ab vnitatem vsque primùm ad 7. deinde vsque ad 10. pro vnaqualibet abscissa, scripta est è regione residua, & abscissa secunda, & vniprima, & residua secunda, & abscissa tertia, & biprima, & vnifecunda, & residua tertia, & sic deinceps vsque ad proportionales in decima basi tabulæ proportionalium iacentes.



<i>t</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>a2</i>	<i>ar</i>	<i>r2</i>	<i>a3</i>	<i>a2r</i>
2	1	1	1	1	1	1	1
3	1	2	1	2	4	1	2
	2	1	4	2	1	8	4
4	1	3	1	3	9	1	3
	2	2	4	4	4	8	8
	3	1	9	3	1	27	9
5	1	4	1	4	16	1	4
	2	3	4	6	9	8	12
	3	2	9	6	4	27	18
	4	1	16	4	1	64	16
6	1	5	1	5	25	1	5
	2	4	4	8	16	8	16
	3	3	9	9	9	27	27
	4	2	16	8	4	64	32
	5	1	25	5	1	125	25
7	1	6	1	6	36	1	6
	2	5	4	10	25	8	20
	3	4	9	12	16	27	36
	4	3	16	12	9	64	48
	5	2	25	10	4	125	50
	6	1	36	6	1	216	36

t	ar_2	r_3	a_4	a_{3r}	a_{2r_2}	a_{r_3}
2	1	1	1	1	1	1
3	4	8	1	2	4	8
	2	1	16	8	4	2
4	9	27	1	3	9	27
	8	8	16	16	16	16
	3	1	81	27	9	3
5	16	64	1	4	16	64
	18	27	16	4	36	54
	12	8	81	54	36	24
	4	1	256	64	16	4
6	25	125	1	5	25	125
	32	64	16	32	64	128
	27	27	81	81	81	81
	16	8	256	128	64	32
	5	1	625	125	25	5
7	36	216	1	6	36	216
	50	125	16	40	100	250
	48	64	81	108	144	192
	36	27	256	192	144	108
	20	8	625	250	100	40
	6	1	1296	216	36	6

r	$r4$	$a5$	$a4r$	$a3r2$	$a2r3$	$ar4$
2	I	I	I	I	I	I
3	16	I	2	4	8	16
	I	32	16	8	4	2
4	81	I	3	9	27	81
	16	32	32	32	32	32
	I	243	81	27	9	3
5	256	I	4	16	64	256
	81	32	48	72	108	162
	16	243	162	108	72	48
	I	1024	256	64	16	4
6	625	I	5	25	125	625
	256	32	64	128	256	512
	81	243	243	243	243	243
	16	1024	512	256	128	64
	I	3125	625	125	25	5
7	1296	I	6	36	216	1296
	625	32	80	200	500	1250
	256	243	324	432	576	768
	81	1024	768	576	432	324
	16	3125	1250	500	200	80
	I	7776	1296	216	36	6

t	r_5	a_6	a_5r	a_4r^2	a_3r^3
2	I	I	I	I	I
3	3^2 I	I 64	2 32	4 16	8 8
4	243 3^2 I	I 64 729	3 64 243	9 64 81	27 64 27
5	1024 243 3^2 I	I 64 729 4096	4 96 486 1024	16 144 324 256	64 216 216 64
6	3125 1024 243 3^2 I	I 64 729 4096 15625	5 128 729 2048 3125	25 256 729 1024 625	125 512 729 512 125
7	7776 3125 1024 243 3^2 I	I 64 729 4096 15625 46656	6 160 972 3072 6250 7776	36 400 1296 2304 2500 1296	216 1000 1728 1728 1000 216

	a2r4	a75	r6	a7	a6r
2	I	I	I	I	I
3	16 4	32 2	64 1	I 128	2 64
4	81 64 9	243 64 3	729 64 1	I 128 2187	3 128 729
5	256 324 144 16	1024 486 96 4	4096 729 64 1	I 128 2187 16384	4 192 1458 4096
6	625 1024 729 256 25	3125 2048 729 128 5	15625 4096 729 64 1	I 128 2187 16384 78125	5 256 2187 8192 15625
7	1296 2500 2304 1296 400 36	7776 6250 3072 972 160 6	46656 15625 4096 729 64 1	I 128 2187 16384 78125 279936	6 320 2916 12288 31250 46656

	4512	4413	4314	4215	4116
2	1	1	1	1	1
3	4 32	8 16	16 8	32 4	64 2
4	9 128 243	27 128 81	81 128 27	243 128 9	729 128 3
5	16 288 972 1024	64 432 648 256	256 648 432 64	1024 972 288 16	4096 1458 192 4
6	25 512 2187 4096 3125	125 1024 2187 2048 625	625 2048 2187 1024 125	3125 4096 2187 512 25	15625 8192 2187 256 5
7	36 800 3888 9216 12500 7776	216 2000 5184 6912 5000 1296	1296 5000 6912 5184 2000 216	7776 12500 9216 3888 800 36	46656 31250 12288 2916 320 6

	17	28	47r	66r2	85r3
2	I	I	I	I	I
3	128	I	2	4	8
	I	256	128	64	32
4	2187	I	3	9	27
	128	256	256	528	256
	I	6561	2187	729	243
5	16384	I	4	16	64
	2187	256	384	576	864
	128	6561	4374	2916	1944
	I	65536	16384	4096	1024
6	78125	I	5	25	125
	16384	256	512	1024	2048
	2187	6561	6561	6561	6561
	128	65536	32768	16384	8192
	I	390625	78125	15625	3125
7	279936	I	6	36	216
	78125	256	640	1600	4000
	16384	6561	8748	11664	15552
	2187	65536	49152	36864	27648
	128	390625	156250	62500	25000
	I	1679616	279936	46656	7776

	a4r4	a3r5	a2r6	ar7	r8
2	I	I	I	I	I
3	16 16	32 8	64 4	128 2	256 I
4	81 256 81	243 256 27	729 256 9	2187 256 3	6561 256 I
5	256 1296 1296 256	1024 1944 864 64	4096 2916 576 16	16384 4374 384 4	65536 6561 256 I
6	625 4096 6561 4096 625	3125 8192 6561 2048 125	15625 16384 6561 1024 25	78125 32768 6561 512 5	390625 65536 6561 256 I
7	1296 10000 20736 20736 10000 1296	7776 25000 27648 15552 4000 216	46656 62500 36864 11664 1600 36	279936 156250 49152 8748 640 6	1679616 390625 65536 6561 256 I

	a9	a8r	a7r2	a6r3
2	I	I	I	I
3	I 512	2 256	4 128	8 64
4	I 512 19683	3 512 6561	9 512 2187	27 512 729
5	I 512 19683 262144	4 768 13122 65536	16 1152 8748 16384	64 1728 5832 4096
6	I 512 19683 262144 1953125	5 1024 19683 131072 390625	25 2048 19683 65536 78125	125 4096 19683 32768 15625
7	I 512 19683 262144 1953125 10077696	6 1280 26244 196608 781250 1679616	36 3200 34992 147456 312500 279936	216 8000 46656 110592 125000 46656

	a5r4	a4r5	a3r6	a2r7	ar8
3	I	I	I	I	I
3	16	32	64	128	256
	32	16	8	4	2
4	81	243	729	2187	6561
	512	512	512	512	512
	243	81	27	9	3
5	256	1024	4096	16384	65536
	2592	3888	5832	8748	13122
	3888	2592	1728	1152	768
	1024	256	64	16	4
6	625	3125	15625	78125	390625
	8192	16384	32768	65536	131072
	19683	19683	19683	19683	19683
	16384	8192	4096	2048	1024
	3125	625	125	25	5
7	1296	7776	46656	279936	1679616
	20000	50000	125000	312500	781250
	62208	82944	110592	147456	196608
	82944	62208	46656	34992	26244
	50000	20000	8000	3200	1280
	7776	1296	216	36	6

	r9	410	497	4872
2	I	I	I	I
3	512 I	I 1024	2 512	4 256
4	19683 512 I	I 1024 59049	3 1024 19683	9 1024 6561
5	262144 19683 512 I	I 1024 59049 1048576	4 1536 39366 262144	16 2304 26244 65536
6	1953125 262144 19683 512 I	I 1024 59049 1048576 9765625	5 2048 59049 524288 1953125	25 4096 59049 262144 390625
7	10077696 1953125 262144 19683 512 I	I 1024 59049 1048576 9765625 60466176	6 2560 78732 786432 3906250 10076696	36 6400 104976 589824 1562500 1679616

	a7r3	a6r4	a5r5	a46r
2	I	I	I	I
3	8 128	16 64	32 32	64 16
4	27 1024 2187	81 1024 729	243 1024 243	729 1024 81
5	64 3456 17496 16384	256 5184 11664 4096	1024 7776 7776 1024	4096 11664 5184 256
6	125 8192 59049 131072 78125	625 16384 59049 65536 15625	3125 32768 59049 32768 3125	15265 65536 59049 16384 625
7	216 16000 139968 442368 625000 279936	1296 40000 186624 331776 250000 46656	7776 100000 248832 248832 100000 7776	46656 250000 331776 186624 40000 1296

	4377	4278	419	110
2	I	I	I	I
3	128 8	256 4	512 2	1024 I
4	2187 1024 27	6561 1024 9	19683 1024 3	59049 1024 I
5	16384 17496 3456 64	65536 26244 2304 16	262144 39366 1536 4	1048576 59049 1024 I
6	78125 131072 59049 8192 125	390625 262144 59049 4096 25	1953125 524288 59049 2048 5	9765625 1048576 59049 1024 I
7	279936 625000 442368 139968 16000 216	1679616 1562500 589824 104976 6400 36	10077696 3906250 786432 78732 2560 6	60466176 9765625 1048576 59049 1024 I

f 2

Sequitur Ta-

40

Sequitur Tabula pro numeris 8, 9, & 10.

t	a	r	a ₂	ar	r ²	a ₃	a ₂ r
8	1	7	1	7	49	1	7
	2	6	4	12	36	8	24
	3	5	9	15	25	27	45
	4	4	16	16	16	64	64
	5	3	25	15	9	125	75
	6	2	36	12	4	216	72
	7	1	49	7	1	343	49
9	1	8	1	8	64	1	8
	2	7	4	14	49	8	28
	3	6	9	18	36	27	54
	4	5	16	20	25	64	80
	5	4	25	20	16	125	100
	6	3	36	18	9	216	108
	7	2	49	14	4	343	98
	8	1	64	8	1	512	64
10	1	9	1	9	81	1	9
	2	8	4	16	64	8	32
	3	7	9	21	49	27	63
	4	6	16	24	36	64	96
	5	5	25	25	25	125	125
	6	4	36	24	16	216	144
	7	3	49	21	9	343	147
	8	2	64	16	4	512	128
	9	1	81	9	1	729	81

	ar2	r3	44	43r	42r2	ar3
8	49	343	1	7	49	343
	72	216	16	48	144	432
	75	129	81	135	225	375
	64	64	256	256	256	256
	45	27	625	375	225	135
	24	8	1296	432	144	48
	7	1	2401	343	49	7
9	64	512	1	8	64	512
	98	343	16	56	196	686
	108	216	81	162	324	648
	100	125	256	320	400	500
	80	64	625	500	400	320
	54	27	1296	648	324	162
	28	8	2401	686	196	56
	8	1	4096	512	64	8
10	81	729	1	9	81	729
	128	512	16	64	256	1024
	147	343	81	189	441	1029
	144	216	256	384	576	864
	125	125	625	625	625	625
	96	64	1296	864	576	384
	63	27	2401	1029	441	189
	32	8	4096	1024	256	64
	9	1	6561	729	81	9

	74	45	44r	43r2	42r3	41r
8	2401	1	7	49	343	2401
	1296	32	96	288	864	2592
	625	243	405	675	1125	1875
	256	1024	1024	1024	1024	1024
	81	3125	1875	1125	675	405
	16	7776	2592	864	288	96
	1	16807	2401	343	49	7
9	4096	1	8	64	512	4096
	2401	32	112	392	1372	4802
	1296	243	486	972	1944	3888
	625	1024	1280	1600	2000	2500
	256	3125	2500	2000	1600	1280
	81	7776	3888	1944	972	486
	16	16807	4802	1372	392	112
	1	32768	4096	512	6	8
10	6561	1	9	81	729	6561
	4096	32	128	512	2048	8192
	2401	243	567	1323	3087	7203
	1296	1024	1536	2304	3456	5184
	625	3125	3125	3125	3125	3125
	256	7776	5184	3456	2304	1536
	81	16807	7203	3087	1323	567
	16	32768	8192	2048	512	128
	1	59049	6561	729	81	9

	rs	as	asr	asr2	43 asr3
8	16807	I	7	49	343
	7776	64	192	576	1728
	3125	729	1215	2025	3375
	1024	4096	4096	4096	4096
	243	15625	9375	5625	3375
	32	46656	15552	5084	1728
	I	117649	16807	401	343
9	32768	I	8	64	512
	16807	64	224	784	2744
	7776	729	1458	2916	5832
	3125	4096	5120	6400	8000
	1024	15625	12500	10000	8000
	243	46656	2338	11664	5832
	32	117649	33614	9604	2744
	I	262144	32768	4096	512
10	59049	I	9	81	729
	32768	64	256	1024	4096
	16807	729	1701	3969	9261
	7776	4096	6144	9216	13824
	3125	15625	15625	15625	15625
	1024	46656	31104	20736	13824
	243	117649	50421	21609	9261
	32	262144	65536	16384	4096
	I	531441	59049	6561	729

			1
			21
			1638
			7812
			= 7993
			82354
			1
			123
			= 187
			= 384
			- 8125
			= - 236
			= - 43
			= - 52

a5r2 a4r3 a3r4 a2r5 ar6 r7

49	343	2401	16807	117649	823543
1152	3456	10168	31104	93312	279936
6075	10125	16875	28125	46875	78125
16384	16384	16384	16384	16384	16384
28125	16875	10125	6075	3645	2187
31104	10168	3456	1152	384	128
16807	2401	343	49	7	1

64	512	4096	32768	262144	2097152
1568	5488	19208	67228	235298	823543
8748	17496	34992	69984	139968	279936
25600	32000	40000	50000	62500	78125
50000	10000	32000	25600	20480	16384
6	992	17496	8748	4374	2187
	108	5488	1568	448	128
	996	512	64	8	1

	729	6561	59049	531441	4782969
		2768	131072	521288	2097152
		1827	151263	352947	823543
		944	124416	186624	279936
		125	78125	78125	78125
		96	36864	24576	16384
		83	11907	5103	2187
		92	2048	512	128
		29	81	9	1

	2	4	5	6	7	8
8	2401	16807	117649		1	7
	5084	15552	46656		128	384
	5625	9375	15625		2187	365
	4096	4096	4096		16384	16384
	2025	1215	729		78125	46875
	576	192	64		279936	93312
	49	7	1		823543	117649
9	4096	32768	262144		1	8
	9604	33614	117649		128	448
	11664	23328	46656		2187	4374
	10000	12500	15625		16384	20480
	6400	5120	4096		78125	62500
	2916	1458	729		279936	139968
	784	224	64		823543	235298
	64	8	1		2097152	262144
10	6561	59049	531441		1	9
	16384	65536	262144		128	512
	21609	50421	117649		2187	5103
	20736	31104	46656		16384	24576
	15625	15625	15625		78125	78125
	9216	6144	4096		279936	186624
	3969	1701	729		823543	352947
	1024	256	64		2097152	524288
	81	9	1		4782969	531441

	a5r2	a4r3	a3r4	a2r5	a1r6	r7
8	49	343	2401	16807	117649	823543
	1152	3456	10168	31104	93312	279936
	6075	10125	16875	28125	46875	78125
	16384	16384	16384	16384	16384	16384
	28125	16875	10125	6075	3645	2187
	31104	10168	3456	1152	384	128
	16807	2401	343	49	7	1
9	64	512	4096	32768	262144	2097152
	8568	5488	19208	67228	235298	823543
	8748	17496	34992	69984	139968	279936
	25600	32000	40000	50000	62500	78125
	50000	40000	32000	25600	20480	16384
	69984	34992	17496	8748	4374	2187
	67228	19208	5488	1568	448	128
	32768	4096	512	64	8	1
10	81	729	6561	59049	531441	4782969
	2048	8192	32768	131072	521288	2097152
	11907	27783	64827	151263	352947	823543
	36864	55296	82944	124416	186624	279936
	78125	78125	78125	78125	78125	78125
	124416	82944	55296	36864	24576	16384
	151263	64827	27783	11907	5103	2187
	131072	32768	8192	2048	512	128
	59049	6561	729	81	9	1

	a7r3	a6r4	a5r5	a46r
2	I	I	I	I
3	8 128	16 64	32 32	64 16
4	27 1024 2187	81 1024 729	243 1024 243	729 1024 81
5	64 3456 17496 16384	256 5184 11664 4096	1024 7776 7776 1024	4096 11664 5184 256
6	125 8192 59049 131072 78125	625 16384 59049 65536 15625	3125 32768 59049 32768 3125	15265 65536 59049 16384 625
7	216 16000 139968 442368 625000 279936	1296 40000 186624 331776 250000 46656	7776 100000 248832 248832 100000 7776	46656 250000 331776 186624 40000 1296

<i>r</i>	4377	4378	4379	4380
2	I	I	I	I
3	128 8	256 4	512 2	1024 I
4	2187 1024 27	6561 1024 9	19683 1024 3	59049 1024 I
5	16384 17496 3456 64	65536 26244 2304 16	262144 39366 1536 4	1048576 59049 1024 I
6	78125 131072 59049 8192 125	390625 262144 59049 4096 25	1953125 524288 59049 2048 5	9765625 1048576 59049 1024 I
7	279936 625000 442368 139968 16000 216	1679616 1562500 589824 104976 6400 36	10077696 3906250 786432 78732 2560 6	60466176 9765625 1048576 59049 1024 I

f 2 Sequitur Ta-

t	a8	a7r	a6r2	a5r3	a4r4
8	I 256 6561 65536 390625 1679616 5764801	7 768 10935 65536 234375 559872 823543	49 2304 18225 65536 140625 186624 117649	343 6912 30375 65536 84375 61008 16807	2401 19936 50625 65536 50625 19936 2401
9	I 256 6561 65536 390625 1679616 5764801 16777216	8 896 13122 81920 312500 839808 1647086 2097152	64 3136 26244 102400 250000 419904 470596 262144	512 10976 52488 128000 200000 209952 134456 32768	4096 38+16 104976 160000 160000 104976 38+16 4096
10	I 256 6561 65536 390625 1679616 5764801 16777216 43046721	9 1024 15309 98304 390625 1119744 2470629 4194304 4782969	81 4096 35721 147456 390625 746496 1058841 1048576 531441	729 16384 83349 221184 390625 497664 453789 262144 59049	6561 65536 194481 331776 390625 331776 194481 65536 6561

	43r5	42r6	41r7	47 r8
8	16807 61008 84375 65536 30375 6912 343	117649 186624 140625 65536 18225 2304 49	823543 559872 234375 65536 10935 768 7	5764801 1679616 390625 65536 6561 256 1
9	32768 134456 209952 200000 128000 52488 10976 12	262144 470596 419904 250000 102400 26244 3136 64	2097152 1647086 839808 312500 81920 13122 896 8	16777216 5764801 1679616 390625 65536 6561 256 1
10	59049 262144 453789 497664 390625 221184 83349 16384 729	531441 1048576 1058841 746496 390625 147456 35721 4096 81	4782969 4194304 2470629 1119744 390625 98304 15309 1924 9	43046721 16777216 5764801 1679616 390625 65536 6561 256 1

48

	a9	a8r	a7r2	a6r3
8	1 512 19683 262144 1953125 10077696 40353607	7 1536 32805 262144 1171875 3349232 5764861	49 6408 54675 262144 703125 1119744 823543	343 13824 91125 262144 421875 366048 117649
9	1 512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728	8 1792 39386 327680 1562500 5038848 11529602 16777216	64 6272 78732 409600 1250000 2519424 3294172 2097152	512 21952 157464 512000 1000000 1259712 941192 262144
10	1 512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728 387420489	9 2048 45927 393216 1953125 6718464 17294403 33554432 43046721	81 8192 107163 589824 1953125 4478976 7411887 8388608 4782969	729 32768 250047 884736 1953125 2985984 317653 2097152 53141

45r4

	45r4	44r5	43r6	42r7	4r8
8	2401 39872 151875 262144 253125 124416 16807	16807 124416 253125 262144 151875 39872 2401	117519 366048 421875 262144 91125 13824 343	823543 1119744 703125 262144 54675 4608 49	5764861 3349232 1171875 262144 32805 1536 7
9	4096 76832 314928 640000 800000 629856 268912 32768	32768 268912 629856 800000 640000 314928 76832 4096	262144 941192 1259712 1000000 512000 157464 21952 512	2097152 3294172 2519424 1250000 409600 78732 6272 64	16777216 11529602 5038848 1562500 327680 39366 1792 8
10	6561 131072 583443 1327104 1953125 199656 1361367 524288 59049	59049 524288 1361367 1990656 1953125 1327104 583443 131072 6561	531441 2097152 3176523 2985984 1953125 884736 250047 32768 729	4782969 8388603 7411887 4478976 1953125 589824 107163 8192 81	43046721 33554432 17294403 6718464 1953125 393216 45927 2048 9

	19	410	491	482
8	40353607 10077696 1953125 262144 19683 512 1	1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249	7 3072 98415 1048576 5859375 20155392 40353607	49 9216 164025 1048576 3515625 6698464 5764861
9	134217728 40353607 10077696 1953125 262144 19683 512 1	1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824	8 3584 118098 1310720 7812500 30233088 80707214 134217728	64 12544 236196 1638400 6250000 15116544 23059204 16777216
10	387420489 134217728 40353607 10077696 1953125 262144 19683 512 1	1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 3486784401	9 4096 137781 1572864 9765625 40310784 121060821 268433456 387420489	81 16384 321489 2359296 9765625 26873856 51883209 67108864 43046721

	a7r3	a6r4	a5r5	a4r6
8	343	2401	16807	117649
	27648	79744	248832	746496
	273375	455625	759375	1265625
	1048576	1048576	1048576	1048576
	2109375	1265625	759375	455625
	2196288	746496	248832	79744
	823543	117649	16807	2401
9	512	4096	32768	262144
	43904	153664	537824	1882384
	472392	944784	1889566	3779136
	2048000	2560000	3200000	4000000
	5000000	4000000	3200000	2560000
	7558272	3779136	1889566	944784
	6588344	1882384	537824	153664
	2097152	262144	32768	4096
10	729	6561	59049	531441
	65536	262144	1048576	4194304
	750141	1750329	4084101	9529569
	3538944	5303416	7962624	11943936
	9765625	9765625	9765625	9765625
	17915904	11943936	7962624	5308416
	22235661	9529569	4084101	1750329
	16777216	4194304	1048576	262144
	4782969	531441	59049	6561

	43r7	43r8	4r9	r10
8	823543 2196288 2109375 1048576 164025 9216 49	5764861 6698464 3515625 1048576 164025 9216 49	40353607 20155392 5859375 1048576 98415 3072 7	282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1
9	2097152 6588344 7558272 5000000 2048000 472392 43904 512	16777216 22059204 15116544 6250000 1638400 236196 12544 64	134217728 80707214 30233088 7812500 1310720 118098 3584 8	1073741824 282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1
10	4782969 16777216 22235661 17915904 9765625 3538944 750141 65530 729	43046721 67108864 151883209 26873856 9765625 2359296 321489 16384 81	387420489 268435456 121060821 40310784 9765625 1572864 137781 4096 9	3486784401 1073741824 282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1

In præcedenti tabula progressivas quantitates expandimus: in sequenti colligimus, cuiusque numeri massas ex omnibus eiusdem appellationis proportionalibus, pro vnaquaque numeri abscissione supra singillatim acceptis: videlicet massam ex omnibus abscissis, quam significamus caractere $O.1$; & massam ex omnibus residuis, $O.1r$; & massam ex omnibus abscissis secundis $O.12$; & massam ex omnibus vniprimis $O.1r$; & massam ex omnibus residuis secundis, $O.1r3$; & reliquas deinceps, quatenus præcedens tabula expanditur.

	$O.1$	$O.12$	$O.1r$	$O.1r3$	$O.1r2$	$O.1r4$
1	$O.1$	$O.12$	$O.1r$	$O.1r3$	$O.1r2$	$O.1r4$
2	1	1	1	1	1	1
3	3	5	4	9	6	17
4	6	14	10	36	20	98
5	10	30	20	100	50	354
6	15	55	35	225	105	979
7	21	91	56	441	196	2275
8	28	140	84	784	336	4676
9	36	204	120	1296	540	8772
10	45	285	165	2025	825	15333

54

	0.03	0.05	0.04	0.033	0.05	
t	0.03r	0.02r2.	0.05	0.04r	0.03r2.	0.05
2	1	1	1	1	1	1
3	10	8	33	18	12	65
4	46	34	276	116	68	794
5	146	104	1300	470	260	4890
6	371	259	4425	1449	777	20515
7	812	560	12201	3724	1960	67471
8	1596	1092	29008	8400	4368	184820
9	2892	1968	61776	17172	8856	446964
10	4917	3333	120825	32505	16665	978405

	0.05	0.02r4	0.07	0.06	
t	0.05r	0.04r2	0.03r3	0.07	0.06r
2	1	1	1	1	1
3	34	20	16	129	66
4	310	154	118	2316	860
5	1610	740	560	18700	5750
6	6035	2659	2003	96825	26265
7	18236	7832	5888	376761	93436
8	47244	19856	14988	1200304	278256
9	109020	45528	34176	3297456	725220
10	229845	95205	71445	8080425	1703625

	<i>O.azr5</i>	<i>O.azr4</i>	<i>O.r8</i>	<i>O.ar7</i>	<i>O.azr6</i>
<i>s</i>	<i>O.azr2</i>	<i>O.azr3</i>	<i>O.a8</i>	<i>O.ar7r</i>	<i>O.abr2</i>
2	1	11	11	1	1
3	36	24	257	130	68
4	380	236	6818	2446	994
5	2300	1400	72354	21146	7604
6	9945	6909	462979	117971	39619
7	34216	20608	2142595	494732	159320
8	99696	49732	7907396	1695036	531012
9	255960	133792	24684612	4992492	1534488
10	594825	357225	67731333	13072917	3963333

	<i>O.azr5</i>	<i>O.r9</i>	<i>O.ar8</i>
<i>s</i>	<i>O.azr3</i>	<i>O.a9</i>	<i>O.a8r</i>
2	1	1	1
3	40	32	513
4	526	418	20196
5	3896	3104	282340
6	20051	16003	2235465
7	80192	64064	12313161
8	2653561	211460	52666768
9	769152	614976	186884496
10	1984917	1587334	574304985

	19	410	491	4812
8	40353607 10077696 1953125 262144 19683 512 1	1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249	7 3072 98415 1048576 5859375 20155392 40353607	49 9216 164025 1048576 3515625 6698464 5764861
9	134217728 40353607 10077696 1953125 262144 19683 512 1	1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824	8 3584 118098 1310720 7812500 30233088 80707214 134217728	64 12544 236196 1638400 6250000 15116544 23059204 16777216
10	387420489 134217728 40353607 10077696 1953125 262144 19683 512 1	1 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 348678401	9 4096 137781 1572864 9765625 40310784 121060821 268435456 387420489	81 16384 321489 2359296 9765625 26873856 51883209 67108864 43046721

	47r3	46r4	45r5	44r6
8	343	2401	16807	117649
	27648	79744	248832	746496
	273375	455625	759375	1265625
	1048576	1048576	1048576	1048576
	2109375	1265625	759375	455625
	2196288	746496	248832	79744
	823543	117649	16807	2401
9	512	4096	32768	262144
	43904	153664	537824	1882384
	472392	944784	1889566	3779136
	2048000	2560000	3200000	4000000
	5000000	4000000	3200000	2560000
	7558272	3779136	1889566	944784
	6588344	1882384	537824	153664
	2097152	262144	32768	4096
10	729	6561	59049	531441
	65536	262144	1048576	4194304
	750141	1750329	4084101	9529569
	3538944	5308416	7962624	11943936
	9765625	9765625	9765625	9765625
	17915904	11943936	7962624	5308416
	22235661	9529569	4084101	1750329
	16777216	4194304	1048576	262144
	4782969	531441	59049	6561

	4317	4318	4319	4310
8	823543 2196288 2109375 1048576 164025 9216 49	5764861 6698464 3515625 1048576 164025 9216 49	40353607 20155392 5859375 1048576 98415 3072 7	282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1
9	2097152 6588344 7558272 5000000 2048000 472392 43904 512	16777216 23059204 15116544 6250000 1638400 236196 12544 64	134217728 80707214 30233038 7812500 1310720 118098 3584 8	1073741824 282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1
10	4782969 16777216 22235661 17915904 9765625 3538944 750141 65530 729	43046721 67108864 51883209 26873856 9765625 2359296 321489 16384 81	387420489 268435456 121060821 40310784 9765625 1572864 137781 4096 9	3486784401 1073741824 282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1

In præcedenti tabula 'progressivas quantitates expandimus: in sequenti colligimus, cuiusque numeri massas ex omnibus eiusdem appellationis proportionalibus, pro vnaquaque numeri abscissione supra singillatim acceptis: videlicet massam ex omnibus abscissis, quàm significamus caractere $O.a$; & massam ex omnibus residuis, $O.r$; & massam ex omnibus abscissis secundis $O.a2$; & massam ex omnibus vniprimis $O.ar$; & massam ex omnibus residuis secundis, $O.r3$; & reliquas deinceps, quatenus præcedens tabula expanditur.

	$O.r$	$O.r2$		$O.r3$	$O.ar2$	$O.r4$
1	$O.a$	$O.a2$	$O.ar$	$O.a3$	$O.a2r$	$O.a4$
2	1	1	1	1	1	1
3	3	5	4	9	6	17
4	6	14	10	36	20	98
5	10	30	20	100	50	354
6	15	55	35	225	105	979
7	21	91	56	441	196	2275
8	28	140	84	784	336	4676
9	36	204	120	1296	540	8772
10	45	285	165	2025	825	15333

54

	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05
t	0.03r	0.02r2.	0.05	0.04r	0.03r2.
2	1	1	1	1	1
3	10	8	33	18	12
4	46	34	276	116	68
5	146	104	1300	470	260
6	371	259	4425	1449	777
7	812	560	12201	3724	1960
8	1596	1092	29008	8400	4368
9	2892	1968	61776	17172	8856
10	4917	3333	120825	32505	16665

	0.05	0.04	0.07	0.06
t	0.05r	0.04r2	0.03r3	0.05r
2	1	1	1	1
3	34	20	16	129
4	310	154	118	2316
5	1610	740	560	181700
6	6035	2659	2003	96825
7	18236	7832	5888	376761
8	47244	19856	14988	1200304
9	109020	45528	34176	3297456
10	229845	95205	71445	8080425

	O.43r5	O.43r4	O.r8	O.ar7	O.a2r6
1	O.45r2	O.44r3	O.a8	O.a7r	O.a6r2
2	1	11	11	1	1
3	36	24	257	130	68
4	380	236	6818	2446	994
5	2300	1400	72354	21146	7604
6	9945	6909	462979	117971	39619
7	34216	20608	2142595	494732	159320
8	99696	49732	7907396	1695036	531012
9	255960	153792	24684612	4992492	1534488
10	594825	357225	67731333	13072917	3963333

	O.43r5	O.r9	O.ar8
1	O.45r3	O.a9	O.a8r
2	1	1	1
3	40	32	513
4	526	418	20196
5	3896	3104	282340
6	20051	16003	2235465
7	80192	64064	12313161
8	265356	211460	52666768
9	769152	614976	180884496
10	1984917	1587334	574304985

56

	<i>O.azr7</i>	<i>O.azr6</i>	<i>O.azr5</i>	<i>O.azr0</i>
<i>i</i>	<i>O.azr2</i>	<i>O.azr3</i>	<i>O.azr4</i>	<i>O.azr0</i>
2	I	I	I	I
3	132	72	48	1025
4	2708	1268	836	60074
5	26300	11720	7760	1108650
6	165417	72297	48009	10874275
7	778120	837120	224224	71340451
8	2967888	1273008	851640	353815700
9	9655416	4154976	2766692	1427557524
10	27720825	11912505	7936665	4914341925

	<i>O.azr9</i>	<i>O.azr8</i>	<i>O.azr7</i>
<i>i</i>	<i>O.azr9</i>	<i>O.azr2</i>	<i>O.azr3</i>
2	I	I	I
3	514	260	136
4	20710	7594	3238
5	303050	94100	37400
6	2538515	715939	276563
7	14850676	3943352	1503488
7	67518444	17200816	6479148
9	254402940	63090168	23809576
10	828707925	201375525	75832725

	<i>O. 446</i> <i>O. 4614</i>	<i>O. 4515.</i>
2	I	I
3	80	64
4	1834	1510
5	21200	17600
6	157269	130835
7	856352	713216
8	3716116	3098604
9	13596208	11320316
10	43292325	35844325

His paratis, experire, si vera sunt, quæ proponimus theoremata, sub 5. a. exempli gratia, tertium.

O. 642: 213—312—11.

idest, massa ex omnibus sexcuplis abscissis secundis cuiusq; totæ, est æqualis duplæ totæ tertiæ, dempta tripla tota secunda, addita ipsa tota.

Nota, quod interpunctio colon (:) nobis vsuuenit ad significandam æqualitatem.

Estq

	a3r7	a2r8	a1r9	r10
8	823543 2196288 2109375 1048576 164025 9216 49	5764861 6698464 3515625 1048576 164025 9216 49	40353607 20155392 5859375 1048576 98415 3072 7	282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1
9	2097152 6588344 7558272 5000000 2048000 472392 43904 512	16777216 23059204 15116544 6250000 1638400 236196 12544 64	134217728 80707214 30233088 7812500 1310720 118098 3584 8	1073741824 282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1
10	4782969 16777216 22235661 17915904 9765625 3538944 750141 65530 725	43046721 67108864 51883209 26873856 9765625 2359296 321489 16384 81	387420489 268435456 121060821 40310784 9765625 1572864 137781 4096 9	3486784401 1073741824 282475249 60466176 9765625 1048576 59049 1024 1

In præcedenti tabula progressivas quantitates expandimus: in sequenti colligimus, cuiusque numeri massas ex omnibus eiusdem appellationis proportionalibus, pro vnaquaque numeri abscissione supra singillatim acceptis: videlicet massam ex omnibus abscissis, quàm significamus caractere $O.a$; & massam ex omnibus residuis, $O.r$; & massam ex omnibus abscissis secundis $O.a2$; & massam ex omnibus vniprimis $O.ar$; & massam ex omnibus residuis secundis, $O.r3$; & reliquas deinceps, quatenus præcedens tabula expanditur.

	$O.r$	$O.r2$		$O.r3$	$O.ar2$	$O.r4$
1	$O.a$	$O.a2$	$O.ar$	$O.a3$	$O.a2r$	$O.a4$
2	1	1	1	1	1	1
3	3	5	4	9	6	17
4	6	14	10	36	20	98
5	10	30	20	100	50	354
6	15	55	35	225	105	979
7	21	91	56	441	196	2275
8	28	140	84	784	336	4676
9	36	204	120	1296	540	8772
10	45	285	165	2025	825	15333

54

	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05
t	0.03r	0.05r2.	0.05	0.04r	0.03r2
2	1	1	1	1	1
3	10	8	33	18	12
4	46	34	276	116	68
5	146	104	1300	470	260
6	371	259	4425	1449	777
7	812	560	12201	3724	1960
8	1596	1092	29008	8400	4368
9	2892	1968	61776	17172	8856
10	4917	3333	120825	32505	16665

	0.05	0.04	0.07	0.06
t	0.05r	0.04r2	0.07r3	0.06r
2	1	1	1	1
3	34	20	16	129
4	310	154	118	2316
5	1610	740	560	18700
6	6035	2659	2003	96825
7	18236	7832	5888	376761
8	47244	19856	14988	1200304
9	109020	45528	34176	3297456
10	229845	95205	71445	8080425

$O.23r5$ $O.23r4$ $O.28$ $O.27$ $O.22r6$
 $O.25r2$ $O.24r3$ $O.28$ $O.27r$ $O.26r2$

2	1	11	11	1	1
3	36	24	257	130	68
4	380	236	6818	2446	994
5	2300	1400	72354	21146	7604
6	9945	6009	462979	117971	39619
7	34216	20608	2142595	494732	159320
8	99696	49752	7907396	1695036	531012
9	255960	133792	24684612	4992492	1534488
10	594825	357225	67731333	13072917	3963333

$O.23r5$ $O.19$ $O.28$
 $O.25r3$ $O.24r4$ $O.29$ $O.28r$

2	1	1	1	1
3	40	32	513	258
4	526	418	20196	7076
5	3896	3104	282340	79430
6	20051	16003	2235465	542402
7	80192	64064	12313161	2685004
8	265356	211460	52666768	10582460
9	769152	614976	186884496	35277012
10	1984917	1587334	574304985	209008345

Hyperlogarithmi.

Duplæ

Sesquialteræ.

I(1).	I(2).
I(2) I(3).	I(4) I(5).
I(3) I(4) I(5).	I(6) I(7) I(8).
I(4) I(5) I(6) I(7).	I(8) I(9) I(10) I(11).

Hypologarithmi.

Duplæ

Sesquialteræ.

I(2).	I(3).
I(3) I(4).	I(5) I(6).
I(4) I(5) I(6).	I(7) I(8) I(9).
I(5) I(6) I(7) I(8).	I(9) I(10) I(11) I(12).

Sed & duplicatæ rationis duplus est logarithmus: nam duplicatæ duplæ rationis, nempe quadruplæ hyperlogarithmi ex binis duplæ rationis hyperlogarithmis aggregatis fiunt.

Hyperlogarithmi quadruplæ

ex duplæ,

& duplæ hyperlogarithmis.

I(1).	I(2) I(3).
I(2) I(3).	I(4) I(5) I(6) I(7).
I(3) I(4) I(5).	I(6) I(7) I(8) I(9) I(10) I(11).

Hypologarithmi quadruplæ

ex duplæ,

& duplæ hypologarithmis.

I(2).	I(3) I(4).
I(3) I(4).	I(5) I(6) I(7) I(8).
I(4) I(5) I(6).	I(7) I(8) I(9) I(10) I(11) I(12).

Si-

Similiter multiplicatae cuiusque rationis æquemultiplex deprehenditur logarithmus; quia quasi æquemultipli sunt hyperlogarithmi, & quasi æquemultipli sunt hypologarithmi. Et è conuerso submultiplicatae deprehenditur submultiplex logarithmus.

A P P E N D I X.

CUm hæc scriberem, mihi contigit rectum tranitem inuenire, ad persequendos omnium numerosarum rationum logarithmos. Oportet autem eiusdem ab initio propositæ seriei fractionum terminos assumere, aliquatenos à primo, singulos, binos, ternos, quaternos, quinos, & deinceps. Porro ex totenis collectas quantitates voco prologarithmos, & totenorum seriem, voco seriem prologarithmorum.

Esto autem series singulorum *A*: series prologarithmorum ex binis *B*: series prologarithmorum ex ternis *C*: item ex quaternis *D*: item ex quinis *E*: & deinceps aliæ. Deinde series ordinetur excessuum, primi prologarithmi seriei *B*, supra primum seriei *A*; & secundi, supra secundum; & tertij, supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium huiusmodi excessuum summa, est logarithmus rationis duplæ. Nam primus excessus, est hypologarithmus inter maximos terminos rationis duplæ: summa ex primo & secundo, est hypologarithmus, inter subdublos maximorum: summa ex primo secundo & tertio, est hy-

<i>E</i>	1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 1(5).	1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10).	1(11) 1(12) 1(13) 1(14) 1(15).
<i>D</i>	1(1) 1(2) 1(3) 1(4).	1(5) 1(6) 1(7) 1(8).	1(9) 1(10) 1(11) 1(12).
<i>C</i>	1(1) 1(2) 1(3).	1(4) 1(5) 1(6).	1(7) 1(8) 1(9).
<i>B</i>	1(1) 1(2).	1(3) 1(4).	1(5) 1(6).
<i>A</i>	1(1).	1(2).	1(3).

pologarithmus, iuter subtriplos maximorum. Ergo summa omnium, hypologarithmorum est maximus, nempe logarithmus.

Item series ordinetur excessuum primi prologarithmi seriei C; supra primum seriei B; & secundi, supra secundum; & tertij, supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium huiusmodi excessuum summa, est logarithmus rationis sesquialteræ.

Item series ordinetur excessuum primi prologarithmi seriei D, supra primum seriei C; & secundi, supra secundum; & ter-

tij supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium summa excessuum, est logarithmus rationis sesquiterentiæ.

Similiter series ordinetur excessuum primi prologarithmi seriei E, supra primum seriei C; & secundi, supra secundum; & tertij, supra tertium; & sic deinceps in infinitum: omnium summa excessuum, est logarithmus rationis quam habent numeri ex quotenis est series E, & ex quotenis est series C. Nam primus excessus, inter maximos eiuſdem rationis terminos est hypologarith-

garithmus primi vero & secundi excessuum summa, est hypologarithmus inter subduplos maximorum: primi secundi & tertij. summa excessuum, est hypologarithmus inter subtriplos; & sic deinceps.

Cap. 6.

Sextum & vltimum, pro sexto est elemento: numerosa duarum propositionum quinti elementi reductio, quarum est vsus insignis in sexto.

Prin a, quæ est 99. 5.

Quatuor harmonicè dispositarum quantitatum, si prima maxima est omnium, logarithmus, rationis primæ ad secundam, ad logarithmum rationis tertij ad quartam, minor est, quàm vt prima ad tertiam; maior, quàm vt secunda ad quartam.

Sint quantitates numerosas inuicem rationes habentes, harmonicè dispositæ 1(4) 1(5). 1(8) 1(9) quarum maxima 1(4).

Dico logarithmum rationis 1(4) ad 1(5) ad logarithmum rationis 1(8) ad 1(9), minorem esse, quàm vt 1(4) ad 1(8); maiorem verò, quàm vt 1(5) ad 1(9). idest

Dico logarithmum rationis 5 ad 4 ad logarithmum rationis 9 ad 8, minorem esse, quàm vt 8 ad 4; maiorem verò, quàm vt 9 ad 5. idest

Dico rationem 5 ad 4; ad rationem 9 ad 8, logarithmicè minorem esse, quàm vt 8 ad 4; maiorem verò logarithmicè, quàm vt 9 ad 5. idest

Dico rationem 5 ad 4 quadruplicatam, depressiorem esse

esse ratione 9 ad 8 octuplicata: & 5 ad 4 quintuplicatam altiore esse ratione 9 ad 8 nonuplicata.

Et quia ambæ rationes 5 ad 4, & 9 ad 8, sunt maioris inæqualitatis: inter quas depressores altioribus sunt minores. Dico 5 ad 4 quadruplicatam minorem esse ratione 9 ad 8 octuplicata: & 5 ad 4 quintuplicatam, maiorem esse ratione 9 ad 8 nonuplicata. idest

Dico potestates quartam 5 ad quartam 4, minorem esse quam ut octava 9 ad octavam 8: quintam verò 5 ad quintam 4, maiorem quam ut nona 9 ad nonam 8. idest

Dico productos sub potestatibus, sub quarta 5, & octava 8, minorem, quam sub quarta 4, & octava 9: sed sub quinta 5, & nona 8, maiorem, quam sub quinta 4, & nona 9.

Potestates.

Quarta 5 625

Octava 8 15777216

83886080

33554432

100662296

10485659900

Quar-

Quarta 4 256
 Octava 9 43046721

258280326
 215233605
 86093442

11019960576

Quinta 5 3125
 Nona 8 134217728

671088640
 268435456
 134217728
 402653184

419430400000

Quinta 4 1024
 Nona 9 387420489

1549681956
 774840978
 387420489

396718580736

Secunda, que est 100. 5.

Quatuor arithmetice dispositorum numerorum, ratio primi ad secundum totuplicata, quotus est primus, maior est ratione tertij ad quartum totuplicata, quotus est quartus: ratio verò primi ad secundum totuplicata, quotus est secundus, minor est, quàm tertij ad quartum totuplicata, quotus est tertius.

Sint quatuor arithmetice dispositi numeri 8, 5, 7, 4

Dico rationem 8 ad 5 octuplicatam, maiorem esse ratione 7 ad 4 quadruplicata: & rationem 8 ad 5 quintuplicatam, minorem septuplicata 7 ad 4. idest.

Dico potestates octauam 8 ad octauam 5, maiorem esse, quàm quarta 7 ad quartam 4: quintam 8 ad quintam 5, minorem, quàm septima 7 ad septimam 4. idest

Dico productos sub potestatibus, sub octaua 8, & quarta 4, maiorem esse, quàm sub octaua 5, & quarta 7: & sub quinta 8, & septima 4, minorem, quàm sub quinta 5, & septima 7.

Potestates.

Octaua	8	16777216
Quarta	4	256

100663296

83886080

33554432

4294967296

Octava	3	390625
Quarta	7	2401

390625

1562500

781250

937890625

Quinta	8	32768
Septima	4	16384

131072

262144

98304

196608

32768

536870912

Potestates.

Quinta	5	3125
Septima	7	823543

4117715

1647086

823543

2470629

2573571875.

Errata.

Corrige.

In Præfatione præcedenti.

Pag.	lin.	col.		
52	7	I	184025	273375
	8	I	9216	27648
	9	I	49	343

In Opere sequenti.

Pag.	lin.		
5	20	basibus, quæ	basibus, quælibet quan- titas fuerit summa duarum, quæ
64	25	quoties	quotus
	26	quoties	quotus
207	27	supra lineolam	ante parentheses
208	3	infra lineolam	inter parentheses.



SOLI DEO GLORIA.

G E O M E T R I Æ
S P E C I O S Æ
E L E M E N T A .



Petrus Mengolus, Lucæ Tesino, adolescenti
optimo S. D.



IN prima lectiua Alkebra Heciusa
tres tabulas triangulares tibi tradidi,
multiplicium, & proportionalium, &
nominum nuncupatas: earumque
usum, ad componendas, & relin-
quendas potestates binomiorum, & per modum ar-
tis, explicavi. Eius demonstrationem, presenti tra-
do libello; quam ex me audisti: ut legendo recolas, &
ad potiora mathemata suscipienda, te prepares. Ni-
hil alienum sumo; prater quadam, ex Euclide,
in quinto, & sexto: que suis locis allego, in margi-
ne. Vale.






GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

ELEMENTVM PRIMVM

DEFINITIONES.



1.  I tabula triangularis, ex vertice, & basibus, & lateribus, ita concipiatur ordinata; vt in vertice sit quædam quantitas; & in prima basi, statim sub vertice, sint duæ quantitates; & in secunda basi, tres; & in tertia, quatuor; & sic deinceps: in singulis basibus, dicentur, quantitates extremæ, Prima, & Vltima; & his proximæ, Secunda, & Penultima; item Tertia, & Tritultima; Quarta, & Quartultima; & deinceps.

2. Undelatus primarum omnium quantitatum, dicitur, Primum; & secundarum, Secundum; & deinceps: vltimarum quoque dicitur, Vltimum; & penultimarum, Penultimum; & sic deinceps.

3. In singulis quoque lateribus, quantitas, quæ in vertice, aut quæ vertici est proxima, dicitur Prima; & reliquæ

4 ELEMENTVM

deinceps, Secunda, Tertia, Quarta, & sic in infinitum.

4. Quantitas, unde progressio continuè proportionalium, ordinatur in infinitum, dicitur, Rationalis. & significabitur, caractere ω .

5. Et prima consequens à rationali, dicitur, Radix, vel Potestas prima. & significabitur, caractere cuiusq; litteræ alphabeti.

6. Et reliquæ consequentes, dicentur Potestates radices, Secunda, Tertia, & deinceps, iuxta suum cuiusque ordinem. Et significabitur vnàquæque, eadem litterâ suæ radices, adscriptoque ordinis numero. vt radices a , secunda potestas a^2 , tertia a^3 , & sic deinceps.

7. Rationalis, licet nomen ordinis non habeat inter potestates; tamen habebitur pro ordinata: & dicitur, vnitatem minùs ordinata, quàm sit prima potestas.

8. Si tabulæ triangularis in vertice, fuerit rationalis; & in prima basi, duæ fuerint radices, prior, in primo latere, & posterior, in vltimo; & deinceps in primo latere, fuerint ordinatæ potestates prioris radices, & in vltimo, potestates posterioris: fuerint autem, & in reliquis lateribus secundo, tertio, & deinceps in singulis, ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione primi lateris; item in penultimo, tritultimo, & reliquis deinceps lateribus, in singulis, ordinatæ fuerint continuè proportionales, in eadem ratione vltimi lateris: & in singulis basibus, fuerint ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione radicum; in secunda basi, tres, quarum extremæ sunt secundæ potestates

States radicum; in tertia, quatuor, quarum extremæ sunt potestates tertiæ, & sic deinceps: dicetur Tabula Proportionalium. *Huiusmodi tabulam ordinat Euclides in 2. 8. Elementorum.*

9. In tabula proportionalium, inter extremas, vna quælibet media, ad quam rationalis habuerit rationem compositam ex duabus rationibus, ad quasdã potestates vtrarumque radicum; denominabitur ab vtrisque ordinibus potestatum, à priore primùm, deinde à posteriore. & significabitur, ex vtrisque; characteribus, caractere composito; ex priore primùm, deinde ex posteriore. Vt si prior est radix a , posterior r ; media, ad quam u , rationem habet compositam, ex rationibus, u ad a , & u ad r , dicetur, Vni prima; & significabitur, caractere ar : ad quam verò u , rationem habet compositam ex rationibus, u ad a^2 , & u ad r^2 , dicetur, Bitertia; & significabitur caractere a^2r^2 : & sic deinceps.

10. Si tabulæ triangularis in vertice, fuerit vnitas; & in prima basi, & in lateribus primo, & vltimo, fuerint vnitates; deinceps verò in basibus, quæ versus verticem sibi insistunt, quasi fronti cornua, dicetur, Tabula multiplicium.

11. Si duæ tabulæ, multiplicium, & proportionalium, ita coaptentur, vertex, vertici, & latera, lateribus, & bases, basibus, vt congruant; idest, vt quisque numerus multiplex, congruentem multiplicet proportionalem: producta, dicetur, Tabula Nominum. Significabitur autem, vnumquodq; nomen, eodem suæ proportionalis caractere,

tere, post suum immediatè numerum conscripto.

12. In quibusque proportionalitatibus earundem, vel non earundem rationum; homologæ sunt primùm, antecedentes, antecedentibus, & consequentes, consequentibus: deinde permutando, antecedentes suis consequentibus sunt homologæ: homologarum quoque æquemultiplices, & eadem partes, & summæ, & differentia, sunt homologæ.

13. Homologia, est sumptio homologarum, vt & in alia quadam proportionalitate, fiant homologæ.

14. Ratio ex æquali, dicitur, qualibet ratio, ex rationibus composita.



PRIMUM.

7

Tabula Proportionalium.

u

	a	r				
	a2	ar	r2			
a3	a2r	ar2	r3			
a4	a3r	a2r2	ar3	r4		
a5	a4r	a3r2	a2r3	ar4	r5	
a6	a5r	a4r2	a3r3	a2r4	ar5	r6

Tabula Multiplicium.

		I				
		I	I			
		I	2	I		
		I	3	3	I	
	I	4	6	4	I	
	I	5	10	10	5	I
I	6	15	20	15	6	I

Tabula Nominum.

u

	a	r				
	a2	2ar	r2			
a3	3a2r	3ar2	r3			
a4	4a3r	6a2r2	4ar3	r4		
a5	5a4r	10a3r2	10a2r3	5ar4	r5	
a6	6a5r	15a4r2	20a3r3	15a2r4	6ar5	r6

Ex-

Explicationes quarundam notarum.

Additio significabitur, caractere crucis: vt ex a , & r , collecta summa, $a + r$.

Subtractio, caractere lineolæ: vt ex t , dempta a , relinquit differentiam, $t - a$.

Æqualitas, ea interpunctio significabitur, qua partes principes periodi solent distingui. vt quod $a + r$, est æqualis ipsi t ,

$$a + r : t.$$

Ratio significabitur interpunctio, qua maximæ partes periodi subdistinguntur; scilicet puncto, & commate. vt ratio a ad r , scribendo,

$$a ; r.$$

Itaque proportio a , ad r , sicut a^2 ad ar , significabitur, scribendo,

$$a ; r : a^2 ; ar.$$

Et composita ratio ex rationibus. velut ex u ad a^2 , & u ad r^3 , composita u ad $a^2 r^3$, scribendo,

$$u ; a^2, + u ; r^3 : u ; a^2 r^3.$$

vbi comma, inter a^2 , & cruce[m], vtiliter distinguit, ad significandum, non quantitat[um] a^2 , & u , summam $a^2 + u$, sed rationum.

Multiplicata quoque ratio, significabitur. velut a^3 ad r^3 , triplicata rationis a ad r , scribendo,

$$a^3 ; r^3 : \text{triplicata } a ; r.$$

Theorema primum, Propositio prima.

EX iisdem rationibus, ex æquali, sunt eadem rationes.

Hypotesis.

$a; b; c; d.$

$e; f; g; h.$

Dico ex æquali $a; b, + e; f; c; d, + g; h.$

Preparatio.

$e; f; b; i.$

$g; h; d; l.$

Demonstratio.

11.5. | $b; i; d; l$

12.5. | $a; i; c; l$

def. 5.6. | $a; b, + e; f; a; i.$

def. 5.6. | $c; d, + g; h; c; l.$

11.5. | $a; b, + e; f; c; d, + g; h. : \text{Quod. erat. demon-}$
 monstrandum.

Quare ex iisdem rationibus, ex æquali, sunt eadem rationes.

Theor. 2. Prop. 2.

Quantitates proportionales, per homologiam sunt proportionales.

Demonstr.

def. 6. 5.

12, & 24. 5.

15. 5.

16. 5.

17. 5.

18. 5.

Nam convertendo, quantitates fiunt proportionales: item homologas homologis addendo: item æque multiplicando, & æque partiendo: & permutando: & diuidendo: & com-

Explicationes quarundam notarum.

Additio significabitur, caractere crucis: vt ex a , & r , collecta summa, $a + r$.

Subtractio, caractere lineolæ: vt ex t , dempta a , relinquit differentiam, $t - a$.

Æqualitas, ea interpunctiōne significabitur, qua partes principis periodi solent distingui, vt quod $a + r$, est æqualis ipsi t ,

$$a + r : t.$$

Ratio significabitur interpunctiōne, qua maximæ partes periodi subdistinguntur; scilicet puncto, & commate. vt ratio a ad r , scribendo,

$$a ; r.$$

Itaque proportio a ad r , sicut a^2 ad ar , significabitur, scribendo,

$$a ; r : a^2 ; ar.$$

Et composita ratio ex rationibus. velut ex u ad a^2 , & u ad r^3 , composita u ad $a^2 r^3$, scribendo,

$$u ; a^2, + u ; r^3 : u ; a^2 r^3.$$

vbi comma, inter a^2 , & cruce[m], vtiliter distinguit, ad significandum, non quantitat[um] a^2 , & u , summam $a^2 + u$, sed rationum.

Multiplicata quoque ratio, significabitur. velut a^3 ad r^3 , triplicata rationis a ad r , scribendo,

$$a^3 ; r^3 : \text{triplicata } a ; r.$$

Theorema primum, Propositio prima.

EX iisdem rationibus, ex æquali, sunt eadem rationes.

Hypotesis.

$a; b; c; d.$

$e; f; g; h.$

Dico ex æquali $a; b, + e; f; c; d, + g; h.$

Preparatio.

$e; f; b; i.$

$g; h; d; l.$

Demonstratio.

11.5. | $b; i; d; l$

12.5. | $a; i; c; l$

def. 5.6. | $a; b, + e; f; a; i.$

def. 5.6. | $c; d, + g; h; c; l.$

11.5. | $a; b, + e; f; c; d, + g; h. : \text{Quod erat demon-}$
 monstrandum.

Quare ex iisdem rationibus, ex æquali, sunt eadem rationes.

Theor. 2. Prop. 2.

Quantitates proportionales, per homologiam sunt proportionales.

Demonstr.

def. 6. 5.

12, & 24. 5.

15. 5.

16. 5.

17. 5.

18. 5.

Nam convertendo, quantitates sunt proportionales: item homologas homologis addendo: item æque multiplicando, & æque partiendo: & permutando: & diuidendo: & com-

Theor. 5. Prop. 5.

Si tabulæ triangularis in vertice; fuerit rationalis; & in prima basi, fuerint duæ radices; & in primo, & ultimo latere, fuerint continuè proportionales; & in singulis lateribus à primo, fuerint ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione, quæ deinceps, in primo: erit proportionalium tabula. Item si in singulis lateribus ab ultimo, fuerint ordinatæ continuè proportionales, in eadem ratione, quæ deinceps, in ultimo: erit proportionalium tabula.

Demonstr.

16. 5. Cum in binis deinceps basibus, & in binis deinceps lateribus à primo, quantitates eandem habeant rationem, quæ deinceps, in primo, antecedentes, in vna, & consequentes, in altera basi: habebunt, permutando, eandem rationem etiam, antecedentes, in vno, & consequentes, in altero latere: eritque in basibus, ratio deinceps, eadem, quæ in prima basi: eruntque in singulis basibus, continuè proportionales in eadem ratione radicum: quare tabula triangularis, erit proportionalium tabula. Quod &c.

4. b.

Simili prorsus demonstratione, ostendetur altera pars Theorematis. Quam &c.

Quare &c.

Theor.

IN tabula proportionalium, rationalis ad vnamquamq; mediam, habet rationem cōpositam ex rationibus, ad potestatem, in primo latere, vnitatem minùs ordinatam, quàm sit ipsa media, in basi, ab vltima; & ad potestatem, in vltimo latere, vnitatem minùs ordinatam, quàm sit ipsa media, in basi, à prima.

Hypoth. & Demonstr.

def. p. Sit in tabula proportionalium, quinta basis; in qua, sex proportionales: & sit vna ex medijs, non prima, quæ est sextultima, nec sexta, quæ est vltima, sed quarta, quæ est tritultima. Et sint, in primo latere, radix a ; & in vltimo, radix r : & ab a , sit secunda potestas a^2 , vnitatem minùs ordinata, quàm tritultima; quæ profecto in primo latere, est *def. 8.* tertia; & in tritultimo, est prima: sit etiam ab r , *def. 3.* tertia potestas r^3 , vnitatem minùs ordinata, quàm quarta; quæ profecto, in vltimo latere, est quarta; & in quarto, prima: erit quantitas a^2r^3 , *def. 8.* bitertia, ad quam, rationalis habet rationem com- *def. 3.* positam ex rationibus, ad potestates a^2 , & r^3 , *def. 9.*

Dico mediam, in quinta basi, quartam tritultimam, esse bitertiam a^2r^3 .

Demonstr.

def. 2. Nam quarta, & tritultima, in quarto est, & in tritultimo latere: in quarto quidem, est tertia quantitas; & in tritultimo, est quarta. Habet er-

go rationalis ad tertiam quarti lateris, rationem
 compositam ex rationibus, ad r_3 primam quar-
 ti lateris, & primæ quarti lateris ad tertiam: sed
 def. 8. prima quarti lateris ad secundam, & secunda ad
 tertiam, sunt continuè proportionales, vt prima
 primi lateris ad secundam, & secunda ad tertiam:
 p. h. ideoque prima ad tertiam quarti lateris, est vt pri-
 ma u , ad tertiam primi a_2 : ergo rationalis ad ter-
 p. h. tiam quarti lateris, id est, ad quartam tritultimam,
 in quinta basi, rationem habet compositam ex
 rationibus, u ad r_3 , & u ad a_2 ; eandem, quam
 9. 5. habet ad $a_2 r_3$ bitertiam. Ergo in quinta basi,
 quarta tritultima, est bitertia $a_2 r_3$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 7. Prop. 7.

Quantitas, ad quam rationalis habet rationem com-
 positam, ex rationibus ad potestates, in primo, &
 ultimo latere tabulæ proportionalium; est media:
 & est in basi æqueordinata, atque summa est ordinum po-
 tatum: & est vnitatè plus ordinata, in basi, ab vltima,
 quàm sit ordo potestatis, in primo latere: item est vnitatè
 plus ordinata, in basi, à prima, quàm sit ordo potestatis, in
 ultimo latere.

Hypoth.

Sit quantitas $a_2 r_3$, ad quam u , rationem habet com-
 positam, ex rationibus, u ad a_2 , in primo latere, & u

ad r_3 , in ultimo, tabulæ proportionalium: quarum potestatum summa ordinum, sit ordo quintæ basis: & quarum potestatum, unitate maiores ordines, eius quidem a_2 , quæ in primo est latere, sit ordo tritultimæ, & eius r_3 , quæ in ultimo est latere, sit ordo quartæ, in basi.

Dico a_2r_3 , esse quartam tritultimam, in quinta basi.

Demonstr.

Est enim a_2 , tertia in primo latere; & ut u ad a_2 , ita est, in quarto latere, prima ad tertiam: sed est r_3 , prima in quarto latere: ergo u ad tertiam in quarto latere, rationem habet compositam, ex rationibus, ad a_2 , & ad r_3 ; eandem, quam ad a_2r_3 . Ergo a_2r_3 , est tertia in quarto latere: ergo est quarta in tritultimo: ergo in sua basi, est quarta tritultima: sed quarta tritultima non est, nisi inter sex proportionales, quarum & sexta est vltima, & quinta est penultima, & sic deinceps: & sex proportionales, non nisi in quinta sunt basi. Ergo a_2r_3 bitertia, est & quarta tritultima, in quinta basi. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 8. Prop. 8.

Summa cuiusque basis nominum in tabula, est potestas æqueordinata summæ radicum.

Hypoth.

Sit in tabula nominum basis tertia, cuius summa nominum $a_3 + 3a_2r + 3ar_2 + r_3$: sit quoque summa radicum $a+r$.

Dico $a_3 + 3a_2r + 3ar_2 + r_3$, esse tertiam potestatem $a+r$.

Oportet autem prius demonstrare, de summa nominum, praecedentium basium, videlicet, secundae basis.

Dico itaque primò $a_2 + 2ar + r_2$, secundam esse potestatem $a+r$.

Demonstr.

def. 8. $u; a; a_2; r; ar; a+r; a_2 + ar.$

2. b. $u; r; a; ar; r; r_2; a+r; ar+r_2.$

2. b. $u; a+r; a+r; a_2 + 2ar + r_2.$

$a_2 + 2ar + r_2$, est secunda potestas $a+r$.

Quod &c.

def. 8. $u; a; a_2; a_3; ar; a_2r; r_2; ar_2; a_2 + 2ar$

2. b. $+r_2; a_3 + 2a_2r + ar_2.$

$u; r; a_2; a_2r; ar; ar_2; r_2; r_3; a_2 + 2ar + r_2; a_2r + 2ar_2 + r_3.$

2. b. $u; a+r; a_2 + 2ar + r_2; a_3 + 3a_2r + 3ar_2 + r_3.$


def. 6. $a_3 + 3a_2r + 3ar_2 + r_3$, est tertia potestas $a+r$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 9. Prop. 9.

S I trium quantitatum, prima maior fuerit, quàm secunda; tertia autem maior fuerit excessu ipsarum: excessus tertiæ, supra excessum primæ, & secundæ; erit excessus summæ ex secunda, & tertia, supra primam.

Hypoth.



Sit prima quantitas AB, maior, quàm secunda BC, quarum excessus CA: sitq; tertia D, maior, quàm CA.

Dico excessum D, supra CA, esse excessum summæ, ex D, & BC, supra BA.

Præpar.

Adponatur penes CB, & ipsi CA superponatur quantitas CE, æqualis ipsi D.

Demonstr.

Quoniam EA, est excessus EC supra CA; idest, excessus D, supra CA: necnon est excessus EB, supra BA; idest, summæ ex D, & BC, supra BA: per se patet, id quod propositum est.

Quare &c.

Theor. 10. Prop. 10.

I Næqualem radicem, potestas maioris, vnà cum alterius nominibus eiusdem basis, demptis reliquis, æque ordinata relinquitur potestas differentie.

C

Hy-

Hypoth.

Sint radices inæquales, t maior, a minor: quarum in tabula nominum, in basi tertia, potestas tertia maioris radice t^3 , vnà cum alterno nomine $3ta^2$, demptis reliquis nominibus $3t^2a$, & a^3 , relinquitur quantitas $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$; sit autem differentia radicum $t - a$.

Dico $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$, potestatem tertiam esse $t - a$.

Oportet autem priùs demonstrare, in basibus præcedentibus, videlicet in secunda.

Dico itaque primò $t^2 - 2ta + a^2$, esse secundam potestatem $t - a$.

Demonstr.

def. 8.	$u; t; t; t^2: a; ta: t - a; t^2 - ta.$
¶ 2. b.	$u; a; t; ta: a; a^2: t - a; ta - a^2.$
	$t; a: t^2; ta: ta; a^2: t^2 - ta; ta - a^2.$
ex 14.5	ta , est maior, quàm a^2 .
	$t^2 - ta$, est maior, quàm $ta - a^2$.
9. h.	$t^2 - ta$, dempta $ta - a^2$, relinquitur $t^2 - 2ta + a^2$.
2. h.	$u; t - a: t - a; t^2 - 2ta + a^2.$
def. 6.	$t^2 - 2ta + a^2$ secunda est potestas $t - a$.
	Quod &c.
def. 8.	$u; t; t^2; t^3: ta; t^2a: a^2; ta^2: t^2 - 2ta + a^2;$
¶ 2. b.	$t^3 - 2t^2a + ta^2.$
	$u; a: t^2; t^2a: ta; ta^2: a^2; a^3: t^2 - 2ta + a^2;$
	$t^2a - 2ta^2 + a^3.$

PRIMUM.

19

2. b. $t; a: t_3 - 2t_2a + ta_2, t_2a - 2ta_2 + a_3.$
 ex 145 $t_2 - 2t_2a + ta_2, \text{ maior est, quàm } t_2a - 2ta_2 + a_3.$
 25. 5. $t_2a + a_3, \text{ maior, quàm } 2ta_2.$
 9. b. $t_3 - 2t_2a + ta_2, \text{ dempta } t_2a - 2ta_2 + a_3,$
 relinquitur $t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3.$
 2. b. $u; t - a: t_2 - 2ta + a_2; t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3.$
 def. 6. $t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3, \text{ tertia est potestas } - -$
 a. Quod &c.
 Quare &c.



Hypoth.

Sint radices inæquales, t maior, a minor: quarum in tabula nominum, in basi tertia, potestas tertia maioris radicis t^3 , unâ cum alterno nomine $3ta^2$, demptis reliquis nominibus $3t^2a$, & a^3 , relinquatur quantitas $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$; sit autem differentia radicum $t - a$.

Dico $t^3 - 3t^2a + 3ta^2 - a^3$, potestatem tertiam, esse $t - a$.

Oportet autem priùs demonstrare, in basibus præcedentibus, videlicet in secunda.

Dico itaque primò $t^2 - 2ta + a^2$, esse secundam potestatem $t - a$.

Demonstr.

def. 8. $u; t: t; t^2: a; ta: t - a; t^2 - ta.$

& 2. b. $u; a; t; ta: a; a^2: t - a; ta - a^2.$

$t; a: t^2; ta: ta; a^2: t^2 - ta; ta - a^2.$

ex 14.5 ta , est maior, quàm a^2 .

$t^2 - ta$, est maior, quàm $ta - a^2$.

9. h. $t^2 - ta$, dempra $ta - a^2$, relinquatur $t^2 - 2ta + a^2$.

2. h. $u; t - a: t - a; t^2 - 2ta + a^2.$

def. 6. $t^2 - 2ta + a^2$ secunda est potestas $t - a$.

Quod &c.

def. 8. $u; t: t^2; t^3: ta; t^2a: a^2; ta^2: t^2 - 2ta + a^2;$

& 2. h. $t^3 - 2t^2a + ta^2.$

$u; a: t^2; t^2a: ta; ta^2: a^2; a^3: t^2 - 2ta + a^2;$

$t^2a - 2ta^2 + a^3.$

$t; a:$

P R I M V M.

2. b. $t_3; a: t_3 - 2t_2a + ta_2, t_2a - 2ta_2 + a_3.$
 ex 14.5 $t_2 - 2t_2a + ta_2, \text{ maior est, quàm } t_2a - 2ta_2 + a_3.$
 25. 5. $t_2a + a_3, \text{ maior, quàm } 2ta_2.$
 9. b. $t_3 - 2t_2a + ta_2, \text{ dempta } t_2a - 2ta_2 + a_3,$
 relinquitur $t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3.$
 2. b. $u; t - a: t_2 - 2ta + a_2; t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3.$
 def. 6. $t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3, \text{ tertia est potestas } - -$
 a. Quod &c.
 Quare &c.





Petrus Mengolus, Adm. R. D. Iacobo Venturolo,
Scholarum Piarum Primario Arithmetices
Præceptori S. D.





Vos tibi primùm ostendi characteres, & numeros, libenter vidisse te significasti, & cum tua Schola profectū multiplicibus exemplis confirmasti. Immortales tibi ante omnia gratias debeo, quòd mea qualiacunque inuenta respexeris, & in tua Schola fructum conuerteris. Itaque pro redditione gratiarum, eamdem rem tibi aliquando gratam, iterum & plenius communico. Tu ergo libellum hunc in tuos usus ita conuerteres. Primùm per numerosam inductionem exemplorum, duo theoremata confirmabis precedentis libelli, 8. & 10. quibus ars producendi potestates à duorum nominum aggregatis, vel relictis radicibus demonstratur. deinde singula in presenti libello proposita. necnon alia plura, quæ tum indico, tum ipse tuopte poteris ingenio adijcere. Vale.



GEOMETRIÆ SPECIOSÆ ELEMENTVM SECVNDVM.

DEFINITIONES.



- 1**  Vanitas vtcunque diuisa in duas partes, dicetur, Tota, & significabitur, caractere *t*.
- 2**  Et partes Totæ, dicentur, Abscissa, & Residua : & significabitur abscessa, caractere

a; & residua, *r*.

3. Potestates totæ, dicentur, Tota secunda, *t2*; Tota tertia, *t3*; & deinceps : & potestates abscessæ dicentur, Abscessa secunda, *a2* ; Abscessa tertia, *a3* ; & deinceps : item potestates residuæ, dicentur, Residua secunda, *r2* ; Residua tertia, *r3* ; & deinceps.

4. Si quadam quantitate, diuisa vtcunque in partes, abscessam, & residuam ; concipiatur à rationali, per ipsas partes, abscessam primùm, deinde residuam, ordinata proportionalium tabula : & eadem quantitate rursus diuisa vtcunque; concipiatur ab eadem rationali, altera propor-

tiona-

rationalium tabula: quantitates, quarum in vtrisque eadem appellationes, & ijdem characteres; dicentur, inuicem Synonymæ.

5. Item synonymarum æquemultiplices, dicentur, Synonymæ.

6. Ideoq; si etiam tabulæ nominum fuerint ordinatæ quantitates; quarum eadem sunt nomina, dicentur Synonymæ.

7. Vnitas ad omnes numeros, pro rationali semper habebitur. Vnde conuenienter significabatur rationalis, characterè μ .

8. Cuiusque numeri, factis omnibus integris abscissionibus, omnium, totidemque synonymorum, summa, dicetur, Massa: & significabitur, littera maiuscula O , ante synonymorum characterem scripta: vt massa ex omnibus abscissis, $O. a.$ & massa ex omnibus triplis biprimis, $O. 342r.$

9. Si cuiusque numeri, factis partibus, fuerit ordinata quædam tabula proportionalium, vel nominum; & loco cuiuslibet proportionalium, concipiatur massa suorum synonymorum: transformabitur tabula proportionalium in aliam, quæ dicetur, Tabula Speciosa.

10. In qua ordinatæ quantitates, dicentur, Species.

11. Tabula verò nominum transformabitur in aliam, quæ dicetur, Tabula Subquadratrix.

12. In qua ordinatæ quantitates, dicentur Subquadratrices.

13. Si quælibet subquadratrix quantitas, multiplicata fuerit per numerum vnitatem maiorem; quàm sit ordo suæ basis: producta quantitas, dicetur, Quadratrix.

14. Quod si, velut ex subquadratricibus, ita ex quadratricibus, tabula fuerit ordinata, dicetur Tabula Quadratrix.

15. Si duorum numerorum duæ speciosæ tabulæ fuerint ordinatæ: massæ, quarum in vtriusque sunt eadem appellationes, & ijdem characteres, dicentur inuicem Homonymæ.

16. Item homonymarum massarum æquemultiplices, dicentur, Homonymæ.

17. Ideoque etiam in duabus subquadratricibus tabulis, aut in duabus quadratricibus, massæ, dicentur, Homonymæ.

18. Si tres numeri fuerint deinceps vnitatem differentes; & medius dicatur, tota: maior quidem, dicetur, Sesequitota; & significabitur, caractere q .

19. Minor verò, Semitota: & significabitur, caractere m .

20. Et sicut medij numeri potestates dicuntur totæ, secunda, tertia, & deinceps: ita maioris numeri potestates, dicentur, Sesequitotæ; secunda $q2$, tertia $q3$, & deinceps.

21. Minoris autem, Semitotæ; secunda $m2$, tertia $m3$, & deinceps.

22. Et sicut medij numeri dicuntur Massæ, Species, Subquadratrices, & Quadratrices: ita maioris numeri, di-

centur, Sesquimassæ, Sesquispecies, Sesquisubquadratrices, & Sesquiquadratrices.

23. Et minoris, dicentur, Semimassæ, Semispecies, Semisubquadratrices, & Semiquadratrices.

24. Item, sicut totæ incrementum, est vnitas, ad componendam sesquitotam; & decrementum, est vnitas, ad relinquendam semitotam: ita cuiuslibet totæ, dicetur, Incrementum, numerus addendus, ad componendam sesquitotam æqueordinatam.

25. Et Decrementum, subtrahendus, ad relinquendam semitotam æqueordinatam.

26. Item cuiuslibet massæ Incrementum, dicetur, sufficiens numerus, ad componendam homonymam sesquimassam.

27. Et Decrementum, ad relinquendam homonymam semimassam.



S E C V N D V M.

25

Tabula Speciosa.

O.u
 O.a O.r
 O.a2 O.ar O.r2
 O.a3 O.a2r O.ar2 O.r3
 O.a4 O.a3r O.a2r2 O.ar3 O.r4
 O.a5 O.a4r O.a3r2 O.a2r3 O.ar4 O.r5

Tabula Subquadratrix.

O.u
 O.a O.r
 O.a2 O.2ar O.r2
 O.a3 O.3a2r O.3ar2 O.r3
 O.a4 O.4a3r O.6a2r2 O.4ar3 O.r4
 O.a5 O.5a4r O.10a3r2 O.10a2r3 O.5ar4 O.r5

Tabula Quadratrix.

O.u
 O.2a O.2r
 O.3a2 O.6ar O.3r2
 O.4a3 O.12a2r O.12ar2 O.4r3
 O.5a4 O.20a3r O.30a2r2 O.20ar3 O.5r4
 O.6a5 O.30a4r O.60a3r2 O.60a2r3 O.30ar4 O.6r5

Postulatum unicum.

Postuletur, vt massam assumere concedatur homonymam, & proportionalem ad propositam quamdam, sicut numeri, aut vnitas ad inuicem.

D

Theor.

Theor. 1. Prop. 1.

IN tabula speciosa, cuiusque numeri, & in qualibet basi, species prima, & ultima, sunt æquales; item secunda, & penultima; tertia, & tritultima; & sic deinceps: item sesqui-species; & semispecies homonymæ: & specierum incrementa, & decrementa. Similiter subquadratrices, in sua tabula: & quadratrices, in sua.

Hypoth. 1.

Sint in tabula speciosa, cuiusque numeri, & in tertia basi, prima species $O. a3$, & ultima $O. r3$.

Dico, $O. a3$, $O. r3$, esse æquales.

Demonstr.

def. 8. b. Nã cuiusque numeri, quot sunt abscissiones, tot sunt abscissæ, totidemque residuæ; & abscissæ sunt, unitas, binarius, & deinceps; & residuæ sunt, totidem ordinati, contrario tamen ordine, sed deinceps, usque ad binarium, & unitatem. Quare unaquæque abscissa, vni residuæ est æqualis: & abscissa tertia, residuæ tertiæ; ad quas eadem rationalis, triplicatas habet easdem rationes: & omnes abscissæ tertiæ, omnibus residuis tertijs sunt æquales; idest, $O. a3$, $O. r3$, sunt æquales. Quod &c.

p. p.

Hypoth. 2.

Sint deinde, in eadẽ tertia basi, secunda species $O. a2r$, & penultima $O. ar2$.

Dico, $O. a2r$, $O. ar2$, esse æquales.

Demonstr.

sup. Singulæ a , singulis r , sunt æquales: & singulæ a_2 , singulis r_2 : item singulæ biprimæ a_2r , singulis vnifecundis ar_2 , sunt æquales; ad quas u , rationes habet compositas ex iisdem rationibus: quare omnes biprimæ $O.a_2r$, omnibus vnifecundis $O.ar_2$, sunt æquales. Quod &c.

Hypoth. 3.

Sint sesquispecies $O.a_2r$, $O.ar_2$: vel sint semispecies. Dico, $O.a_2r$, $O.ar_2$, esse æquales.

Demonstratio.

def. 22. b. Quæ sunt vnus cuiusquam numeri sesquispecies; sunt alius, vnitate maioris numeri species: sed species $O.a_2r$, $O.ar_2$, sunt æquales: ergo sesquispecies $O.a_2r$, $O.ar_2$, sunt æquales. Quod &c.

def. 23. b. Item quæ sunt vnus cuiusquam numeri semispecies; sunt alius, vnitate minoris numeri species: sed species sunt æquales: ergo & semispecies. Quod &c.

Dico $O.a_2r$, & $O.ar_2$ incrementa esse æqualia, & decrementa æqualia.

Demonstr.

sup. Nam ab æqualibus speciebus $O.a_2r$, $O.ar_2$, æquales demptæ semispecies homonymæ, relinquunt æqualia decrementa. Quod &c.

sup. Et ab æqualibus sesquispeciebus, æquales

demptæ species homonymæ, relinquunt æqualia incrementa. Quod &c.

Hypoth. 4.

Sint in tabula subquadratrice, in tertia basi, subquadratrices, secunda $O.3a2r$, & penultima $O.3ar2$.

Dico $O.3a2r$, $O.3ar2$, esse æquales.

Demonstr.

def. 10. p. | Quoniam in tabula multipliciũ, in tertia basi, secundus numerus 3, & penultimus 3, ex iisdem vtrimque vnitatibus, & numeris aggregati, sunt æquales: æquemultiplicant species æquales, $O.a2r$, $O.ar2$; & subquadratrices produciunt æquales, $O.3a2r$, $O.3ar2$. Quod &c.

sup. def. 12. b. | Vnde patet, quod & fescuisubquadratrices sunt æquales; & semisubquadratrices æquales; & subquadratricum æqualia sunt incrementa; & æqualia decremẽta. Quæ &c.

Hypoth. 5.

Sint denique in tabula quadratrice, in tertia basi, quadratrices, secunda $O.12a2r$, & penultima $O.12ar2$.

Dico, $O.12a2r$, & $O.12ar2$, esse æquales.

Demonstr.

def. 13. b. | Cum sint enim æqualium subquadratricum æquemultiplices; inter se sũt æquales. Quod &c.

Vnde constat, quod & fesciquadratrices sunt æquales; & semiquadratrices æquales; & quadratricum æqualia sunt incrementa; & æqualia decremẽta. Quæ &c.

Quare &c.

Theor.

Theor. 2. Prop. 2.

IN tabula speciosa, cuiusque numeri, in duobus quibusque lateribus, vna species, habet pro incremento, massas aggregatas, in utrolibet latere, si quæ sunt præcedentes, atque totam vnitatem minus ordinatam, quam sit ipsum latus: massas inquam, multiplicatas per numeros tabulæ multiplicium, in basi acceptos, vnitatem minus ordinatam, quam sit alterum latus.

Hypoth. 1.

Est in tabula speciosa, in primo, & in quintultimo latere, species *O. 44*: quam in quintultimo latere primam, nullæ species præcedunt: & esto quarta tota *14*.

Dico *O. 44*, incrementum esse *14*.

Demonstrat.

def. 18. b. | Eadem abscissiones totæ, quibus vnitatis, binarius, & deinceps abscinduntur; etiam sesquitotæ, sunt abscissiones: & eadem vtrarumque sunt abscissæ; necnon abscissæ quartæ. Sed præter abscissiones totæ, vna est vltior abscissio sesquitotæ, qua ipsa tota abscinditur: & pro qua post abscissas quartas totæ, & sesquitotæ communes, *def. 26. b.* | accedit tota quarta; sesquitotæ propria: quæ speciei *O. 44*, est incrementum, ad sesquispeciem componendam. Quod &c.

Hypoth. 2.

Est in tabula speciosa, in quarto, & in vltimo latere, species *O. 13*: quam in vltimo latere
 quar-

E L E M E N T V M

quartam, species præcedunt, tertia $O.r2$, secunda $O.r3$ prima $O.r1$: & esto tota vnitate minùs ordinata, quàm sit vltimum latus: quæ profectò, in ordine continuè proportionalium totarum, est ipsa rationalis, atq; vnitas u . Et quoniam $O.r3$, est & in quarto latere, sumatur basis tabulæ multiplicium, vnitate minùs ordinata, nempe tertia, cuius numeri $3, 3$.

Dico $O.r3$, incrementum esse, $O.3r2 + O.3r + O.u + u$.

Demonstr.

Eadem abscissiones, totæ sunt, & sesquitotæ: pro quibus vna pars incrementi $O.r3$ taxabitur. Præter abscissiones totæ, vna est vltior abscissio sesquitotæ, pro qua pars altera eiusdem incrementi taxabitur. Rursum prima pars incrementi, totæ ex partibus componitur, quot sunt abscissiones, totæ, & sesquitotæ communes.

Est autem pro vna abscissione, totæ, & sesquitotæ, communi, eadem quidem abscissa, sed non eadem residua. Cumque totæ residua est r , sesquitotæ residua est $r + u$: quoniam & ipsa sesquitota vnitate maior est, quàm tota. Cum ergo totæ residua tertia est $r3$, & sesquitotæ est, $r3 + 3r2u + 3ru2 + u3$. Et quoniam ratio æqualitatis, quantumlibet multiplicata, semper est eadem: & quantumlibet composita, non variat rationes, quibuscum componitur; huiusmodi au-

tem

def. p. p.

tem est u ad u , ad u , ad u , ad u : eadem ergo
 quantitas est u , atque u & u , quæ u : &
 $3r2u$, quæ $3r2u$ & $r3$ \rightarrow $3r2u$ \rightarrow $3r2u$ \rightarrow u ;
 quæ $r3$ \rightarrow $3r2$ \rightarrow $3r$ \rightarrow u : & sesquiquarta residua
 tertia, est $r3$ \rightarrow $3r2$ \rightarrow $3r$ \rightarrow u : Sed totæ resi-
 dua tertia est u : ergo cuiusque residua incre-
 mentum est $3r2$ \rightarrow $3r$ \rightarrow u : Et omnium residua-
 rum, id est, $O.r3$, omnia incrementa sunt $O.3r2$
 \rightarrow $O.3r$ \rightarrow $O.u$: Quæ potidem æquæ sunt abscissiones
 communes, totæ, & sesquiquarta, & pars prima
 incrementi, taxanda.

Pro ulteriori abscissione propria sesquiquarta, tota fit ab-
 scissa, cuius residua unitas : & massa $O.r3$, ulteriori residua
 fit u , id est u : pars altera incrementi taxanda, Quibus
 ex partibus, totum componitur incrementum speciei $O.r3$,
 quod est, $O.3r2$ \rightarrow $O.3r$ \rightarrow $O.u$ \rightarrow u . Quod &c.

Hypoth. 3.

Esto in tabula speciosa, in quarto, & in quintultimo la-
 tere, species $O.44r3$: quam in quintultimo latere præce-
 dunt species, $O.44r2$, $O.44r$, $O.44$: & esto tota 14 , vni-
 tate minùs ordinata, quàm sit latus quintultimum : & esto
 basis tertia multiplicium, vnitae minùs ordinata, quàm sit
 latus quartum ; in qua basi, numeri sunt 3 , & 3 .

Dico $O.44r3$, incrementum esse, $O.344r2$ \rightarrow $O.344r$
 \rightarrow $O.44$ \rightarrow 14 .

Demonstr.
 Pro communibus enim totæ, & sesquitoræ abscissionibus; vna est pars incrementi: & pro abscissione vltiori, propria sesquitoræ; est altera. Et prioris partis incrementi, tot sunt particule, quot sunt abscissiones communes; nempe, quot abscissæ; quot residue; quot quadrertia: & singulæ particule, singula sunt incrementa quadrertiarum totæ, ad componendas quadrertias sesquitoræ.

Porro totæ, & sesquitoræ, pro eadem abscissione, eadem est abscissa; sed non eadem residua: & eadem est abscissa quarta; sed non eadem residua tertia. cumque residua tertia totæ, est $r3$; residua tertia sesquitoræ, est $r3 + 3r2 + 3r + u$: & cum quadrertia totæ, est $4r3$; quadrertia sesquitoræ est $4r3 + 34r2 + 34r + 4$: & incrementum quadrertiae totæ, ad componendam quadrertiam sesquitoræ, est $34r2 + 34r + 4$. Et omnia simul incrementa quadrertiarum totæ, ad componendas omnes quadrertias sesquitoræ, sunt $O. 34r2 + O. 34r + O. 4$, prior pars incrementi $O. 4r3$.

Pro vltiori abscissione propria sesquitoræ, abscissa est r , residua u : & abscissa quarta $r4$, residua tertia $u3$: & quadrertia vltior propria sesquitoræ, est $r4u3$, vel $r4$: & est posterior pars incrementi $O. 4r3$. Ex quibus partibus integrum componitur incrementum $O. 4r3$, quod est,

$O. 34r2$

$O. 3a4r2 \rightarrow O. 3a4r \rightarrow O. a4 \rightarrow t4.$ Quod &c.

Hypoth. 4.

Esto in tabula speciosa, in quinto, & in quartultimo latere, species $O. a3r4$: quam in quinto latere, præcedūt species, $O. a2r4$, $O. ar4$, $O. r4$: & esto tota $t4$, vnitate minùs ordinata, quàm sit latus quintum: & esto basis tertium multiplicium, vnitate minùs ordinata, quàm sit latus quartultimum; in qua basi sunt numeri 3, 3.

Dico $O. a3r4$, incrementum esse, $O. 3a2r4 \rightarrow O. 3ar4$,
 $\rightarrow O. r4 \rightarrow t4.$

Demonst.

	$O. 3a4r2 : O. 3a2r4.$
	$O. 3a4r : O. 3ar4.$
<i>p. h.</i>	$O. a4 : O. r4.$
	$O. 3a4r2 \rightarrow O. 3a4r \rightarrow O. a4 : O. 3a2r4 \rightarrow O. 3ar4 \rightarrow O. r4.$
<i>p. h.</i>	Sed $O. a4r3$, & $O. a3r4$ æqualia sunt incrementa: & est $O. a4r3$ incrementum $O. 3a4r2 \rightarrow O. 3a4r \rightarrow O. a4 \rightarrow t4.$ Ergo etiam $O. a3r4$ incrementum est $O. 3a2r4 \rightarrow O. 3ar4 \rightarrow O. r4 \rightarrow t4.$ Quod &c.
<i>sup.</i>	
	Quare &c.

Theor. 3. Prop. 3.

IN tabula speciosa, cuiusque numeri, in duobus quibusque lateribus, vna species, habet pro decremento, masas in vno latere præcedentes, multiplicatas per numeros

E

tabu-

tabulæ multiplicium, in basi acceptos, vnitæ minùs ordinata, quàm sit alterum latus: proximam quidem massam, & alternas aggregatas; reliquas verò subtractas. Sed si nullæ sunt præcedentes; quòd species in ipso latere sit prima: pro decremento, habet semitotam, vnitæ minùs ordinatam, quàm sit alterum latus.

Hypoth. 1.

Esto in tabula speciosa, in quinto, & in quartultimo latere, species $O.a3r4$, quam præcedentes, in quartultimo latere, sunt species, $O.a3r3$, $O.a3r2$, $O.a3r$, $O.a3$: quartæ autem basis tabulæ multipliciũ sint numeri 4,6,4.

Dico speciei $O.a3r4$, decrementum esse $O.4a3r3 - O.6a3r2 + O.4a3r - O.a3$.

Demonstr.

def. 19. b | Eadem abscissiones, quibus vnitas, binarius, & deinceps abscinduntur, etiam semitotæ sunt abscissiones; præter vnã propriam totæ, quæ ipsa abscinditur semitota, & vnitas relinquitur.

10. p. | Quantum ad communes attinet abscissiones, cum eadem sint abscissæ, totæ, & semitotæ; non eadem sunt residuæ: cumque totæ residua sit r ; semitotæ residua est $r - u$: & cum totæ residua quarta, sit $r4$; semitotæ residua quarta est $r4 - 4r3 + 6r2 - 4r + u$: cum deniq; totæ triquarta sit $a3r4$; semitotæ triquarta est $a3r4 - 4a3r3 + 6a3r2 - 4a3r + a3$.

Quantum ad non communem attinet abscissionem, si
residua

relida vnitas, vnitate minuatur, profecto nihil remanet: critque r quidem, vnitas; sed $r - u$, nihil: & erit $r4$, vnitas; sed $r4 - 4r3 + 6r2 - 4r + u$, nihil: & triquarta quidem totæ, erit $a3r4$; sed semitoræ alia vltior quasi triquarta $a3r4 - 4a3r3 + 6a3r2 - 4a3r + a3$, nihil. Ideoque perinde est, proprias computare semitoræ triquartas, pro communibus; atque vnã amplius adijcere triquartam nullam, pro non communi abscissione. Quare omnes triquartæ, semitoræ, sunt $O.a3r4 - O.4a3r3 + O.6a3r2 - O.4a3r + O.a3$; reuera pauciores, quàm ipsius totæ sunt abscissiones; sed perinde æquales, atque si totidem numerarentur. Totæ autem, triquartæ omnes, sunt $O.a3r4$; reuera totidem, quot sunt eius abscissiones. Et vtrarumque differentia, $O.4a3r3 - O.6a3r2 + O.4a3r - O.a3$, est decrementũ speciei $O.a3r4$. Quod &c.

Hypoth. 2.

Esto in tabula speciosa, in quarto, & in quintultimo latere, species $O.a4r3$: quam præcedentes in quarto latere, sunt species, $O.a3r3$, $O.a2r3$, $O.ar3$, $O.r3$: quartæ autem basis tabulæ multiplicium, numeri sunt 4, 6, 4.

Dico speciei $O.a4r3$, decrementum esse $O.4a3r3 - O.6a2r3 + O.4ar3 - O.r3$.

Demonstr.

p. h.	$O.6a3r2 : O.6a2r3.$ $O.4a3r : O.4ar3.$ $O.a3 : O.r3.$ $O.4a3r3 - O.6a3r2 + O.4a3r - O.a3 : O.$
-------	--

p. b. $4a_3r_3 - 0.6a_2r_3 + 0.4ar_3 - 0.r_3.$
 sup. Sed $0.a_3r_4$, & $0.a_4r_3$, decrementsa sunt æqualia : & est $0.a_3r_4$, decrementum $0.4a_3r_3 - 0.6a_3r_2 + 0.4a_3r - 0.a_3$: ergo etiam $0.a_4r_3$, decrementum est $0.4a_3r_3 - 0.6a_2r_3 + 0.4ar_3 - 0.r_3$. Quod &c.

Hypoth. 3.

Esto in quartultimo latere, prima species $0.a_3$: & esto semitota tertia m_3 .

Dico, decrementum $0.a_3$, esse m_3 .

Demonstr.

Pro communibus enim totæ, & semitotæ abscissionibus, eadem vtrarumq; sunt abscissæ, & in proposita specie $0.a_3$, residuæ nullæ : pro vltiori verò abscissione, totæ propria, vltima est abscissa, vnitæ minor, quàm tota, id est, semitota m : & vltima abscissa tertia, propria totæ, est m_3 . Quare speciei $0.a_3$, decrementum est m_3 . Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 4. Prop. 4.

Tota quælibet, est æqualis, aggregatis omnibus minus ordinarum abscissarum speciebus, & vnitati, acceptis secundum numeros multiplices, in basi sibi æque ordinata iacentes.

Hypoth.

Esto tota quinta t_5 ; qua minus ordinatæ abscissæ, a_4 , a_3 , a_2 , a , n ; quarum species, $0.a_4$, $0.a_3$, $0.a_2$, $0.a$, $0.n$:

O. u. & esto basis quinta multiplicium, cuius numeri, 5, 10, 10, 5.

Dico *t5* : *O. 544* + *O. 1043* + *O. 1042* + *O. 54* + *O. u* + *u*.

Demonstratio.

<i>p. b.</i>	<p><i>O. 45</i>, & <i>O. 15</i>, æqualia sunt incrementa: quorum alterum, <i>t5</i>; alterum, <i>O. 544</i> + <i>O. 1043</i></p>
<i>2. b.</i>	

Theor. 5. Prop. 5.

Demonstrare, qualiter acceptis totis, quæque massa est æqualis.

Methodus Demonstrationis.

Oportet in demonstrando, procedere, à prioribus basibus tabulæ speciosæ, ad posteriores; & in singulis basibus, ab exterioribus speciebus, ad interiores.

<i>p. b.</i>	<p>Porrò in singulis basibus, pro prima, & vltima specie, vna est demonstratio; item pro secunda, & penultima; pro tertia, & tritultima. Nam, verbi gratia, secunda, qualiter acceptis totis demonstrabitur æqualis; taliter acceptis, æqualis erit etiã penultima: quia constat, secundam, & penultimam, esse æquales.</p>
--------------	---

Sub hoc vno titulo, theoremata conueniunt innumerabilia: cum enim tabula speciosa, sit producibilis in infinitum, habet massas innumerabiles; idest, semper plures, quàm

quàm quot quifque assignauerit.

Vna tamen est omnium communis methodus demon-
strandi, & duo sunt argumenta: vnum, ab æqualibus cu-
iusdam speciei incrementis; alterum ab æqualibus decre-
mentis.

Pro vltiori methodi enarratione, dabimus triginta
sex theoremata; quæ sufficiunt, pro vertice, & basibus ta-
bulæ speciosæ, vsque ad decimam inclusiue: quædam de-
monstrata per vtrumque argumentum; quædam solùm
per alterum; quædam denique sine demonstratione.

1. $O. u : t - u.$

Demonstr. 1.

4. b.	$O. u + u : t.$ $O. u : t - u.$ Quod &c. <i>Demonstr. 2.</i> $O. a.$ decrementsa sunt æqualia.
3. b.	$O. u : m.$
def. 19. b.	$m : t - u.$ $O. u : t - u.$ Quod &c.

2. $O. 2a : t2 = t.$

Demonstr. 1.

4. b.	$O. 2a + O. u + u : t2.$ $O. 2a : t2 = O. u - u.$
sup. 1.	$O. u : t - u.$
p. b.	$O. 2a : t2 = t.$ Quod &c.

De-

Demonstr. 2.

		$O.a2$, decrementa sunt æqualia.
3. b.		$O.2a - Om : m2.$
		$O.2a : m2 + Om.$
def. 21. b.		$m2 : t2 - 2t + u.$
sup. p.		$O.u : t - u.$
		$O.2a : t2 - t.$ Quod &c.

3. $O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t.$

Demonstr. 1.

4. b.		$O.3a2 + O.3a + Om + u : t3.$
		$O.6a2 + O.6a + O.2u + 2 : 2t3.$
		$O.6a2 : 2t3 - O.6a - O.2u - u.$
sup. 2.		$O.6a : 3t2 - 3t.$
sup. p.		$O.2u : 2t - 2.$
		$O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t.$ Quod &c.

Demonstr. 2.

		$O.a3$, decrementa sunt æqualia.
3. b.		$O.3a2 - O.3a + Om : m3.$
		$O.6a2 - O.6a + O.2u : 2m3.$
		$O.6a2 : 2m3 + O.6a - O.2u.$
def. 21. b.		$2m3 : 2t3 - 6t2 + 6t - 2.$
sup. 2.		$O.6a : 3t2 - 3t.$
sup. p.		$O.2u : 2t - 2.$
		$O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t.$ Quod &c.

40

ELEMENTVM

4. $O.6ar : t3 \text{ --- } t.$

Demonstr. 1. $O.42r$, incrementa sunt æqualia.

2. b. $O.2ar + Or + t : O.42 \text{ --- } t2.$

$O.12ar \text{ --- } O.6r \text{ --- } 6t : O.6a2 \text{ --- } 6t2.$

$O.12ar : O.6a2 \text{ --- } O.6r \text{ --- } 6t2 \text{ --- } 6t.$

sup. 3. $O.6a2 : 2t3 \text{ --- } 3t2 \text{ --- } t.$

sup. 2. $O.6r : 3t2 \text{ --- } 3t.$

$O.12ar : 2t3 \text{ --- } 2t.$

$O.6ar : t3 \text{ --- } t.$ Quod &c.

Demonstr. 2. $O.42r$, decrementa sunt æqualia.

3. b. $O.2ar \text{ --- } Or : O.42.$

$O.12ar \text{ --- } O.6r : O.6a2.$

$O.12ar : O.6a2 \text{ --- } O.6r.$

sup. 3. $O.6a2 : 2t3 \text{ --- } 3t2 \text{ --- } t.$

sup. 2. $O.6r : 3t2 \text{ --- } 3t.$

$O.12ar : 2t3 \text{ --- } 2t.$

$O.6ar : t3 \text{ --- } t.$ Quod &c.

5. $O.4a3 : t4 \text{ --- } 2t3 \text{ --- } t2.$

Demonstr.

4. b. $O.4a3 \text{ --- } O.6a2 \text{ --- } O.4a \text{ --- } O.u \text{ --- } u : t4.$

sup. p. $O.u : t \text{ --- } u.$

sup. 2. $O.4a : 2t2 \text{ --- } 2t.$

sup. 3. $O.6a2 : 2t3 \text{ --- } 3t2 \text{ --- } t.$

$$O.4a3 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2 : t4.$$

$$O.4a3 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2. \text{ Quòd \&c.}$$

6. $O.12a2r : t4 \rightarrow t2.$ *Demonst.1.*

$O.a3r$, incrementa sunt æqualia.

2. b. $O.3a2r \rightarrow O.3ar \rightarrow O.r \rightarrow t : O.a3 \rightarrow t3.$

$O.12a2r \rightarrow O.12ar \rightarrow O.4r \rightarrow 4t : O.4a3 \rightarrow 4t3.$

sup. 4. $O.12ar : 2t3 \rightarrow 2t. \quad O.4r : 2t2 \rightarrow 2t.$

sup 5. $O.4a3 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2.$

$O.12a2r \rightarrow 2t3 \rightarrow 2t2 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2.$

$O.12a2r : t4 \rightarrow t2. \text{ Quòd \&c.} \quad \textit{Demonst.2.}$

$O.a3r$, decrementsa sunt æqualia.

3. b. $O.3a2r \rightarrow O.3ar \rightarrow O.r : O.a3.$

$O.12a2r \rightarrow O.12ar \rightarrow O.4r : O.4a3.$

sup. 4. $O.12ar : 2t3 \rightarrow 2t.$

sup. 2. $O.4r : 2t2 \rightarrow 2t.$

sup. 5. $O.4a3 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2.$

$O.12a2r \rightarrow 2t3 \rightarrow 2t2 : t4 \rightarrow 2t3 \rightarrow t2.$

$O.12a2r : t4 \rightarrow t2. \text{ Quòd \&c.}$

7. $O.30a4 : 6t5 \rightarrow 15t4 \rightarrow 30t3 \rightarrow t.$

Demonst.

4. b. $O.5a4 \rightarrow O.10a3 \rightarrow O.10a2 \rightarrow O.5a \rightarrow O.u \rightarrow u : t5.$

$O.60a4 \rightarrow O.120a3 \rightarrow O.120a2 \rightarrow O.60a \rightarrow O.12u$

sup. 2. $O.120a2 : 40t3 \rightarrow 60t2 \rightarrow 20t. \quad O.60a : 30t2 \rightarrow 30t.$

sup. 3. $O.120a2 : 40t3 \rightarrow 60t2 \rightarrow 20t.$

sup. 5. $O.120a3 : 30t4 \rightarrow 60t3 \rightarrow 30t2.$

$$\begin{array}{l} \text{sup. p.} \quad 0.124: 121 - 12. \\ \quad 0.6044 + 304 \rightarrow 2013 + 21: 1215. \\ \quad 0.3044 + 1514 \rightarrow 1013 + 1: 615. \\ \quad 0.3044: 615 \rightarrow 1514 + 1013 \rightarrow t. \text{ Quod \&c.} \end{array}$$

$$8. \quad 0.6043r: 315 \rightarrow 513 + 2t.$$

Demonstr.

$$\begin{array}{l} 3. h. \quad 0.44r, \text{ decrementa sunt aequalia.} \\ \quad 0.443r - 0.642r + 0.44r \rightarrow 0r: 0.44. \\ \quad 0.12043r - 0.18042r + 0.1204r \rightarrow 0.30r: \\ \quad \quad 0.3044. \\ \text{sup. 6.} \quad 0.18042r: 1514 \rightarrow 1512. \\ \text{sup. 4.} \quad 0.1204r: 2013 \rightarrow 201. \\ \text{sup. 2.} \quad 0.30r: 1512 \rightarrow 151. \\ \text{sup. 7.} \quad 0.3044: 615 \rightarrow 1514 + 1013 \rightarrow t. \\ \quad 0.12043r - 1514 + 2013 \rightarrow 51: 615 \rightarrow 1514 + \\ \quad \quad 1013 \rightarrow t. \\ \quad 0.12043r: 615 \rightarrow 1013 + 4t. \\ \quad 0.6043r: 315 \rightarrow 513 + 2t. \text{ Quod \&c.} \end{array}$$

$$9. \quad 0.3042r2: 15 \rightarrow t.$$

Demonstr.

$$\begin{array}{l} 3. h. \quad 0.43r2, \text{ decrementa sunt aequalia.} \\ \quad 0.342r2 - 0.34r2 + 0r2: 0.243r \rightarrow 0.43. \\ \quad 0.18042r2 - 1804r2 + 0.60r2: 0.12043r + \\ \quad \quad 0.6043. \\ \text{sup. 6.} \quad 0.1804r2: 1514 \rightarrow 1512. \end{array}$$

0.60r2:

- $\text{sup. 3. } 0.60r2 : 20r3 - 30r2 + 10r.$
 $\text{sup. 8. } 0.120a3r : 6r5 - 10r3 + 4r.$
 $\text{sup. 5. } 0.60a3 : 15r4 - 30r3 + 15r2.$
 $0.180a2r2 + 15r4 + 20r3 - 15r2 + 10r : 6r5.$
 $- 15r4 + 20r3 - 15r2 + 4r.$
 $0.180a2r2 : 6r5 - 6r.$
 $0.30a2r2 : r5 - 1. \text{ Quod \&c.}$

10. $0.12a5 : 2r6 - 6r5 + 5r4 - r2.$
 11. $0.60a4r : 2r6 - 5r4 + 3r2.$
 12. $0.60a3r2 : r6 - r2.$
 13. $0.42a6 : 6r7 - 2r8 + 2r5 - 7r3 + r.$
 14. $0.84a5r : 2r7 - 7r5 + 7r3 - 2r.$
 15. $0.210a4r2 : 2r7 - 7r3 + 5r.$
 16. $0.420a3r3 : 3r7 + 7r3 - 10r.$
 17. $0.24a7 : 3r8 - 12r7 + 14r6 - 7r4 + 2r2.$
 18. $0.168a6r : 3r8 - 14r6 + 2r4 - 10r2.$
 19. $0.168a5r2 : r8 - 7r4 + 6r2.$
 20. $0.840a4r3 : 3r8 + 7r4 - 10r2.$
 21. $0.90a8 : 10r9 - 45r8 + 60r7 - 42r5 + 20r3$
 $- 3r.$
 22. $0.360a7r : 5r9 - 30r7 + 63r5 - 50r3 + 12r.$
 23. $0.1260a6r2 : 5r9 - 63r5 + 100r3 - 42r.$
 24. $0.2520a5r3 : 5r9 + 2r5 - 110r3 + 84r.$
 25. $0.630a4r4 : r9 + 20r3 - 2r.$
 26. $0.20a9 : 2r10 - 10r9 + 15r8 - 14r6 + 10r4$
 $- 3r2.$

27. $O.180a8r: 2110 - 1518 + 4216 + 5014 + 2111.$
 28. $O.360a7r2: 110 - 2116 + 5014 - 3011.$
 29. $O.840a6r3: 110 + 716 - 5014 + 4212.$
 30. $O.1260a5r4: 110 + 2014 - 2112.$
 31. $O.660a10: 6111 + 33110 + 5519 + 6617 + 6615 - 3313 + 56.$
 32. $O.660a9r: 6111 + 5519 + 19817 - 33015 + 23113 - 501.$
 33. $O.990a8r2: 2111 - 6617 + 22015 - 23113 + 751.$
 34. $O.1320a7r3: 1111 + 1117 - 11015 + 19813 - 1001.$
 35. $O.2310a6r4: 1111 + 5515 - 23113 + 1751.$
 36. $O.2772a5r5: 1111 - 2215 + 23113 - 2101.$

Et in infinitum, eadem methodo supra tradita, potest demonstrari, qualiter acceptis totis, quæque massa est æqualis.

Theor. 6. Prop. 6.

Demonstrare, qualiter acceptis semitotis, quæque massa est æqualis.

Meth. Demonstr.

Oportet præsupponere theoremata demonstrata in præcedenti, sua cuiusque massæ propria: deinde totas resolvere in semitotas, per *def. 19. h.* & per *8. p.* vt sequitur.

t: m + n.

t2: m2 + 2m + n.

$$e3 : m^3 + 3m^2 + 3m + u.$$

$$e4 : m^4 + 4m^3 + 6m^2 + 4m + u.$$

$$e5 : m^5 + 5m^4 + 10m^3 + 10m^2 + 5m + u.$$

$$e6 : m^6 + 6m^5 + 15m^4 + 20m^3 + 15m^2 + 6m + u.$$

$$e7 : m^7 + 7m^6 + 21m^5 + 35m^4 + 35m^3 + 21m^2 + 7m + u.$$

$$e8 : m^8 + 8m^7 + 28m^6 + 56m^5 + 70m^4 + 56m^3 + 28m^2 + 8m + u.$$

$$e9 : m^9 + 9m^8 + 36m^7 + 84m^6 + 126m^5 + 126m^4 + 84m^3 + 36m^2 + 9m + u.$$

$$e10 : m^{10} + 10m^9 + 45m^8 + 120m^7 + 210m^6 + 252m^5 + 210m^4 + 120m^3 + 45m^2 + 10m + u.$$

$$e11 : m^{11} + 11m^{10} + 55m^9 + 165m^8 + 330m^7 + 462m^6 + 462m^5 + 330m^4 + 165m^3 + 55m^2 + 11m + u.$$

Vnde, pro triginta sex theorematis propositis in præcedenti, & demonstrabilibus, alia triginta sex proponemus, in præsentī, demonstrabilia, videlicet.

1. $O. u : m.$

2. $O. 2a : m^2 \rightarrow m.$

3. $O. 6a^2 : 2m^3 + 3m^2 + m.$

4. $O. 6ar : m^3 + 3m^2 + 2m.$

5. $O. 4a^3 : m^4 + 2m^3 + m^2.$

6. $O. 12a^2r : m^4 + 4m^3 + 5m^2 + 2m.$

7. $O. 30a^4 : 6m^5 + 15m^4 + 10m^3 - m.$

8. $O. 60a^3r : 3m^5 + 15m^4 + 25m^3 + 15m^2 + 2m.$

9. $O.$

quartam, species præcedunt, tertia $O.r2$, secunda $O.r3$, prima $O.u$ & esto tota vnitate minùs ordinata, quàm sit vltimum latus: quæ profectò, in ordine continuè proportionalium totorum, est ipsa rationalis, atq; vnitas u . Et quoniam $O.r3$ est & in quarto latere, sumatur basis tabulæ multiplicium, vnitate minùs ordinata, nempe tertia, cuius numeri 3, 3.

Dico $O.r3$, incrementum esse, $O.3r2 + O.3r + O.u + u$.

Demonstr.

Eadem abscissiones, totæ sunt, & sesquitoræ: pro quibus vna pars incrementi $O.r3$ taxabitur. Præter abscissiones totæ, vna est vltior abscissio sesquitoræ, pro qua pars altera eiusdem incrementi taxabitur. Rursum prima pars incrementi, totæ ex partibus componitur, quot sunt abscissiones, totæ, & sesquitoræ communes.

Est autem pro vna abscissione, totæ, & sesquitoræ, communi, eadem quidem abscissa, sed non eadem residua. Cumque totæ residua est r , sesquitoræ residua est $r + u$: quoniam & ipsa sesquitoræ vnitate maior est, quàm tota. Cum ergo totæ residua tertia est $r3$, sesquitoræ est, $r3 + 3r2u + 3ru2 + u3$. Et quoniam ratio æqualitatis, quantumlibet multiplicata, semper est eadem: & quantumlibet composita, non variat rationes, quibuscum componitur: huiusmodi autem

def. p. p.

tem est u ad u , ad u^2 , ad u^3 : eadem ergo
 quantitas est u^3 , atque u^2 & u , & u^2 , quæ u^3 : &
 $3u^2u$, quæ $3u^2$ & u^3 & $3u^2u$ & $3u^2u$ & u^3 ,
 quæ u^3 & $3u^2$ & $3u$ & u : & sesquitoræ residua
 tertia, est u^3 & $3u^2$ & $3u$ & u : Sed totæ resi-
 dua tertia est u^3 : ergo cuiusque residua incre-
 menti p. m. est $3u^2$ & $3u$ & u : Et omnium residuar-
 um, idest, $O. r^3$, omnia incrementa sunt $O. 3r^2$
 $\rightarrow O. 3r$ & $O. u$: Quæ poridem æquos sunt abscissiones
 communes, totæ, & sesquitoræ : & pars prima
 incrementi taxanda.

Pro ulteriori abscissione propria sesquitoræ, totæ fit ab-
 scissa, cuius residua unitas : & massæ $O. r^3$, vterior residua
 fit u^3 , idest u : pars altera incrementi taxanda. Quibus
 ex partibus, totum componitur incrementum speciei $O. r^3$,
 quod est, $O. 3r^2$ & $O. 3r$ & $O. u$ & u . Quod &c.

Hypoth. 3.

Esto in tabula speciosa, in quarto, & in quintultimo la-
 tere, species $O. a^4r^3$: quam in quintultimo latere præce-
 dunt species, $O. a^4r^2$, $O. a^4r$, $O. a^4$: & esto tota 14 , vni-
 tate minùs ordinata, quàm sit latus quintultimum : & esto
 basis tertia multiplicium, vnitae minùs ordinata, quàm sit
 latus quartum ; in qua basi, numeri sunt 3 , & 3 .

Dico $O. a^4r^3$, incrementum esse, $O. 3a^4r^2$ & $O. 3a^4r$
 & $O. a^4$ & 14 .

De-

$$330m7 + 462m6 + 517m5 + 605m4 + 484m3 - 88m2 - 232m.$$

$$36. 0.2772a5r5 : m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 + 330m7 + 462m6 + 440m5 + 220m4 + 176m3 + 528m2 + 384m.$$

Sicut autem possibile est, ultra decimam basim speciosa tabulæ, in demonstrando procedere, in præcedenti; & ostendere, qualiter accepis totis quæque massa est æqualis: ita possibile est in præsentis procedere; & demonstrare, qualiter accepis semitotis, quæque massa est æqualis.

Theor. 7. Prop. 7.

Demonstrare, qualiter accepis sesquitotis, quæque massa est æqualis.

Meth. Demonstr.

Oportet præsupponere theoremata, demonstrata sub titulo *prop. 5. h.* sua cuiusque propria: deinde totas resolvere in sesquitotas per *def. 18. h.* & per *10. p.* ut sequitur.

$$1: 9 - u.$$

$$12: 92 - 29 + u.$$

$$13: 93 - 39 + u.$$

$$14: 94 - 49 + 692 - 49 + u.$$

$$15: 95 - 594 + 1093 - 1092 + 59 - u.$$

$$16: 96 - 692 + 1594 - 2093 + 1592 - 69 - u.$$

$$17: 97 - 796 + 2195 - 3594 + 3593 - 2192 + 79 - u.$$

$$18: 98 - 897 + 2896 - 5095 + 7094 - 5093 + 2892 -$$

$$89 - u.$$

$$19: 99 - 998 + 3697 - 8496 + 12695 - 12694 + 8493 \\ - 3692 + 99 - u.$$

$$20: 910 - 1099 + 4598 - 12097 + 21096 - 25295 \\ + 21094 - 12093 + 4592 - 1099 + u.$$

$$21: 911 - 11910 + 5599 - 16598 + 33097 - 46296 \\ + 46295 - 33094 + 16593 - 5592 + 119 - u.$$

Vnde, pro triginta sex theorematibus, propositis in 5. h. alia triginta sex proponemus, in præfenti, demonstrabilia, videlicet.

1. $O. u: 9 - 2.$

2. $O. 2a: 92 - 39 + 2.$

3. $O. 6a2: 293 - 992 + 139 - 6.$

4. $O. 6a: 93 - 392 + 29.$

5. $O. 4a3: 94 - 693 + 1392 + 1929 + 4.$

6. $O. 12a2r: 94 - 493 + 592 - 29.$

7. $O. 30a4: 695 - 4594 + 13093 - 18092 + 1199 \\ - 30.$

8. $O. 60a3r: 395 - 1594 + 2593 - 1592 + 29.$

9. $O. 30a2r2: 95 - 594 + 1093 - 1092 + 49.$

10. $O. 12a5: 296 - 1895 + 6394 - 12093 + 11992 - \\ 609 + 12.$

11. $O. 60a4r: 396 - 2295 + 2594 - 2093 + 392 - 19.$

12. $O. 60a3r2: 96 - 695 + 1594 - 1093 + 1492 - 49.$

13. $O. 42a6: 697 - 6396 + 27395 - 63094 + 83393 \\ - 63092 + 2539 - 42.$

14. $O. 84a5r: 297 - 2496 + 3595 - 3594 + 795 + \\ 792 - 219 - 84.$

15. $O.21044r2:297r-1496+4295-7094+6393$
 $--2192--29.$
16. $O.42043r3:397-2196+6395-10594+11293$
 $--8492+329.$
17. $O.2447:398-3697+18296-50495+83394$
 $--84093+50692-1689+24.$
18. $O.16846r:398-2497+7096-8495+2194+$
 $2893--1092--49.$
19. $O.16845r2:98-897+2896-5695+6394--$
 $2893--892+89.$
20. $O.84044r3:398-2497+8496-16895+21794$
 $--19693+11692--329.$
21. $O.9048:1099--13598+78097--252096+$
 $499895+630094+506093--252092+7179$
 $--90.$
22. $O.36047r:599--4598+15097--21096+$
 $6395+10594--5093--3092+129.$
23. $O.126046r2:599--4598+18097--42096+$
 $56795--31594--111093+15092--129.$
24. $O.252045r3:599--4598+18097--42096+$
 $65195--73594+52093--6092--969.$
25. $O.63044r4:99--998+3697--4896+12695+$
 $12694+10493--9692+489.$
26. $O.2049:2910--3099+19598--72047+166696$
 $--252095+253094--168093+71792--1809+20$
27. $O.18048r:2910--2099+7598--12097+$
 $4296+8495--5094--4093+2192+69.$

S E C V N D V M.

31

28. $O.360a7r2: 410 \rightarrow 699 + 4598 \rightarrow 12097 + 18996$
 $\rightarrow 12695 \rightarrow 3594 + 10093 \rightarrow 249.$
29. $O.840a6r3: 910 \rightarrow 1099 + 4598 \rightarrow 12097 + 21796$
 $\rightarrow 29495 + 26594 \rightarrow 6093 \rightarrow 10892 + 649.$
30. $O.1260a5r4: 910 \rightarrow 1099 + 4598 \rightarrow 12097 +$
 $21096 \rightarrow 25295 + 23094 \rightarrow 20093 + 14492 \rightarrow 489.$
31. $O.66a10: 6911 \rightarrow 99910 + 71599 \rightarrow 297098 +$
 $785497 \rightarrow 1386096 + 1669895 \rightarrow 1386094 +$
 $788793 \rightarrow 297092 + 6659 \rightarrow 66.$
32. $O.660a9r: 6911 \rightarrow 66910 + 27599 \rightarrow 49598 +$
 $19897 + 46296 \rightarrow 33095 \rightarrow 33094 + 23193 +$
 $9992 \rightarrow 509.$
33. $O.990a8r2: 2911 \rightarrow 22910 + 11099 \rightarrow 33098 +$
 $59497 \rightarrow 46296 \rightarrow 24295 + 55094 \rightarrow 1193 \rightarrow$
 $23192 + 429.$
34. $O.1320a7r3: 911 \rightarrow 11910 + 5599 \rightarrow 16598 +$
 $34197 \rightarrow 33996 + 58395 \rightarrow 16594 \rightarrow 35293 +$
 $22092 + 329.$
35. $O.2310a6r4: 911 \rightarrow 11910 + 5599 \rightarrow 16598 +$
 $33097 \rightarrow 46296 + 51795 \rightarrow 60594 + 48493 + 8892$
 $\rightarrow 2329.$
36. $O.2772a5r5: 911 \rightarrow 11910 + 5599 \rightarrow 16598 +$
 $33097 \rightarrow 46296 + 44095 \rightarrow 22094 + 17693 \rightarrow$
 $52892 + 3849.$

Sicut autem possibile est, ultra decimam basim speciose
 tabule demonstrare, qualiter acceptis totis que que massa
 est æqualis, iuxta methodum, & sic possibile est, etiam in

presenti procedere in infinitum, & demonstrare, etiam
 ultra decimam basim, qualiter acceptis sesquiquis, quæ-
 que massa est æqualis.

Theor. 8. Prop. 8.

Demonstrare, qualiter acceptis primi lateris specie-
 bus, quæque massa est æqualis.

Meth. Demonstr.

Sub hoc vno titulo, innumerabilia theorematum cense-
 rentur, quorum vna communis est methodus demon-
 strandi, per 5. h. resoluendo massas, in totas sibi æquales;
 & per 4. h. resoluendo totas, in species primi lateris sibi
 æquales.

Pro vltiori methodi enarratione, proponemus vi-
 ginti quinque theorematum, vnum cum demonstratione, &
 reliqua sine demonstratione, quæ possunt facile demon-
 strari, secundum methodum assignatam.

1. $0.2a : 0.02 + 0.a$

Demonstr.

g. b.	0.6ar : t3 — t.
p. b.	t3 : 0.3a2 + 0.3a + 0.u + u.
	t : 0.u + u.
	0.6ar : 0.3a2 + 0.3a.
	0.2ar : 0.a2 + 0.a. Quod, &c.

2. $0.6a2r : 0.2a3 + 0.3a2 + 0.a$

3. $0.4a3r : 0.a4 + 0.2a3 + 0.a2$

4. $- 0.622r1: 0.44 + 0.243 + 0.242 + 0.4.$
5. $0.3044r: 0.645 + 0.1544 + 0.1043 - 0.4.$
6. $0.6043r2: 0.645 + 0.1544 + 0.2043 + 0.1542$
 $+ 0.44.$
7. $0.1245r: 0.246 + 0.645 + 0.344 - 0.42.$
8. $0.3044r2: 0.246 + 0.645 + 0.1044 + 0.1043 +$
 $0.342 - 0.4.$
9. $0.2043r3: 0.46 + 0.745 + 0.544 + 0.543 + 0.442$
 $- 0.24.$
10. $0.4246r2: 0.647 + 0.2146 + 0.2145 - 0.743 + 0.4.$
11. $0.8445r2: 0.447 + 0.1446 + 0.2845 + 0.3544 +$
 $0.1443 - 0.742 - 0.44.$
12. $0.42044r3: 0.1247 + 0.4246 + 0.8445 + 0.10544$
 $+ 0.9843 + 0.6342 + 0.164.$
13. $0.2447r: 0.348 + 0.1247 + 0.1446 - 0.744 +$
 $0.242.$
14. $0.8446r2: 0.348 + 0.1247 + 0.2846 + 0.4245 +$
 $0.2144 - 0.1443 - 0.1042 + 0.24.$
15. $0.16845r3: 0.348 + 0.1247 + 0.2846 + 0.4245$
 $0.4944 + 0.4243 + 0.442 - 0.124.$
16. $0.21044r4: 0.348 + 0.1247 + 0.2846 + 0.4245 +$
 $0.4244 + 0.2843 + 0.3242 + 0.234.$
17. $0.9048r: 0.1049 + 0.4548 + 0.6047 - 0.4245 +$
 $0.2043 - 0.34.$
18. $0.36047r2: 0.1049 + 0.4548 + 0.12047 +$
 $0.21046 + 0.12645 - 0.10544 - 0.10043$
 $0.3044 + 0.244.$
19. $0.$

9. $O.30a2r2: m5 + 5m4 + 10m3 + 10m2 + 4m.$
10. $O.12a5: 2m6 + 6m5 + 5m4 - m2.$
11. $O.60a4r: 2m6 + 12m5 + 25m4 + 20m3 + 3m2 - 2m.$
12. $O.60a3r2: m6 + 6m5 + 15m4 + 20m3 + 14m2 + 4m.$
13. $O.42a6: 6m7 + 21m6 + 21m5 - 7m3 + m.$
14. $O.84a5r: 2m7 + 14m6 + 35m5 + 35m4 + 7m3 - 7m2 - 2m.$
15. $O.210a4r2: 2m7 + 14m6 + 42m5 + 70m4 + 63m3 + 21m2 - 2m.$
16. $O.420a3r3: 3m7 + 21m6 + 63m5 + 105m4 + 112m3 + 84m2 + 32m.$
17. $O.24a7: 3m8 + 12m7 + 14m6 - 7m4 + 2m2.$
18. $O.168a6r: 3m8 + 24m7 + 70m6 + 84m5 + 21m4 - 28m3 - 10m2 + 4m.$
19. $O.168a5r2: m8 + 8m7 + 28m6 + 56m5 + 63m4 + 28m3 - 8m2 - 8m.$
20. $O.840a4r3: 3m8 + 24m7 + 84m6 + 168m5 + 217m4 + 196m3 + 116m2 + 32m.$
21. $O.90a8: 10m9 + 45m8 + 60m7 - 42m5 + 20m3 - 3m.$
22. $O.360a7r: 5m9 + 45m8 + 150m7 + 210m6 + 63m5 - 105m4 - 50m3 + 30m2 + 12m.$
23. $O.1260a6r2: 5m9 + 45m8 + 180m7 + 420m6 + 567m5 + 315m4 - 110m3 - 150m2 - 12m.$
24. $O.2520a5r3: 5m9 + 45m8 + 180m7 + 420m6 + 651m5$

S E C V N D V M.

47.

$$651m5 + 735m4 + 520m3 + 60m2 + 96m.$$

$$25. O.63044r4: m9 + 9m8 + 36m7 + 84m6 + 126m5 \\ + 126m4 + 104m3 + 96m2 + 48m.$$

$$26. O.2049: 2m10 + 10m9 + 15m8 - 14m6 + 10m4 \\ - 3m2.$$

$$27. O.18048r: 2m10 + 20m9 + 75m8 + 120m7 + 42m6 \\ - 84m5 - 50m4 + 40m3 + 21m2 - 6m.$$

$$28. O.36047r2: m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 + \\ 189m6 + 126m5 - 55m4 - 100m3 + 24m.$$

$$29. O.84046r3: m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 + \\ 217m6 + 294m5 + 265m4 + 60m3 - 108m2 - \\ 64m.$$

$$30. O.126045r4: m10 + 10m9 + 45m8 + 120m7 + \\ 210m6 + 252m5 + 230m4 + 200m3 + 144m2 + \\ 48m.$$

$$31. O.66410: 6m11 + 33m10 + 55m9 - 66m7 + \\ 66m5 - 33m3 + 5m.$$

$$32. O.66049r: 6m11 + 66m10 + 275m9 + 495m8 + \\ 198m7 - 462m6 - 330m5 + 330m4 + 231m3 \\ - 99m2 - 50m.$$

$$33. O.99048r2: 2m11 + 22m10 + 110m9 + 330m8 + \\ 594m7 + 462m6 - 242m5 - 550m4 - 11m3 \\ + 231m2 + 42m.$$

$$34. O.132047r3: m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 + \\ 341m7 + 539m6 + 583m5 + 465m4 - 352m3 \\ - 220m2 + 32m.$$

$$35. O.231046r4: m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 + \\ 330m7$$

$$330m7 + 462m6 + 517m5 + 605m4 + 484m3 - 88m2 - 232m.$$

$$36. 0.277245r5 : m11 + 11m10 + 55m9 + 165m8 + 330m7 + 462m6 + 440m5 + 220m4 + 176m3 + 528m2 + 384m.$$

Sicut autem possibile est, ultra decimam basim speciosa tabulæ, in demonstrando procedere, in præcedenti; & ostendere, qualiter accepis totis quæque massa est æqualis: ita possibile est in præsentis procedere; & demonstrare, qualiter accepis semitotis, quæque massa est æqualis.

Theor. 7. Prop. 7.

Demonstrare, qualiter accepis sesquitotis, quæque massa est æqualis.

Meth. Demonstr.

Oportet præsupponere theoremata, demonstrata sub titulo *prop. 5. h.* sua cuiusque propria: deinde totas resolvere in sesquitotas per *def. 18. h.* & per *16. p.* ut sequitur.

$$1: q - u.$$

$$12: 92 - 2q + u.$$

$$13: 93 - 3q2 + 3q - u.$$

$$14: 94 - 4q3 + 6q2 - 4q + u.$$

$$15: 95 - 5q4 + 10q3 - 10q2 + 5q - u.$$

$$16: 96 - 6q5 + 15q4 - 20q3 + 15q2 - 6q - u.$$

$$17: 97 - 7q6 + 21q5 - 35q4 + 35q3 - 21q2 + 7q - u.$$

$$18: 98 - 8q7 + 28q6 - 56q5 + 70q4 - 56q3 + 28q2 - 8q + u.$$

$$19: 99 \rightarrow 998 + 3697 \rightarrow 8496 + 12695 \rightarrow 12694 + 8493 \\ - 3692 + 99 - u.$$

$$20: 910 \rightarrow 1099 + 4598 \rightarrow 12097 + 21096 \rightarrow 25295 \\ + 21094 \rightarrow 12093 \rightarrow 4592 \rightarrow 1091 - u.$$

$$21: 911 \rightarrow 11910 \rightarrow 5599 \rightarrow 16598 \rightarrow 33097 \rightarrow 46296 \\ + 46295 \rightarrow 33094 \rightarrow 16593 \rightarrow 5592 \rightarrow 1191 - u.$$

Vnde, pro triginta sex theorematibus, propositis in *5. h.* alia triginta sex proponemus, in præfenti, demonstrabilia, videlicet.

1. $O. u: 9 \rightarrow 2.$
2. $O. 2a: 92 \rightarrow 39 + 2.$
3. $O. 6a2: 293 \rightarrow 992 + 139 \rightarrow 6.$
4. $O. 6a: 93 \rightarrow 392 + 29.$
5. $O. 4a3: 94 \rightarrow 693 + 1392 + 129 \rightarrow 4.$
6. $O. 12a2r: 94 \rightarrow 493 + 592 \rightarrow 29.$
7. $O. 30a4: 695 \rightarrow 4594 + 13093 \rightarrow 18092 \rightarrow 1199 \\ \rightarrow 30.$
8. $O. 60a3r: 395 \rightarrow 1594 + 2593 \rightarrow 1592 + 29.$
9. $O. 30a2r2: 95 \rightarrow 594 + 1093 \rightarrow 1092 + 49.$
10. $O. 12a5: 296 \rightarrow 1895 \rightarrow 6394 \rightarrow 12093 \rightarrow 11992 \rightarrow \\ 609 + 12.$
11. $O. 60a4r: 296 \rightarrow 2295 + 2594 \rightarrow 2093 \rightarrow 392 \rightarrow 29.$
12. $O. 60a3r2: 96 \rightarrow 695 + 1594 \rightarrow 2093 \rightarrow 1492 \rightarrow 49.$
13. $O. 42a6: 697 \rightarrow 6396 \rightarrow 27395 \rightarrow 63094 \rightarrow 83398 \\ \rightarrow 63092 \rightarrow 2539 \rightarrow 42.$
14. $O. 84a5r: 297 \rightarrow 1496 \rightarrow 3595 \rightarrow 3594 \rightarrow 795 \rightarrow \\ 795 \rightarrow 219 \rightarrow 209 \rightarrow 3 \rightarrow 2.$

15. $O.21044r2: 297 - 1496 + 4295 - 7094 + 6393$
 $- 2192 - 29.$
16. $O.42043r3: 397 - 2196 + 6395 - 10594 + 11293$
 $- 8492 + 329.$
17. $O.2447: 398 - 3697 + 18296 - 50495 + 83394$
 $- 84093 + 50692 - 1689 + 24.$
18. $O.16846r: 398 - 2497 + 7096 - 8495 + 2194 +$
 $2893 - 1092 - 49.$
19. $O.16845r2: 98 - 897 + 2896 - 5695 + 6394 -$
 $2893 - 892 + 89.$
20. $O.84044r3: 398 - 2497 + 8496 - 16895 + 21794$
 $- 19693 + 11692 - 329.$
21. $O.9048: 1099 - 13598 + 78097 - 252096 +$
 $499895 - 630094 + 506093 - 252092 + 7179$
 $- 90.$
22. $O.36047r: 599 - 4598 + 15097 - 21096 +$
 $6395 + 10594 - 5093 - 3092 + 129.$
23. $O.126046r2: 599 - 4598 + 18097 - 42096 +$
 $56795 - 31594 - 11093 + 15092 - 129.$
24. $O.252045r3: 599 - 4598 + 18097 - 42096 +$
 $65195 - 73594 + 52093 - 6092 - 969.$
25. $O.63044r4: 99 - 998 + 3697 - 4896 + 12695 +$
 $12694 + 10493 - 9692 + 489.$
26. $O.2049: 2910 - 3099 + 19598 - 72097 + 166696$
 $- 252095 + 253094 - 168093 + 71792 - 1809 + 20$
27. $O.18048r: 2910 - 2099 + 7598 - 12097 +$
 $4296 + 8495 - 5094 - 4093 + 2192 + 69.$

S E C V N D V M.

31

28. $O.36047r2:410 - 669 - 4598 - 12097 + 18996$
 $- 12695 - 5594 + 10093 - 249.$
29. $O.84046r3:910 - 1099 + 4598 - 12097 + 21796$
 $- 29495 + 26594 - 6093 - 10892 + 649.$
30. $O.126045r4:910 - 1099 + 4598 - 12097 +$
 $21096 - 25295 + 23094 - 26093 + 14492 - 489.$
31. $O.660410:6911 - 99910 + 71599 - 297098 +$
 $785497 - 1386096 + 1669895 - 1386094 +$
 $788793 - 297092 + 6659 - 66.$
32. $O.66049r:6911 - 66910 + 27599 - 49598 +$
 $19897 + 46296 - 33095 - 33094 + 23193 +$
 $9992 - 509.$
33. $O.99048r2:2911 - 22910 + 11099 - 33098 +$
 $59497 - 46296 - 24295 + 55094 - 1193 -$
 $23192 + 429.$
34. $O.132047r3:911 - 11910 + 5599 - 16598 +$
 $34197 - 33996 + 58395 - 16594 - 35293 +$
 $22092 + 329.$
35. $O.231046r4:911 - 11910 + 5599 - 16598 +$
 $33097 - 46296 + 51795 - 60594 + 48493 + 8892$
 $- 2329.$
36. $O.277245r5:911 - 11910 + 5599 - 16598 +$
 $33097 - 46296 + 44095 - 22094 + 17693 -$
 $52892 + 3849.$

Sicut autem possibile est, vltra decimam basim speciose
 tabulæ demonstrare, qualiter acceptis totis quæque massa
 est æqualis, iuxta methodum hanc possibile est, etiam in

presenti procedere in infinitum, & demonstrare, etiam
ultra decimam basim, qualiter acceptis sesquiquis, quæ
que massa est æqualis.

Theor. 8. Prop. 8.

Demonstrare, qualiter acceptis primi lateris specie-
bus, quæque massa est æqualis.

Meth. Demonstr.

Sub hoc vno titulo, innumerabilia theoremata cense-
ri possent, quorum vna communis est methodis demon-
strandis, per 5. h. resoluendo massas, in totas sibi æquales;
& per 4. h. resoluendo totas, in species primi lateris sibi
æquales.

Pro ulteriori methodi enarratione, proponemus vi-
ginti quinque theoremata, vnum cum demonstratione, &
reliqua sine demonstratione, quæ possunt facile demon-
strari, secundum methodum assignatam.

1. $0.2ar : 0.42 + 0.a.$

Demonstr.

y. b.	0.6ar : t3 — t.
z. b.	t3 : 0.3a2 + 0.3a + 0.u + u.
	t : 0.u + u.
	0.6ar : 0.3a2 + 0.3a.
	0.2ar : 0.a2 + 0.a. Quod, &c.

2. $0.6ar : 0.2a3 + 0.3a2 + 0.a.$

3. $0.4a3r : 0.a4 + 0.2a3 + 0.a2.$

4. $- 0.622r12 : 0.24 + 0.243 + 0.242 + 0.24.$
5. $0.3044r1 : 0.645 + 0.1544 + 0.1043 - 0.24.$
6. $0.6043r2 : 0.645 + 0.1544 + 0.2043 + 0.1542$
 $- 0.44.$
7. $0.1245r1 : 0.246 + 0.645 + 0.344 - 0.24.$
8. $0.3044r2 : 0.246 + 0.645 + 0.1044 + 0.1043 +$
 $0.342 - 0.24.$
9. $0.2043r3 : 0.246 + 0.745 + 0.544 + 0.543 + 0.442$
 $- 0.24.$
10. $0.4246r2 : 0.647 + 0.2146 + 0.2145 - 0.743 + 0.24.$
11. $0.8445r2 : 0.447 + 0.1446 + 0.2845 + 0.3544 +$
 $0.1443 - 0.742 - 0.44.$
12. $0.42044r3 : 0.1247 + 0.4246 + 0.8445 + 0.10544$
 $+ 0.9843 + 0.6342 + 0.164.$
13. $0.2447r1 : 0.348 + 0.1247 + 0.1446 - 0.744 +$
 $0.242.$
14. $0.8446r2 : 0.348 + 0.1247 + 0.2846 + 0.4245 +$
 $0.2144 - 0.1443 - 0.1042 + 0.24.$
15. $0.16845r3 : 0.348 + 0.1247 + 0.2846 + 0.4245$
 $0.4944 + 0.4243 + 0.442 - 0.124.$
16. $0.21044r4 : 0.348 + 0.1247 + 0.2846 + 0.4245 +$
 $0.4244 + 0.7843 + 0.3242 + 0.234.$
17. $0.9048r1 : 0.1049 + 0.4548 + 0.6047 - 0.4245 +$
 $0.2043 - 0.34.$
18. $0.36047r2 : 0.1049 + 0.4548 + 0.12047 +$
 $0.21046 + 0.12645 - 0.10544 - 0.10043$
 $0.3044 + 0.244.$
19. 0.1049

19. $O.84046r3 : O.1049 + O.4548 + O.12047 +$
 $O.21046 + O.29445 + O.31544 + O.6043 -$
 $O.15042 = O.644.$
20. $O.126045r4 : O.1049 + O.4548 + O.12047 +$
 $O.21046 + O.25245 + O.21044 + O.20043 +$
 $O.16542 + O.48a.$
21. $O.2049r : O.2410 + O.1049 + O.1548 - O.1446$
 $+ O.1044 - O.342.$
22. $O.9048r2 : O.2410 + O.1049 + O.3048 + O.6047$
 $+ O.4246 - O.4245 - O.5044 + O.2043 + O.2142$
 $- O.34.$
23. $O.12047r3 : O.410 + O.549 + O.1548 + O.3047 +$
 $O.4946 + O.6345 + O.1544 - O.5043 - O.2042$
 $+ O.12a.$
24. $O.21046r4 : O.410 + O.549 + O.1548 + O.3047 +$
 $O.4246 + O.4245 + O.5544 + O.6543 - O.842 -$
 $O.37a.$
25. $O.25245r5 : O.410 + O.549 + O.1548 + O.3047 +$
 $O.4246 + O.4245 + O.2044 - O.543 + O.4842 +$
 $O.54a.$

Alique possunt in infinitum proponi theoremata, & demonstrari, quibus pateat, qualiter acceptis primitivis speciebus, quaeque massa est aequalis.

Theor. 9. Prop. 9.

Demonstrare, quae, & qualiter acceptae, totae species in eadem basi vicinas, aequaliter acceptas, aequales faciant.

Ex

S E C V N D V M. 55

Ex innumerabilibus theorematibus, quæ sunt huius tituli, proponimus viginquaque & ex his quatuor solummodo demonstramus; quæ sufficiunt, ad ostendendam methodum.

1. $O.2a2+t2 : O.4ar+t.$

Demonstr.

s. b. $O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t.$

$O.6a2 + 3t2 - t : 2t3.$

s. b. $O.6ar : t3 - t.$ $O.12ar : 2t3 - 2t.$

$O.12ar + 2t : 2t3.$

$O.6a2 + 3t2 - t : O.12ar + 2t.$

$O.6a2 + 3t2 : O.12ar + 3t.$

$O.2a2 + t2 : O.4ar + t.$ Quod &c.

2. $O.2a3+t3 : O.6a2r+t2.$

Demonstr.

s. b. $O.4a3 : t4 - 2t3 + t2.$ $O.4a3 + 2t3 - t2 : t4.$

s. b. $O.12a2r : t4 - t2.$ $O.12a2r + t2 : t4.$

$O.4a3 + 2t3 - t2 : O.12a2r + t2.$

$O.4a3 + 2t3 : O.12a2r + 2t2.$

$O.2a3 + t3 : O.6a2r + t2.$ Quod &c.

3. $O.6a4+t4+t : O.24a3r+4t3.$

Demonstr.

s. b. $O.30a4 : 6t5 - 15t4 + 10t3 - t.$

$O.30a4 + 15t4 - 10t3 + t : 6t5.$

s. b. $O.60a3r : 3t5 - 5t3 + 2t.$

$O.60a3r + 5t3 - 2t : 3t5.$

$O.120a3r$

$$\begin{aligned}
 5. b. & \quad 0.120a3r + 10a3 - 4t : 6t5. \\
 & \quad 0.30a4 + 15t4 - 1a3 - t : 0.120a3r + 10t3 - \\
 & \quad 4t. \\
 & \quad 0.30a4 + 15t4 + 5t : 0.120a3r + 20t3. \\
 & \quad 0.6a4 + 3t4 - t : 0.24a3r + 4t3. \text{ Quod \&c.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. & \quad 0.12a3r + t3 : 0.18a2r2 + t. \text{ --- } \\
 & \quad \text{Demonstr.} \\
 5. b. & \quad 0.60a3r : 3t5 - 5t3 + 2t. \\
 & \quad 0.60a3r + 5t3 - 2t : 3t5. \\
 5. b. & \quad 0.30a2r2 : t5 - 2t. \\
 & \quad 0.30a2r2 + t : t5. \\
 & \quad 0.90a2r2 + 3t : 3t5. \\
 & \quad 0.60a3r + 5t3 - 2t : 0.90a2r2 + 3t. \\
 & \quad 0.60a3r + 5t3 : 0.90a2r2 + 5t. \\
 & \quad 0.12a3r + t3 : 0.18a2r2 + t. \text{ Quod, \&c.} \\
 5. & \quad 0.6a5 + 3t5 + 2t2 : 0.30a4r + 5t4. \\
 6. & \quad 0.12a4r + t4 : 0.24a3r2 + t2. \\
 7. & \quad 0.6a6 + 3t6 + 4t3 : 0.36a5r + 6t5 + t. \\
 8. & \quad 0.12a5r + t5 + t : 0.30a4r2 + 2t3. \\
 9. & \quad 0.18a4r2 + t3 : 0.24a3r3 + t. \\
 10. & \quad 0.6a7 + 3t7 + 7t4 : 0.42a6r + 7t6 + 3t3. \\
 11. & \quad 0.12a6r + t6 + 2t2 : 0.36a5r2 + 3t4. \\
 12. & \quad 0.18a5r2 + t4 : 0.30a4r3 + t2. \\
 13. & \quad 0.30a8 + 15t8 + 5t5 + 9t : 0.80a7r + 40t7 + 40t3. \\
 14. & \quad 0.60a7r + 5t9 + 24t3 : 0.120a6r2 + 2t5 + 9t. \\
 15. & \quad 0.30a6r2 + 2t5 + 3t : 0.60a5r3 + 5t3. \\
 & \quad 16. 0.
 \end{aligned}$$

16. $O.120a5r3 + 10t3 : O.150a4r4 + t5 + 9t.$
 17. $O.10a9 + 5t9 + 28t6 + 12t2 : O.90a8r + 15t8 + 30t4.$
 18. $O.60a8r + 5t8 + 50t4 : O.240a7r2 + 28t6 + 27t2.$
 19. $O.90a7r2 + 7t6 + 18t2 : O.210a6r3 + 25t4.$
 20. $O.120a6r3 + 10t4 : O.180a5r4 + t6 + 9t2.$
 21. $O.6a10 + 3t10 + 24t7 + 24t3 : O.60a9r + 10t9$
 $+ 36t5 + 5t.$
 22. $O.60a9r + 5t9 + 90t5 + 25t : O.270a8r2 + 36t7$
 $+ 84t3.$
 23. $O.90a8r2 + 8t7 + 57t3 : O.240a7r3 + 40t5 + 25t.$
 24. $O.120a7r3 + 15t5 + 25t : O.210a6r4 + t7 + 39t3..$
 25. $O.30a6r4 + 6t3 : O.36a5r5 + t5 + 5t.$

Et alia huiusmodi proponi possunt innumerabilia : quibus in singulis demonstrari poterit, quæ, & qualiter acceptæ totæ, species in eadem basi vicinas, aliququaliter acceptas, æquales faciant.

Theor. 10. Prop. 10.

Demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ semitotæ, species in eadem basi vicinas, aliququaliter acceptas, æquales faciant.

Pro innumerabilibus theorematis huius tituli, viginti-quinque proponimus, & vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

1. $O.2a2 + m2 + m : O.4a.$

H

De

Demonstr.

6. b. $O.6a2 : 2m3 + 3m2 + m.$
 $O.6a2 - 3m2 - m : 2m3.$
6. b. $O.6ar : m3 + 3m2 + 2m.$
 $O.12ar : 2m3 + 6m2 + 4m.$
 $O.12ar - 6m2 - 4m : 2m3.$
 $O.6a2 - 3m2 - m : O.12ar - 6m2 - 4m.$
 $O.6a2 : O.12ar - 3m2 - 3m.$
 $O.2a2 : O.4ar - m2 - m.$
 $O.2a2 + m2 + m : O.4ar$ Quod Sec.
2. $O.2a3 + m3 + 2m2 + m : O.6a2r.$
3. $O.6a4 + 3m4 + 8m3 + 6m2 + m : O.24a3r.$
4. $O.12a3r + m3 + 3m2 + 2m : O.18a2r2.$
5. $O.6a5 + 3m5 + 10m4 + 10m3 + 2m2 : O.30a4r + m.$
6. $O.12a4r + m4 + 4m3 + 5m2 + 2m : O.24a3r2.$
7. $O.6a6 + 3m6 + 12m5 + 15m4 + 4m3 : O.36a5r +$
 $3m2 + m.$
8. $O.12a5r + m5 + 5m4 + 8m3 + 4m2 : O.30a4r2.$
9. $O.18a4r2 + m3 + 3m2 + 2m : O.24a3r3.$
10. $O.6a7 + 3m7 + 14m6 + 21m5 + 7m4 + m : O.42a6r$
 $+ 7m3 + 3m2.$
11. $O.12a5r + m6 + 6m5 + 12m4 + 8m3 : O.36a5r2 + m2$
 $+ 2m.$
12. $O.18a5r2 + m4 + 4m3 + 5m2 + 2m : O.30a4r3.$
13. $O.30a8 + 15m8 + 80m7 + 140m6 + 56m5 +$
 $20m2 + 9m : O.240a7r + 70m4 + 40m3.$
14. $O.60a7r + 5m7 + 35m6 + 84m5 + 70m4 :$
 $O.210a6m$

S E C V N D V M.

59

$$O.210a6m + 10m3 + 30m2 + 4m.$$

$$15. O.30a6r2 + 2m5 + 10m4 + 15m3 + 5m2. O.60a5r3 + 2m.$$

$$16. O.120a5r3 + 20m2 + 16m: O.150a4r4 + 2m5 + 5m4.$$

$$17. O.10a9 + 5m9 + 30m8 + 60m7 + 28m6 + 20m5 + 12m2: O.90a8r + 42m5 + 30m4 + 3m.$$

$$18. O.60a8r + 5m8 + 40m7 + 112m6 + 112m5 + 18m: O.240a7r2 + 20m4 + 80m3 + 7m2.$$

$$19. O.90a7r2 + 7m6 + 42m5 + 80m4 + 40m3: O.210a6r3 + 27m2 + 22m.$$

$$20. O.120a6r3 + 20m3 + 36m2 + 16m: O.180a5r4 + m6 + 6m5 + 5m4.$$

$$21. O.6a10 + 3m10 + 20m9 + 45m8 + 24m7 + 30m4 + 24m3: O.60a9r + 42m6 + 36m5 + 9m2 + 5m.$$

$$22. O.60a9r + 5m9 + 45m8 + 144m7 + 168m6 + 72m2 + 16m: O.270a8r2 + 36m5 + 180m4 + 24m3.$$

$$23. O.90a8r2 + 8m7 + 56m6 + 128m5 + 80m4 + 2m: O.240a7r3 + 63m3 + 61m2.$$

$$24. O.120a7r3 + 40m4 + 76m3 + 12m2: O.210a6r4 + m7 + 7m6 + 6m5 + 24m.$$

$$25. O.30a6r4 + 8m2 + 8m: O.36a5r5 + m5 + 5m4 + 4m3.$$

Et omnino in quatuor hanc speciosam tabulam, proponi, & demonstrari potest, quæ, & qualiter acceptæ semitotæ, species vicinæ, æqualiter acceptas, æquales faciant.

Theor. 11. Prop. 11.

Demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ sesquitotæ, species in eadem basi vicinas, aliqualiter acceptas, æquales faciant.

Sub hoc titulo vigintiquinque proponimus theoremata, ex quibus vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

$$1. \quad O.2a2 + q2 + 2 : O.3ar + 3q.$$

Demonstr.

$$\begin{array}{l} 7. b. \quad \left| \begin{array}{l} O.6a2 : 2q3 \quad -- \quad 9q2 + 13q - 6. \\ O.6a2 + 3q2 + 6 : 2q3 \quad -- \quad 6q2 + 13q. \\ O.6ar : q3 \quad -- \quad 3q2 + 2q. \\ O.12ar : 2q3 \quad -- \quad 6q2 + 4q. \\ O.12ar + 9q : 2q3 \quad -- \quad 6q2 + 13q. \\ O.6a2 + 3q2 + 6 : O.12ar + 9q. \\ O.2a2 + q2 + 2 : O.4ar + 3q. \quad \text{Quod \&c.} \end{array} \right. \end{array}$$

$$2. \quad O.2a3 + q3 + 5q : O.6a2r + 4q2 + 2.$$

$$3. \quad O.6a4 + 3q4 + 30q2 + 6 : O.24a3r + 16q3 + 23q.$$

$$4. \quad O.12a3r + q3 + 2q : O.18a2r2 + 3q2.$$

$$5. \quad O.6a5 + 3q5 + 50q3 + 31q : O.30a4r + 20q4 + 58q2 + 6.$$

$$6. \quad O.12a4r + q4 + 5q2 : O.24a3r2 + 4q3 + 2q.$$

$$7. \quad O.6a6 + 3q6 + 75q4 + 93q2 + 6 : O.36a5r + 24q5 + 116q3 + 37q.$$

$$8. \quad O.12a5r + q5 + 8q3 : O.30a4r2 + 5q4 + 4q2.$$

$$9. \quad O.18a4r2 + q3 + 2q : O.24a3r3 + 3q2.$$

10. O.

SECUNDVM.

61

10. $0.647 + 397 + 10595 + 21793 + 419 : 0.4206r$
 $+ 2896 + 20394 + 1299^2 + 6.$

11. $0.1206r + 96 + 1294 + 29 : 0.3605r2 + 695 + 893$
 $+ 92.$

12. $0.1805r2 + 94 + 592 : 0.3004r3 + 493 + 29.$

13. $0.30048 + 1598 + 70096 + 217094 + 82092 + 30 :$
 $0.24007r + 16097 + 162495 + 172093 + 2319.$

14. $0.6007r + 597 + 8495 + 3092 : 0.21006r2 + 3596$
 $+ 7094 + 1093 + 49.$

15. $0.9006r2 + 695 + 4593 : 0.18005r3 + 3094 + 1592$
 $+ 69.$

16. $0.12005r3 + 594 + 169 : 0.15004r4 + 95 + 2092.$

17. $0.10009 + 599 + 30007 + 130295 + 82093 + 939 :$
 $0.9008r + 6098 + 81296 + 129094 + 34892$
 $+ 10.$

18. $0.6008r + 598 + 11296 + 8093 : 0.24007r2$
 $+ 4097 + 11295 + 2094 + 792 + 189.$

19. $0.18007r2 + 1496 + 10594 + 449 : 0.42006r3$
 $+ 8495 + 8093 + 5492.$

20. $0.12006r3 + 695 + 3692 : 0.18005r4 + 96 + 594$
 $+ 2093 + 169.$

21. $0.6010 + 3910 + 22598 + 130296 + 123094$
 $+ 27992 + 6 : 0.6009r + 4099 + 69697 + 154895.$

22. $0.6009r + 599 + 14497 + 18094 + 169 : 0.27008r2$
 $+ 4598 + 16896 + 3695 + 2493 + 7292.$

23. $0.9008r2 + 897 + 12895 + 6192 + 29 : 0.24007r3$
 $+ 5696 + 8094 + 6393.$

24. 0.

19. $O.84046r3 : O.1049 + O.4548 + O.12047 +$
 $O.21046 + O.29445 + O.31544 + O.6043 -$
 $O.15042 - O.64a.$
20. $O.126045r4 : O.1049 + O.4548 + O.12047 +$
 $O.21046 + O.25245 + O.21044 + O.20043 +$
 $O.16542 + O.48a.$
21. $O.2049r : O.2410 + O.1049 + O.1548 - O.1446$
 $+ O.1044 - O.342.$
22. $O.9048r2 : O.2410 + O.1049 + O.3048 + O.6047$
 $+ O.4246 - O.4245 - O.5044 + O.2043 + O.2142$
 $- O.34.$
23. $O.12047r3 : O.410 + O.549 + O.1548 + O.3047 +$
 $O.4946 + O.6345 + O.1544 - O.5043 - O.2042$
 $+ O.12a.$
24. $O.21046r4 : O.410 + O.549 + O.1548 + O.3047 +$
 $O.4246 + O.4245 + O.5544 + O.6543 - O.842 -$
 $O.37a.$
25. $O.25245r5 : O.410 + O.549 + O.1548 + O.3047 +$
 $O.4246 + O.4245 + O.2044 - O.543 + O.4842 +$
 $O.54a.$

Aliaque possunt in infinitum proponi theoremata, & demonstrari, quibus pateat, qualiter acceptis primis lateris speciebus, quæque massa est æqualis.

Theor. 9. Prop. 9.

Demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ, totæ species in eadem basi vicinas, aliquantulum acceptas, æquales faciat.

Ex

S E C V N D V M. 55

Ex innumerabilibus theorematibus, quæ sunt huius tituli, proponimus vigintriquinque & ex his quatuor solummodo demonstramus; quæ sufficiunt, ad ostendendam methodum.

1. $O.2a2+t2 : O.4ar+t.$

Demonstr.

5. b.	$O.6a2 : 2t3 - 3t2 + t.$	
	$O.6a2 + 3t2 - t : 2t3.$	
5. b.	$O.6ar : t3 - t.$	$O.12ar : 2t3 - 2t.$
	$O.12ar + 2t : 2t3.$	
	$O.6a2 + 3t2 - t : O.12ar + 2t.$	
	$O.6a2 + 3t2 : O.12ar + 3t.$	
	$O.2a2+t2 : O.4ar+t.$	Quod &c.

2. $O.2a3+t3 : O.6a2r+t2.$

Demonstr.

5. b.	$O.4a3 : t4 - 2t3 + t2.$	$O.4a3 + 2t3 - t2 : t4.$
5. b.	$O.12a2r : t4 - t2.$	$O.12a2r + t2 : t4.$
	$O.4a3 + 2t3 - t2 : O.12a2r + t2.$	
	$O.4a3 + 2t3 : O.12a2r + 2t2.$	
	$O.2a3+t3 : O.6a2r+t2.$	Quod &c.

3. $O.6a4+t4+t : O.24a3r+t4.$

Demonstr.

5. b.	$O.30a4 : 6t5 - 15t4 + 10t3 - t.$	
	$O.30a4 + 15t4 - 10t3 + t : 6t5.$	
5. b.	$O.60a3r : 3t5 - 5t3 + 2t.$	$O.120a3r : 6t5 - 10t3 + 4t.$
	$O.60a3r + 5t3 - 2t : 3t5.$	
		$O.120a3r$

$$\begin{array}{l}
 5. b. \quad 0.120a3r + 10a3 - 4t : 6t5. \\
 0.30a4 + 19a4 - 10a3 - 4t : 0.120a3r + 10a3 - \\
 4t. \\
 0.30a4 + 15t4 + 5t : 0.120a3r + 20a3. \\
 0.6a4 + 3t4 + t : 0.24a3r + 4t3. \text{ Quod \&c.}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 4. \quad 0.12a3r + t3 : 0.18a2r2 + t. \text{ --- Demonstr. ---} \\
 5. b. \quad 0.60a3r : 3t5 - 5t3 + 2t. \\
 0.60a3r + 5t3 + 2t : 3t5. \\
 5. b. \quad 0.30a2r2 : t5 - t. \\
 0.30a2r2 + t : t5. \\
 0.90a2r2 + 3t : 3t5. \\
 0.60a3r + 5t3 - 2t : 0.90a2r2 + 3t. \\
 0.60a3r + 5t3 : 0.90a2r2 + 5t. \\
 0.12a3r + t3 : 0.18a2r2 + t. \text{ Quod, \&c.} \\
 5. \quad 0.6a5 + 3t5 + 2t2 : 0.30a4r + 5t4. \\
 6. \quad 0.12a4r + t4 : 0.24a3r2 + t2. \\
 7. \quad 06a6 + 3t6 + 4t3 : 0.36a5r + 6t5 + t. \\
 8. \quad 0.12a5r + t5 + t : 0.30a4r2 + 2t3. \\
 9. \quad 0.18a4r2 + t3 : 0.24a3r3 + t. \\
 10. \quad 0.6a7 + 3t7 + 7t4 : 0.42a6r + 7t6 + 3t2. \\
 11. \quad 0.12a6r + t6 + 2t2 : 0.36a5r2 + 3t4. \\
 12. \quad 0.18a5r2 + t4 : 0.30a4r3 + t2. \\
 13. \quad 0.30a8 + 15t8 + 56t5 + 9t : 0.80a7r + 40t7 + 40t3. \\
 14. \quad 0.60a7r + 5t9 + 23t3 : 0.120a6r2 + 22t5 + 9t. \\
 15. \quad 0.30a6r2 + 2t5 + 3t2 : 0.60a5r3 + 5t3.
 \end{array}$$

16. $O.12045r3 + 10t3 : O.15044r4 + 15 + 9t.$
 17. $O.10a9 + 5t9 + 28t6 + 12t2 : O.90a8r + 15t8 + 30t4.$
 18. $O.60a8r + 5t8 + 50t4 : O.240a7r2 + 28t6 + 27t2.$
 19. $O.90a7r2 + 7t6 + 18t2 : O.210a6r3 + 25t4.$
 20. $O.120a6r3 + 10t4 : O.180a5r4 + 16 + 9t2.$
 21. $O.6a10 + 3t10 + 24t7 + 24t3 : O.60a9r + 10t9$
 $+ 36t5 + 5t.$
 22. $O.60a9r + 5t9 + 90t5 + 25t : O.270a8r2 + 36t7$
 $+ 84t3.$
 23. $O.90a8r2 + 8t7 + 57t3 : O.240a7r3 + 40t5 + 25t.$
 24. $O.120a7r3 + 15t5 + 25t : O.210a6r4 + 17 + 39t3..$
 25. $O.30a6r4 + 6t3 : O.36a5r5 + 15 + 5t.$

Et alia huiusmodi proponi possunt innumerabilia : quibus in singulis demonstrari poterit, quæ, & qualiter acceptæ totæ, species in eadem basi vicinas, aliquiditer acceptas, æquales faciant.

Theor. 10. Prop. 10.

Demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ semitotæ, species in eadem basi vicinas, aliquiditer acceptas, æquales faciant.

Pro innumerabilibus theorematis huius tituli, viginti-quinque proponimus, & vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

1. $O.2a2 + m2 + m : O.4a.$

Demonstr.

6. b. $O.6a2 : 2m3 + 3m2 + m.$
 $O.6a2 - 3m2 - m : 2m3.$
6. b. $O.6ar : m3 + 3m2 + 2m.$
 $O.12ar : 2m3 + 6m2 + 4m.$
 $O.12ar - 6m2 - 4m : 2m3.$
 $O.6a2 - 3m2 - m : O.12ar - 6m2 - 4m.$
 $O.6a2 : O.12ar - 3m2 - 3m.$
 $O.2a2 : O.4ar - m2 - m.$
 $O.2a2 + m2 + m : O.4ar$ Quod &c.
2. $O.2a3 + m3 + 2m2 + m : O.6a2r.$
 3. $O.6a4 + 3m4 + 8m3 + 6m2 + m : O.24a3r.$
 4. $O.12a3r + m3 + 3m2 + 2m : O.18a2r2.$
 5. $O.6a5 + 3m5 + 10m4 + 10m3 + 2m2 : O.30a4r + m.$
 6. $O.12a4r + m4 + 4m3 + 5m2 + 2m : O.24a3r2.$
 7. $O.6a6 + 3m6 + 12m5 + 15m4 + 4m3 : O.36a5r + 3m2 + m.$
 8. $O.12a5r + m5 + 5m4 + 8m3 + 4m2 : O.30a4r2.$
 9. $O.18a4r2 + m3 + 3m2 + 2m : O.24a3r3.$
 10. $O.6a7 + 3m7 + 14m6 + 21m5 + 7m4 + m : O.42a6r + 7m3 + 3m2.$
 11. $O.12a5r + m6 + 6m5 + 12m4 + 8m3 : O.36a5r2 + m2 + 2m.$
 12. $O.18a5r2 + m4 + 4m3 + 5m2 + 2m : O.30a4r3.$
 13. $O.30a8 + 15m8 + 80m7 + 140m6 + 56m5 + 20m2 + 9m : O.240a7r + 70m4 + 40m3.$
 14. $O.60a7r + 5m7 + 35m6 + 84m5 + 70m4 : O.210a6m$

S E C V N D V M.

59

$$O.210a6m + 10m3 + 30m2 + 4m.$$

$$15. O.30a6r2 + 2m5 + 10m4 + 15m3 + 5m2 : O.60a5r3 + 2m.$$

$$16. O.120a5r3 + 20m2 + 16m : O.150a4r4 + m5 + 5m4.$$

$$17. O.10a9 + 5m9 + 30m8 + 60m7 + 28m6 + 20m3 + 12m2 : O.90a8r + 42m5 + 30m4 + 3m.$$

$$18. O.60a8r + 5m8 + 40m7 + 112m6 + 112m5 + 18m : O.240a7r2 + 20m4 + 80m3 + 7m2.$$

$$19. O.90a7r2 + 7m6 + 42m5 + 80m4 + 40m3 : O.210a6r3 + 27m2 + 22m.$$

$$20. O.120a6r3 + 20m3 + 36m2 + 16m : O.180a5r4 + m6 + 6m5 + 5m4.$$

$$21. O.6a10 + 3m10 + 20m9 + 45m8 + 24m7 + 30m4 + 24m3 : O.60a9r + 42m6 + 36m5 + 9m2 + 5m.$$

$$22. O.60a9r + 5m9 + 45m8 + 144m7 + 168m6 + 72m2 + 16m : O.270a8r2 + 36m5 + 180m4 + 24m3.$$

$$23. O.90a8r2 + 8m7 + 56m6 + 128m5 + 80m4 + 2m : O.240a7r3 + 63m3 + 61m2.$$

$$24. O.120a7r3 + 40m4 + 76m3 + 12m2 : O.210a6r4 + m7 + 7m6 + 6m5 + 24m.$$

$$25. O.30a6r4 + 8m2 + 8m : O.36a5r5 + m5 + 5m4 + 4m3.$$

Et omnino in qualibet huius speciosæ tabulæ, proponi, & demonstrari potest, quæ, & qualiter acceptæ semitotæ, species vicinæ, æqualiter acceptas, æquales faciant.

Theor. II. Prop. II.

Demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ sesquitotæ, species in eadem basi vicinas, aliquantulæ acceptas, æquales faciant.

Sub hoc titulo vigintiquinque proponimus theoremata, ex quibus vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

1. $O.2a2 + q2 + 2 : O.3ar + 3q.$

Demonstr.

7. b.	$O.6a2 : 2q3 -- 9q2 + 13q -- 6.$ $O.6a2 + 3q2 + 6 : 2q3 -- 6q2 + 13q.$
7. b.	$O.6ar : q3 -- 3q2 + 2q.$ $O.12ar : 2q3 -- 6q2 + 4q.$ $O.12ar + 9q : 2q3 -- 6q2 + 13q.$ $O.6a2 + 3q2 + 6 : O.12ar + 9q.$ $O.2a2 + q2 + 2 : O.4ar + 3q. \text{ Quod \&c.}$

2. $O.2a3 + q3 + 5q : O.6a2r + 4q2 + 2.$

3. $O.6a4 + 3q4 + 30q2 + 6 : O.24a3r + 16q3 + 23q.$

4. $O.12a3r + q3 + 2q : O.18a2r2 + 3q2.$

5. $O.6a5 + 3q5 + 50q3 + 31q : O.30a4r + 20q4 + 58q2 + 6.$

6. $O.12a4r + q4 + 5q2 : O.24a3r2 + 4q3 + 2q.$

7. $O.6a6 + 3q6 + 75q4 + 93q2 + 6 : O.36a5r + 24q5 + 116q3 + 37q.$

8. $O.12a5r + q5 + 8q3 : O.30a4r2 + 5q4 + 4q2.$

9. $O.18a4r2 + q3 + 2q : O.24a3r3 + 3q2.$

10. O.

S E C V N D V M.

10. $0.647 + 397 + 10595 + 21793 + 419 : 0.4206r$
 $+ 2896 + 20394 + 1299^2 + 6.$
11. $0.1206r + 96 + 1294 + 29 : 0.3605r2 + 695 + 893$
 $+ 92.$
12. $0.1805r2 + 94 + 592 : 0.3004r3 + 493 + 29.$
13. $0.30048 + 1598 + 70096 + 217094 + 82092 + 30 :$
 $0.24007r + 16097 + 162495 + 172093 + 2319.$
14. $0.6007r + 597 + 8495 + 3092 : 0.21006r2 + 3596$
 $+ 7094 + 1093 + 49.$
15. $0.9006r2 + 695 + 4593 : 0.18005r3 + 3094 + 1592$
 $+ 69.$
16. $0.12005r3 + 594 + 169 : 0.15004r4 + 95 + 2092.$
17. $0.10009 + 599 + 30097 + 130295 + 82093 + 939 :$
 $0.9008r + 6098 + 81296 + 129094 + 34892$
 $+ 10.$
18. $0.6008r + 598 + 11296 + 8093 : 0.24007r2$
 $+ 4097 + 11295 + 2094 + 792 + 189.$
19. $0.18007r2 + 1496 + 10594 + 449 : 0.42006r3$
 $+ 8495 + 8093 + 549^2.$
20. $0.12006r3 + 695 + 3692 : 0.18005r4 + 96 + 594$
 $+ 2093 + 169.$
21. $0.6010 + 3910 + 22598 + 130296 + 123094$
 $+ 2799^2 + 6 : 0.6009r + 4099 + 69697 + 154895.$
22. $0.6009r + 599 + 14497 + 18094 + 169 : 0.27008r2$
 $+ 4598 + 16896 + 3695 + 2493 + 7292.$
23. $0.9008r2 + 897 + 12895 + 6192 + 29 : 0.24007r3$
 $+ 5696 + 8094 + 6393.$

$$24. O.12047r3 + 796 + 7693 : O.21046r4 + 97 + 895 + 4094 + 1292 + 244.$$

$$25. O.3046r4 + 594 + 89 : O.3645r5 + 95 + 293 + 892.$$

Possunt hæc, & alia huiusmodi, sub hoc titulo demonstrari, in infinitum, iuxta traditam methodum: vt omninò pateat, quæ, & qualiter acceptæ scquitotæ, species in eadem basi vicinas, aliquiditer acceptas æquales faciant.

Theor. 12. Prop. 12.

Demonstrare, quæ, & qualiter acceptas primi lateris species, binas quasque species in eadem basi vicinas, aliquiditer acceptas, æquales faciant.

Sub hoc etiam titulo, vigintiquinque proponimus theoremata, ex quibus vnum demonstramus, ad ostensionem methodi.

1. $O.a2 + O.a : O.2ar.$ Demonstratum est in 8. b.

2. $O.2a3 + O.3a2 + O.a : O.6a2r.$ Demonstr. ibidem.

3. $O.a4 + O.2a3 + O.a2 : O.4a3r.$ Demonstr. ibidem.

4. $O.4a3r + O.a2 + O.a : O.6a2r2.$

Demonstr.

8. b. $O.4a3r : O.a4 + O.2a3 + O.a2.$

8. b. $O.4a3r + O.a2 + O.a : O.a4 + O.2a3 + O.2a2 + O.a.$

$O.6a2r2 : O.a4 + O.2a3 + O.2a2 + O.a.$ Quod &c.

5. $O.6a5 + O.15a4 + O.10a3 : O.30a4r + O.a.$

6. $O.6a4r + O.2a3 + O.3a2 + O.a : O.12a3r2.$

7. $O.2a6 + O.6a5 + O.5a4 : O.12a5r + O.a2.$

8. O,

S E C U N D U M .

63

8. $O.1245r + O.5a4 + O.10a3 + O.4a2 : O.30a4r2$
 $\rightarrow O.a.$
9. $O.30a4r2 \rightarrow O.8a5 \rightarrow O.5a2 : O.40a3r3 \rightarrow O.3a.$
10. $O.6a7 + O.21a6 \rightarrow O.21a5 + O.a : O.42a6r$
 $\rightarrow O.7a3.$
11. $O.12a6r + O.6a5 + O.15a4 + O.8a3 : O.36a5r2$
 $\rightarrow O.3a2 \rightarrow O.2a.$
12. $O.9a5r2 + O.2a3 \rightarrow O.3a2 \rightarrow O.a : O.15a4r3.$
13. $O.3a8 \rightarrow O.12a7 \rightarrow O.14a6 \rightarrow O.2a2 : O.24a7r$
 $\rightarrow O.7a4.$
14. $O.12a7r \rightarrow O.7a6 \rightarrow O.21a5 \rightarrow O.14a4 \rightarrow O.a :$
 $O.42a6r2 \rightarrow O.7a3 \rightarrow O.6a2.$
15. $O.6a6r2 + O.2a4 + O.4a3 + O.a2 : O.12a5r3$
 $\rightarrow O.a.$
16. $O.24a5r3 + O.4a2 \rightarrow O.5a : O.30a4r4 \rightarrow O.a4$
 $\rightarrow O.2a3.$
17. $O.10a9 \rightarrow O.45a8 \rightarrow O.60a7 + O.20a3 : O.90a8r$
 $\rightarrow O.42a5 \rightarrow O.3a.$
18. $O.30a8r + O.20a7 + O.70a6 + O.56a5 + O.10a2 +$
 $O.9a : O.120a7r2 + O.35a4 + O.40a3.$
19. $O.90a7r2 \rightarrow O.42a5 \rightarrow O.105a4 \rightarrow O.40a3 :$
 $O.210a6r3 + O.20a2 + O.22a.$
20. $O.120a6r3 + O.20a3 + O.45a2 + O.16a :$
 $O.180a5r4 + O.6a5 + O.15a4.$
21. $O.2a10 + O.10a9 + O.15a8 + O.10a4 : O.20a9r +$
 $O.14a6 + O.3a2.$
22. $O.20a9r + O.15a8 \rightarrow O.60a7 + O.56a6 + O.20a3$
 $\rightarrow O.24a2 :$

- $+0.2442 ; 0.9048r2 + 0.4205 + 0.6044 + 0.3a.$
 23. $0.9048r2 + 0.5646 + 0.16845 + 0.8044 + 0.27a:$
 $0.24047r3 + 0.12043 + 0.6142.$
 24. $0.12047r3 + 0.4044 + 0.11543 + 0.12a2:$
 $0.21046r4 + 0.746 + 0.2145 + 0.49a.$
 25. $0.3046r4 + 0.842 + 0.134 : 0.3645r5 + 0.544$
 $+ 0.1043.$

Et alia deinceps proponi possunt, & demonstrari: & vniuersaliter possibile est demonstrare, quæ, & qualiter acceptæ primi lateris species, binas quasque species, in eadem basi vicinas, aliquantuliter acceptas, æquales faciant.

Theor. 13. Prop. 13.

IN tabula subquadratrice cuiusque numeri, & in qualibet basi, subquadratrices, & æque ordinata tota, totam componunt, vnitatem plus ordinatam.

Hypoth.

In tabula subquadratrice, in secunda basi, sint subquadratrices $0.a2, 0.2a3, 0.r2$: sitque tota secunda, $t2$; tota tertia, $t3$.

Dico $0.a2 + 0.2ar + 0.r2 = t2 + t3$.

Demonstr.

def. 6. p. $u; t: t2; t3.$

2. p. $u; t - u: t2; t3 - t2.$

Ergo $t3 - t2$, est toties $t2$, quoties est $t - u$: id est, quoties relinquitur ipse numerus t , vnitatem dempta. Sed cuiusque numeri tot sunt abscissiones, quotus ipse relinquitur,

quitur, vnitate dempta: nam binarij, vna tantum est ab-
 scissio, qua vnitas abscinditur; ternarij, duae, quibus vnitas,
 & binarius abscinduntur; & sic deinceps: ergo $t_3 - t_2$,
 est toties t_2 , quot sunt ipsius t abscissiones.

Pro singulis autem abscissionibus.

6. p.	$a_2 + 2ar + r_2 : t_2.$
	Ergo pro omnibus.
	$O.a_2 + O.2ar + O.r_2 : t_3 - t_2.$
	Ergo communiter addendo t_2 .
	$O.a_2 + O.2ar + O.r_2 - t_2 : t_3.$ Quod &c.

Quare &c.

Theorema 14. Prop. 14.

TOta qualibet, est æqualis quadratrici, in primo la-
 tere, in basi proximè minus ordinata iacenti, vna
 cum alijs massis, in primo latere, in basibus inferioribus,
 & vertice, acceptis aequaliter, & vnitate.

Hypoth.

Esto tota tertia t_3 .

Dico t_3 , esse æqualem quadratrici in primo latere, in
 secunda basi, vna cum alijs, &c.

Demonstr.

4. h.	$t_3 = O.3a_2$, vna cum alijs, &c.
def. 8. p.	a_2 est in primo latere in secunda basi tabulae pro- portionarium.
def. 11. p.	a_2 est ibidem in tabula nominum.
def. 9. p.	$O.a_2$ est ibidem in tabula speciosa.

def. 11. 2. | $O.a2$ est ibidem in tabula subquadratrice.
 def. 13. 2. | $O.13a2$ est ibidem in tabula quadratrice.
 | 13 est æqualis quadratrici, in primo latere, in se-
 cunda basi, vna cum alijs, &c. Quod &c.
 Quare &c.

Theorema 15. Prop. 15.

Quælibet subquadratrix, in primo latere, vna cum
 tota æque ordinata, atque sua basis, est æqualis sub-
 quadratrici, in secundo latere, in sua basi iacenti,
 vna cum massis, in secundo latere, in basibus inferioribus,
 acceptis aequaliter, & tota.

Hypoth.

Est subquadratrix $O.a3$, in primo latere, in tertia basi.
 Dico $O.a3$, vna cum tota tertia, æqualem esse sub-
 quadratrici, in secundo latere, in tertia basi iacenti, vna
 cum alijs, &c.

Prepar.

Assumatur species, in secundo latere, in quarta basi, se-
 cunda, & quartultima, $O.a3r$.

Demonstr.

| $O.a3r$ incrementa sunt equalia.
 2. b. | $O.a3$, vna cum &c: $O.3a2r$, vna cum alijs &c.
 7. p. | $a2r$ est secunda in tertia basi tabulæ proportio-
 nalium.
 def. 11. p. | $3a2r$ est ibidem in tabula nominum.
 def. 11. 2. | $O.3a2r$ est ibidem in tabula subquadratrice.

$O.a3$,

O. 13, vna &c. est aequalis subquadratrici, in secundo latere; in tertia basi, vna cum alijs; &c. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 16. Prop. 16.

SI aliquot quantitatum, secunda ad tertiam, fuerit sicut prima cum vltima ad secundam dempta vltima; & tertia ad quartam, sicut prima cum dupla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & quarta ad quintam sicut prima cum tripla vltima ad secundam dempta tripla vltima; & sic deinceps vsque ad vltimam: erit prima cum secunda ad secundam cum tertia, sicut prima cum vltima ad secundam; & secunda cum tertia ad tertiam cum quarta, sicut prima cum dupla vltima ad secundam dempta vltima; & tertia cum quarta ad quartam cum quinta, sicut prima cum tripla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & sic deinceps.

Hypoth.

Sint aliquot quantitates *a, b, c, d, e*.
 $b:c = a+e; b - e$
 $c:d = a+2e; b - 2e$
 $d:e = a+3e; b - 3e$

Dico $d+b; b+c = a+e; b$

Demonstr.

hypoth. $a+e; b - e; b - 2e; b - 3e$
 conuertendo, componendo, & permittendo.

2. p. $a+b; b+c; a+c; b$. Quod &c.

Dico $b+c; c+d; a+2c; b-c$.

Demonstr.

hypothesis $b; c; a+c; b-c$.

2. p. $b+c; c; a+b; b-c$.

hypothesis $c; d; a+2c; b-2c$.

2. p. $c; c+d; a+2c; a+b$.

p. p. $b+c; c+d; a+2c; b-2c$. Quod &c.

Dico $c+d; d+e; a+3c; b-2c$.

Demonstr.

hypothesis $c; d; a+2c; b-2c$.

2. p. $c+d; d; a+b; b-2c$.

hypothesis $d; e; a+3c; b-3c$.

2. p. $d; d+e; a+3c; a+b$.

p. p. $c+d; d+e; a+3c; b-2c$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 17. Prop. 17.

SI aliquot quantitatum, secunda ad tertiam fuerit, sicut prima cum vltima ad secundam dempta vltima; & tertia ad quartam, sicut prima cum dupla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & sic deinceps vsque ad vltimam: fuerit autem & prima æqualis vltimæ: erunt totidem quantitates & vna amplius, prima seorsim, prima cum secunda, secunda cum tertia, tertia cum quarta, & deinceps binę aggregatę, & demum seorsim vltima; quarum secunda ad tertiam, est vt prima cum vltima ad secundam dempta

dempta vltima; & tertia ad quartam, vt prima cum dupla vltima ad secundam dempta dupla vltima; & sic deinceps vsque ad vltimam.

Hypoth.

Sint tres quantitates a, b, c , quarum
 $b:c:a-c; b-c.$
 $a:c.$

Dico quatuor quantitates esse $a, a+b, b+c, c$, quarum
 $a+b; b+c:a+c; a+b-c.$

Demonstr.

16. b. $a+b; b+c:a+c; b.$

hypoth.

$a:c.$

$a+b-c:b.$

$a+b; b+c:a+c; a+b-c.$ Quod &c.

Dico $b+c; c:a+2c; a+b-2c.$

hypoth.

$b;c:a+c; b-c.$

2. p.

$b+c; c:a+b; b-c.$

hypoth.

$b-c; a+b.$

$c:b-c.$

$2c:b.$

$a+2c:a+b.$

$a+b-2c:b-c.$

$b+c; c:a+2c; a+b-2c.$ Quod &c.

Quare &c.

Theor.

Theor. 8. Prop. 12.

IN vnaquaque basi tabule multiplicium prior quantitas ad posteriorem vicinam, est vt ordo prioris à prima, ad ordinem posterioris ab vltima.

Demonstr.

Quoniam in secunda basi tabule multiplicium, sunt tres quantitates, quarum secunda ad tertiam, est vt prima cum tertia ad secundam dempta tertia; & prima est equalis tertia; & in tertia basi, sunt ordinatae quatuor quantitates ex secunda basi desumptæ, prima seorsim, prima & secunda, secunda & tertia, & tertia seorsim: ergo etiam in tertia basi, secunda quãtitas ad tertiam, est vt prima cum quarta ad secundam dempta quarta; & tertia ad quartam, est vt prima cum dupla quarta, ad secundam dempta dupla quarta: & sic deinceps ostendetur in singulis basibus.

Est autem in vnaquaque basi tabule multiplicium, prima quantitas vnitas, & vltima vnitas: & secunda quantitas est ordo basis, idemque ordo ipsius quantitates ab vltima. Ergo in quarta basi, prima quantitas, quæ est quintultima, ad secundam, quæ est quartultima, est vt vnitas ad quaternariũ: secunda ergo ad triultimam, est vt binarius ad ternarium; tertia ad penultimam, vt semarius ad binarium; quarta ad vltimam, vt quaternarius ad vnitatem. Similiter ostendetur in singulis basibus.

Quare &c.

Theor.

Theor. 19. Prop. 19.

Proportionalium, & multiplicium tabulis congruentibus, quæque proportionalis, habet numeros denominatores, reciprocè proportionales, vt in suis cornibus multiplices.

Demonstr.

Proportionalium assumatur bitertia, cuius denomina-

7. p. | tores binarius, & ternarius. Est autem bitertia in
 def. p. p. | quinta basi quarta tritultima: cuius cornua sunt in
 def. p. p. | quarta basi, alterum in quarto, alterum in tritulti-
 18. b. | mo latere: idest alterum cornu est, in quarta basi,
 quarta quantitas; alterum, tritultima. Sed in quar-
 ta basi, quarta est penultima, & tritultima est ter-
 tia: & in tabula multiplicium, tertia ad penultimã,
 est vt ternarius ad binarium: ergo cum bitertiæ
 denominatores sint, prior binarius, & posterior
 ternarius; eiusdem in cornibus multiplices reci-
 procè sunt proportionales, prior ad posteriorem,
 vt ternarius ad binarium. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 20. Prop. 20.

IN tabula specierum, in eadem basi, vicinæ species, multiplicatæ per numeros suorum ordinum, prioris à prima, & posterioris ab vltima, sunt æquales, additis tamen vniuique massis, in inferioris ordinis basibus, & in earumdem

dem lateribus, versus tabulæ verticem diuergentibus, saliqua-
qualiter acceptis, atque totis minùs ordinatis, quàm sit ip-
sa basis.

Hypoth.

Sint species in quinta basi, secunda quintultima, &
tertia quartultima.

Dico duplam secundam quintultimam, æqualem esse
quadruplæ tertiæ quartultimæ, additis tamen vtrimque
alijs &c.

Prepar.

6. p. Assumatur, in sexta basi, species tertia quintul-
tima, cuius denominatores numeri, quaterna-
rius, & binarius.

Demonstr.

Tertiæ & quintultimæ species æqualia sunt incrementa:
a. b. alterum ex massis compositum in tertio latere,
multiplicatis per numeros quartæ basis multipli-
cium, quaternarium, & reliquos; quarum vna est
in quinta basi quartultima, per quaternarium mul-
tiplicata: alterum ex massis in quintultimo latere,
2. b. multiplicatis per numeros secundæ basis multi-
plicium, nempe binarium; quarum vna est, in
quinta basi, secunda, multiplicata per binarium: &
reliquæ massæ, in vtroque incremento, sunt infe-
riores, & demum totæ inferiores, quàm quotta:
Ergo dupla secunda quintultima, est æqualis qua-
dru-

duplae tertiae quartultimae, additis vtrisque alijs &c.

Quod &c.

Quare &c.

Theor. 21. Prop. 21.

IN tabula subquadraticum, in eadem basi, subquadratrices vicinae sunt aequales, additis tamen vtrisque mafis, in inferioris ordinis basibus, & in earundem lateribus, versus tabulae verticem divergentibus, aliquantulum acceptis, atque totis, minus ordinatis, quam sit ipsa basis. Similiter & vicinae quadratrices sunt aequales, additis tamen &c.

Hypoth.

Sint subquadratrices, in quinta basi, vicinae, producta ex secunda quintultima specie per secundum quintultimum multiplicem, & producta ex tertia quartultima specie, per tertium quartultimum multiplicem, $O. 544r$ & $O. 1043r2$.

Dico $O. 544r$, additis &c. $O. 1043r2$, additis &c.

Prepar.

Assumatur, in sexta basi, species tertia quintultima, cuius denominatores, quaternarius, & binarius, nempe $O. 44r2$: quibuscum numeris, reciproce proportionales sunt multiplices, in eiusdem specie cornibus iacentes, 5 ad 10. Fiat itaque, vt 2 ad 5, ita $O. 244r$, vna cum alijs &c. ad $O. 544r$, vna cum alijs &c. item vt 4 ad 10, ita $O. 443r2$, vna cum alijs &c. ad $O. 1043r2$, vna cum alijs &c.

19. b.

post. vii.

K

Demonstr.

Demonstr.

20. b. | $O. 2a4r$, vna cum alijs &c: $O. 4a3r2$, vna cū alijs &c.
 2. p. | $O. 2a4r$, vna cum alijs &c; $O. 4a3r2$, vna cum &c:
 $O. 5a4r$, vna cum &c; $O. 10a3r2$, vna cum &c.

9. 5. | $O. 5a4r$, vna cum &c; $O. 10a3r2$, vna cum &c.

Quod &c.

Dico $O. 30a4r$, vna cum &c: $O. 60a3r2$, vna cum &c.

Preparat.

post. vii. | $O. 15a4r$, vna cum &c: & $O. 10a3r2$, vna cum &c:
 sextuplicatur, & fit $O. 30a4r$, vna cum &c. &
 $O. 60a3r2$, vna &c.

Demonstr.

sup. | $O. 5a4r$, vna &c: $O. 10a3r2$, vna &c.

9. 5. | $O. 30a4r$, vna &c: $O. 60a3r2$, vna &c. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 22. Prop. 22.

Quælibet quadratrix, est æqualis totæ vnitæ plus ordinatæ, demptis, additisque aliquæ acceptis totis, non plus ordinatis, quàm sit eius basis.

Demonstr.

Patet inductiõne, per 5. huiusmodi.

21. b. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, sibi in eadem basi vicinæ, additis vtrinque alijs inferiorum basium speciebus, aliquæ liter acceptis, & totis. Et quadratrix vicina, alteri vicinæ est æqualis, additis vtrinque alijs infe-

15. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

riorum basium (quodlibet) & totius demum prae-
 mae quadratricis eiusdem basia & prima quadra-
 tix vna cum alijs primis lateris quadratricibus in-
 feriorum basium, & vnitatis, est aequalis totae vni-
 tate plus ordinatae, quam sit ipsa basis. Similiter
 aliae inferiorum basium species, alijs speciebus, &
 demum totis, sunt aequales, non plus ordinatis,
 quam sit basis quadratricis primò sumpta. Quare
 demum quadratrix primò sumpta, est aequalis totae
 vnitati plus ordinatae, quam sit eius basis, demum
 ptis, additisque aliquoties acceptis totis, non plus
 ordinatis, quam sit eius basis.

Theor. 20. Prop. 23.

In tabula multiplicium, summa numerorum cuiusque
 basis, est tota potestas binarii, quod totus est ordo basis.

Demonstratio

Nam in tabula proportionalium, si rationales, & radices
 fuerint aequales inter se, etiam reliquae omnes
 quantitates, & rationales, & radices, & ad inui-
 cem aequales erunt, quia ratio aequalitatis, quan-
 tumlibet multiplicata, & se cum ipsa composita,
 semper est aequalitas. Quare si rationales, & radi-
 ces fuerint vnitates, omnes proportionales erunt
 vnitates. eritque tabula summam eadem, quae
 tabula multiplicium, quia vnitates non multiplicat
 et cuiusque basis nominum summa, eadem erit.

quæ summa eiusdem basis multiplicium: Sed cuiusque basis nominum summa est potestas aggregati radiorum, æque ordinata cum basi. Ergo cuiusque basis multiplicium summa, est potestas aggregati unitatum, id est. binarij, æque ordinata cum basi.

Theor. 24. Prop. 24.
Potestas binarij multiplicata per summam ordinis numerum, minor est æque ordinata potestate ternarij.

Hypoth.
 Esto binarius b , ternarius t . Constat b , minorem esse, quàm t .

Dico $2b2$, minorem esse, quàm $t2$.

$3b3$, minorem, quàm $t3$.

$4b4$, minorem quàm $t4$. Et deinceps.

Demonstr.

def. 2. p. $1, b, t2, tb, b2, t2 - tb, tb - b2$.

2. p. $1, b$, sunt numeri inter se primi.

3. 7. $1, b$, sunt minimi in sua ratione.

$t2 - tb$, non est minor, quàm t .

$tb - b2$, non est minor, quàm b .

$t2 - b2$, non est minor quàm $t - b$.

hypoth. b , est minor, quàm t .

$2b$, est minor, quàm $t - b$.

$2b$, est minor, quàm $t2 - b2$.

hypoth. 2 , est b .

2b, est b2. *Prop.*
 b2, est minor, quam 2a2. *Quod sc.*
 2b2, est minor, quam a2. *Quod sc.*
 3b, est minor, quam 3a. *Prop.*
 3b3, est minor, quam 3a3. *Prop.*
 3b2, est minor, quam 3a2. *Prop.*
 3b3, est minor, quam 3a3. *Quod sc.*
 3b4, est minor, quam 3a4. *Prop.*
sup. b3, est minor, quam 12.

hypoth. b, est minor, quam 1.
 b4, est minor, quam 13.
 4b4, est minor, quam 323.
 313, est minor, quam 14.
 4b4, est minor, quam 14. *Quod sc.*

Est similiter deinceps ostendatur in infinitum.
 Quare &c.

Theorema 25. Prop. 25.

In tabula multiplicum, quisque numerus multiplicans numerum unitate maiorem, quam fit ordo suæ basis, facit numerum minorem totâ potestate ternarij, quotus est numerus multiplicatus.

Hypoth.

Esto, numerus a, in tabula multiplicum, in quinta basi: & esto ternarius: 1.

Dico 6a, minorem esse, quam 16.

Prepar.

Prepar. . et sic de

Accipiatur binarius b . . .

... b^2 . . .

32. b. Numerus a , & alij quatuor basis, componunt b^5 .

def. 6. p. Ergo a , minor est, quam b^5 . Sed b^5 , minor est, quam b^6 . Ergo a , multo minor est, quam

24. b. b^6 . Ergo $6a$, minor est quam $6b^6$. Sed $6b^6$, minor est, quam $6b^7$. Ergo $6a$, minor est quam

16. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 26. Prop. 16.

Quælibet quadratrix, pro radice binario, minor est, quam sesquialtera; maior, quam semitota; unitate plus ordinata, quam si eius basis. Porro quadratrix iacens in vertice tabule, est æqualis semitotæ.

Hypoth. . .

Esto, pro radice binario, quælibet quadratrix a , in quarta basi.

Dico: a maiorem esse, quam $m/2$; & minorem, quam m .

11. . .

def. 8. p. Porro constat, quod: Quæ pro quacunque radice, est æqualis ipsi m .

Prepar.

def. 8. b. Pro radice binario, unica tantum est abscessio, qua unitas abscinditur, & unitas relinquatur: Sed

def. 8. p. unica tabula proportionalis, in qua quævis pro-

por-

def. 8. b.
def. 10. b.
def. 11. p.
def. 11. b.

portionales sunt unitates: & synonymae propor-
tionales solitariae: unde tabula: species eadem est ca-
dem, quae proportionalium ex unitatibus. Den-
de vnica est tabula nominum, eadem, quae multi-
plicium: unde tabula subquadratrix, eadem est,
est, quae nominum, & multiplicium. Accipiatur
itaque subquadratrix *b*, in quarta basi, quadra-
trici *a*, synonymae.

prepar.
def. 13. b.
def. 19. b.
def. 9. p.
def. 10. p.
def. 8. b.
25. b. 11.

Demonstr.
b, est in tabula multiplicium, in quarta basi. **Q**
a: 5 *b*.
pro binario, *m*, est unitas.
m 5, est unitas.
b, est maior unitate.
a, est maior, quam *m* 5. Quod &c.
Pro binario, *q*, est ternarius.
b, est minor, quam *q* 5.
a, est minor, quam *q* 5. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 27. Prop. 27.

Q

Valbet potestas à binario, maior est numero sui
ordinis.

Hypothesis

Esto binarius *b*.

Demonstr.

Vnitas est minor, quam *b*, ergo binarius, minor est,
quam

quàm $2b$. sed $2b$ est b^2 : ergo binarius, minor est, quàm b^2 . Ergo unitas, multò minor est, quàm b^2 . Ergo ternarius, minor est, quàm $2b^2$. Sed $2b^2$, est b^3 . Ergo ternarius, minor est, quàm b^3 . Et sic diinceps offendetur, quòd potestas à binario, maior est, quàm sui ordinis numerus.

Theor. 28. Prop. 28.

Quælibet quadratrix primi lateris, pro radice binario, minor est, quàm potestas binarij, unitate plus ordinata, quàm sit eius basis.

Hypoth.

Esto, in primo latere, in quarta basi, quadratrix a , pro radice binario: & esto binarius b .

Dico a , minorem esse, quàm b^5 .

Prepar.

Accipiatur in primo latere, in quarta basi, subquadratrix c , pro radice binario.

Demonstr.

ex 26. b | $c : a$

def. 11. b | $a : 5c$.

| $a : 5$.

27. b.

| 5 , minor est, quàm b^5 .

| a , minor est, quàm b^5 . Quod &c.

Quare &c.

Theor.

Theor. 29. Prop. 29.

C Viuslibet quadratricis, primi vel ultimi lateris, incrementum, minus est incremento totæ, vnitatè plus ordinatæ, quàm sit eius basis: & quælibet quadratrix, primi vel ultimi lateris, minor est quàm tota, vnitatè plus ordinata: & sesquiquadratrix, minor est quàm sesquitota.

Meth. Demonstr.

Tria proposita, oportet primùm demonstrare, in prioribus basibus tabulæ, deinde in posterioribus.

Dico *O.2a* incrementum, minus esse incremento *t2*: & *O.2a*, minorem esse, quàm *t2*: & sesqui-*O.2a*, minorem esse, quàm *q2*.

Demonstr.

2. b. | *O.2a* incrementum est $O.2+2$.

8. p. | *t2* incrementum est $2t+n$.

2. b. | $O.2 : 2t --- 2$.

$O.2+2 : 2t$.

$O.2+2$, minor est, quàm $2t+n$.

O.2a incrementum, minus est incremento

t2. Quod &c.

28. b. | *O.2a*, pro binario, minor est, quàm *t2*.

O.2a, pro ternario, minor est, quàm *t2*.

Similiter, pro quaternario, & pro singulis numeris demonstrabitur, quòd *O.2a* minor est, quàm *t2*: & sesqui-*O.2a*, minor est, quàm

q2. Quod &c.

Dico $O.3a2$ incrementum, minus esse incremento 13 : & $O.3a2$, minorem esse, quàm 13 : & sesqui- $O.3a2$, minorem esse, quàm $q3$.

Demonstr.

- | | |
|-----------|--|
| 2. b. | $O.3a2$ incrementum, est $O.6a + O.3 + 3$. |
| 8. p. | 13 incrementum, est $3t2 + 3t + n$. |
| sup. | $O.6a$, minor est, quàm $3t2$. |
| — ex sup. | $O.3 + 3$, minor est, quàm $3t + n$. |
| | $O.3a2$ incrementum, minus est incremento 13 .
Quod &c. |
| 28. b. | $O.3a2$, pro binario, minor est, quàm 13 .
$O.3a2$, pro ternario, minor est quàm 13 : necnon
pro alio quolibet numero: & sesqui- $O.3a2$,
minor est, quàm $q3$. Quæ &c. |

Dico $O.4a3$ incrementum, minus esse incremento 14 : & $O.4a3$, minorem esse, quàm 14 : & sesqui- $O.4a3$, minorem, quàm $q4$.

Demonstr.

- | | |
|---------|---|
| 2. b. | $O.4a3$ incrementum, est $O.12a2 + O.12a$
$+ O.4 + 4$. |
| 8. p. | Incrementum 14 , est $4t3 + 6t2 + 4t + n$. |
| sup. | $O.12a2$, minor est, quàm $4t3$. |
| sup. | $O.12a$, minor est, quàm $6t2$. |
| ex sup. | $O.4 + 4$, minor est, quàm $4t + n$. |
| | Incrementum $O.4a3$, minus est incremento 14 .
Quod &c. |
| 28. b. | $O.4a3$, pro binario, minor est, quàm 14 .
$O.4a3$, |

$O.443$, pro ternario, minor est, quàm 14 : necnon pro quaternario, & pro alijs deinceps numeris: & sesquiqui-
 $O.443$, minor est, quàm 94 . Quæ &c.

Similiter ostendetur de omnibus primi, & vltimi lateris quadratricibus.

Quare &c.

Theor. 30. Prop. 30.

Cuiuslibet quadratricis incrementum, maius est incremento semitotæ, vnitatem plus ordinatæ, quàm sit eius basis; & minus est incremento sesquitotæ, pariter plus ordinatæ. Deinde quælibet quadratrix, maior est, quàm prædicta semitotæ; & minor, quàm prædicta sesquitotæ.

Meth. Demonstr.

Quatuor proposita primùm demonstrare oportet, in prioribus basibus tabulæ, deinde in posterioribus.

Dico incrementum $O.2a$, maius esse, incremento $m2$; & minus esse, incremento $q2$: & $O.2a$, maiorem esse, quàm $m2$; minorem, quàm $q2$.

Demonstr.

| | |
|-------|--|
| 2. b. | Incrementum $O.2a$, est $O2+2$. |
| 8. p. | Incrementum $m2$, est $2m+u$. |
| 8. p. | Incrementum $q2$, est $2q+u$. |
| 7. b. | $O,2 : 2m$. |
| | $O.2+2$, est maior, quàm $2m+u$. |
| | Incrementum $O.2a$, est maius incremento $m2$. |

Quod &c.

L 2

O.2

def. 19. $O.2+2 : 2m+2 : 2l.$
 & 18.b. $O.2+2$, est minor, quàm $2q.$
 $O.2+2$, est minor, quàm $2q+u.$
 Incrementum $O.2a$, est minus incremento $q2.$
 Quod &c.

26. b. $O.2a$, pro binario, est maior, quàm $m2$; minor,
 quàm $q2.$

$O.2a$, pro ternario, est maior, quàm $m2$; mi-
 nor, quàm $q2$: item pro quaternario, & pro
 reliquis numeris. Quod &c.

Dico $O.3a2$ incrementum, maius esse incremento
 $m3$; minus incremento $q3$: & $O.3a2$, maiorem esse,
 quàm $m3$; minorem, quàm $q3$.

Demonstr.

6. b. Incrementum $O.3a2$, est $O.6a+O.3+3.$

8. p. Incrementum $m3$, est $3m2+3m+4.$

8. p. Incrementum $q3$, est $3q2+3q+u.$

sup. $O6a$, est maior, quàm $3m2.$

sup. $O.3 : 3m.$

$O.3+3$, maior est, quàm $3m+u.$

Incrementum $O.3a2$, est maius incremento $m3.$

Quod &c.

sup. $O.6a$, est minor, quàm $3q2.$

sup. $O.3+3$, est minor, quàm $3q+u.$

Incrementum $O.3a2$, est minus incremento $q3.$

Quod &c.

26. b. $O.3a2$, pro binario, est maior, quàm $m3$; minor,
 quàm $q3.$ $O.3a2,$

$O.3a2$, pro ternario, est maior, quam $m3$; minor, quam $q3$: necnon pro quaternario, & reliquis deinceps numeris. Quod &c.

Dico $O.6ar$ incrementum, maius esse incremento $m3$; minus incremento $q3$: & $O.6ar$, maiorem esse, quam $m3$; minorem, quam $q3$.

Demonstr.

2. b. Incrementum $O.6ar$, est $O.6r + 6t$.
 8. p. Incrementum $m3$, est $3m2 + 3m + 2$.
 8. p. Incrementum $q3$, est $3q2 + 3q + 4$.
 $O.6r$, maior est, quam $3m2$.
 $6t$, maior est, quam $3m + 2$.
 Incrementum $O.6ar$, maius est incremento $m3$.
 Quod &c.

29. b. $O.2r + 2t$, minor est, quam $q3$.
 $O.6r + 6t$, minor est, quam $3q2 + 3q + 4$.
 Incrementum $O.6ar$, minus est incremento $q3$.
 Quod &c.

28. u. $O.6ar$, pro binario, est maior, quam $m3$; minor, quam $q3$.
 $O.6ar$, pro ternario, & pro reliquis numeris, est maior, quam $m3$, minor, quam $q3$. Quod &c.

Dico $O.4a3$ incrementum, maius esse incremento $m4$; minus incremento $q4$: & $O.4a3$, maiorem esse, quam $m4$; minorem, quam $q4$.

De-

Demonstr.

2. b. | Incrementū $O.4a3$, est $O.12a2 + O.12a + O.4 + 4$.

3. p. | Incrementum $m4$, est $4m3 + 6m2 + 4m + u$.

3. p. | Incrementum $q4$, est $4q3 + 6q2 + 4q + u$.

sup. | $O.12a2$, maior est, quàm $4m3$.

sup. | $O.12a$, maior, quàm $6m2$.

sup. | $O.4 : 4m$.

4 maior, quàm u .

Incrementum $O.4a3$, maius incremento $m4$.

Quod &c.

sup. | $O.12a2$, minor est, quàm $4q3$.

sup. | $O.12a$, minor, quàm $6q2$.

sup. | $O.4 + 4 : 4m + 4 : 4t$.

$O.4 + 4$, minor est, quàm $4q + u$.

Incrementum $O.4a3$, minus incremento $q4$.

Quod &c.

16. b. | $O.4a3$, pro binario, maior est, quàm $m4$; minor, quàm $q4$.

$O.4a3$, pro ternario, & pro alio quolibet numero, maior est, quàm $m4$; minor quàm $q4$. Quod &c.

Dico $O.12a2r$ incrementum, maius esse incremento $m4$; minus incremento $q4$: & $O.12a2r$, maiorem esse, quàm $m4$; minorem, quàm $q4$.

Demonstr.

2. b. | Incrementum $O.12a2r$, est $O.24ar + O.12r + 12r$.

3. p. | Incrementum $m4$, est $4m3 + 6m2 + 4m + u$.

In-

8. p. Incrementum q_4 , est $4q_3 + 6q_2 + 4q + u$.
sup. $O. 24ar$, maior est, quàm $4m_3$.
sup. $O. 12r$, maior, quàm $6m_2$.
 $12t$, maior, quàm $4m + u$.
 Incrementum $O. 12a2r$, maius est incremento m_4 .
 Quod &c.
sup. $O. 24ar$, minor est, quàm $4q_3$.
 29. b. $O. 12r + 12t$, minor, quàm $6q_2 + 4q + u$.
 Incrementum $O. 12a2r$, minus incremento q_4 .
 Quod &c.
 26. b. $O. 12a2r$, pro binario, maior, quàm m_4 ; minor
 est, quàm q_4 .
 $O. 12a2r$, pro ternario, maior est, quàm m_4 ; mi-
 nor, quàm q_4 , necnon quo alio quolibet nu-
 mero. Quod &c.

Dico $O. 5a4$, incrementum, maius esse incremento m_5 ;
 minus incremento q_5 : & $O. 5a4$, maiorem esse, quàm m_5 ;
 minorem, quàm q_5 .

Demonstr.

2. b. Incrementum $O. 5a4$, est $O. 20a_3 + O. 30a_2$
 $+ O. 20a + O. 5 + 5$.
 8. p. Incrementum m_5 , est $5m_4 + 10m_3 + 10m_2$
 $+ 5m + u$.
 8. p. Incrementum q_5 , est $5q_4 + 10q_3 + 10q_2 + 5q + u$.
sup. $O. 20a_3$, maior est, quàm $5m_4$.
sup. $O. 30a_2$ maior est, quàm $10m_3$.
sup. $O. 20a$ maior est, quàm $10m_2$.

sup. $O.5+5$, maior est, quàm $5m+u$.
Incrementum $O.5a4$, maius est incremento $m5$.
Quod &c.

sup. $O.20a3$, minor est, quàm $5q4$.

sup. $O.30a^2$, minor est, quàm $10q3$.

sup. $O.20a$, minor est, quàm $10q^2$.

sup. $O.5+5$ minor est, quàm $5q+u$.

Incrementum $O.5a4$, minus est incremento $q5$.

Quod &c.

26. b. $O.5a4$, pro binario, maior est, quàm $m5$; minor, quàm $q5$.

$O.5a4$, pro ternario, & reliquis numeris, maior est, quàm $m5$; minor, quàm $q5$. Quod &c.

Dico $O.20a3r$, incrementum, maius esse incremento $m5$; minus incremento $q5$: & $O.20a3r$, maiorem esse, quàm $m5$; minorem, quàm $q5$.

Demonstr.

2. b. $O.20a3r$ incrementum, est $O.60a2r + O.60ar + O.20r + 20t$.

8. p. Incrementum $m5$, est $5m4 + 10m3 + 10m2 + 5m + u$.

8. p. Incrementum $q5$, est $5q4 + 10q3 + 10q2 + 5q + u$.

sup. $O.60a2r$, maior est, quàm $5m4$.

sup. $O.60ar$, maior est, quàm $10m3$.

sup. $O.20r$, maior est, quàm $10m2$.

$20t$, maior est, quàm $5m+u$.

Incrementum $O.20a3r$, maius est incremento $m5$.

Quod &c.

$O.60$

- sup.* $O.60a2r$, minor est, quàm $5q4$.
sup. $O.60ar$, minor est, quàm $10q3$.
 19. *b.* $O.20r+20t$, minor est, quàm $10q2+5q+u$.
 Incrementum $O.20a3r$, minus est incremento $q5$.
 Quod &c.
 26. *b.* $O.20a3r$, pro binario, maior est, quàm $m5$; minor, quàm $q5$.
 $O:20a3r$, pro ternario, & reliquis numeris, maior est, quàm $m5$; minor, quàm $q5$. Quod &c.

Dico $O.30a2r2$ incrementum, maius esse incremento $m5$; minus incremento $q5$: & $O.30a2r2$, maiorem esse, quàm $m5$; minorem, quàm $q5$.

Demonstr.

2. *b.* Incrementum $O.30a2r2$, est $O.60ar2+O.30r2+30t2$.
 8. *p.* Incrementum $m5$, est $5m4+10m3+10m2+5m+u$.
 8. *p.* Incrementum $q5$, est $5q4+10q3+10q2+5q+u$.
sup. $O.60ar2$, maior est, quàm $5m4$.
sup. $O.30r2$, maior est, quàm $10m3$.
 $O.30t2$, maior est, quàm $10m2+5m+u$.
 Incrementum $O.30a2r2$, majus est incremento $m5$. Quod &c.
sup. $O.60ar2$, minor est, quàm $5q4$.
 29. *b.* $O.30r2+30t2$, minor est, quàm $10q3$.
 Incrementum $O.30a2r2$, minus est incremento $q5$. Quod &c.

26. b. | O.3042r2, pro binario, maior est, quàm $m5$;
minor, quàm 95 .

O.3042r2, pro ternario, aliove quolibet nume-
ro, maior est, quàm $m5$; minor, quàm 95 .
Quod &c.

Similiter ostendetur de omnibus quadratricibus in infi-
nitum, hac semper methodo seruata.

Quare &c.

Theor. 31. Prop. 31.

Quælibet quadratrix est æqualis semitotæ vnitate plus
ordinatæ, additis, demptisque semitotis, aliqua-
liter acceptis, non plus ordinatis, quàm sit eius
basis.

Demonstr.

Patet inductione per 6. b.

22. b. | Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqua-
lis totæ, vnitate plus ordinatæ, demptis, additisq;
aliqua-
liter acceptis totis, non plus ordinatis, quàm

6. b. | sit eius basis. Tota verò vnitate plus ordinata, est
æqualis semitotæ pariter ordinatæ, vnà cum semi-
totis non plus ordinatis, aliqua-
liter acceptis, &
vnitate: & reliquæ totæ non plus ordinatæ, sunt
æquales semitotis, non plus ordinatis, aliqua-
liter acceptis, & vnitati.

Quare quælibet quadratrix est æqualis semitotæ vnita-
re plus ordinatæ additis &c.

Theor.

Theor. 32. Prop. 32.

Quælibet quadratrix est æqualis sesquitotæ, vnitæ plus ordinatæ, demptis, additisque sesquitotis, aliquo modo acceptis, non plus ordinatis, quam sit eius basis.

Demonstr.

Patet inductione per 7. h.

22. b.

Deinde sic. Qualibet quadratrix, est æqualis totæ, vnitæ plus ordinatæ, demptis, additisque aliquo modo acceptis totis, non plus ordinatis, quàm

7. b.

fit eius basis. Tota verò, vnitæ plus ordinatæ, æqualis est sesquitotæ, pariter ordinatæ, demptis, additisque alijs, acceptis aliquo modo sesquitotis non plus ordinatis: & reliquæ totæ non plus ordinatæ, sunt sesquitotis additis, & subtractis, non plus ordinatis æquales. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis sesquitotæ vnitæ plus ordinatæ, demptis, additisque alijs, acceptis aliquo modo sesquitotis, non plus ordinatis, quam sit eius basis.

Theor. 33. Prop. 33.

Quælibet quadratrix media, est æqualis quadratrici, in eadem basi, primæ, vna cum alijs primi lateris specibus, aliquo modo acceptis. Et subquadratrix, subquadratrici.

Demonstr.

Patet inductione per 8. h.

22. b. Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis totæ, vnitate plus ordinatæ, quàm sit eius basis, demptis, additisue alijs totis, aliquàliter acceptis,
14. b. non plus ordinatis, quàm sit eius basis. Tota autè vnitate plus ordinata, est æqualis quadratrici primæ, in æqueordinata basi iacenti, vna cum alijs speciebus, in primo latere, in inferioribus basibus, aliquàliter acceptis. Et reliquæ inferiores totæ, similiter inferioribus quadratricibus, & speciebus sunt æquales, aliquàliter acceptis. Quare quælibet quadratrix media, est æqualis primæ, in eadem basi, iacenti quadratrici, vnà cum alijs primi lateris speciebus, aliquàliter acceptis. Et subquadratrix, subquadratrici.
2. p.

Theor. 34. Prop. 34.

Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, vicinæ, additis vtrinque totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

Demonstr.

Patet inductione per 9. b.

21. b. Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis vtrinque alijs inferiorum basium speciebus, aliquàliter acceptis, & totis non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Sunt autem aliæ inferiorum basium species, æquales totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa
22. b.

- | ipsa basis, aequaliter acceptis. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ additis vtrinq; totis, nō plus ordinatis quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix subquadratrici.
2. p.
-

Theorema 35. Prop. 35.

Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis vtrimque semitotis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

Demonstr.

Patet inductione per 10. h.

34. b. | Deinde sic. Quælibet quadratrix est æqualis quadratrici, in eadē basi, sibi vicinæ, additis vtrinq; totis non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Totæ autem non plus ordinatæ, semitotis non plus ordinatis, acceptis aequaliter, sunt æquales. Ergo quælibet quadratrix est æqualis quadratrici in eadem basi sibi vicinæ, additis vtrimque semitotis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.
6. b.
2. p.
-

Theor. 36. Prop. 36.

Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis vtrimque sesquitoris, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis. Et subquadratrix, subquadratrici.

De-

Demonstr.

Patet inductione per 11. h.

34. b. Deinde sic. Quælibet quadratrix est æqualis quadratrici, in eadem basi, sibi vicinæ, additis vtrisque totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis.
7. b. Totæ autem, non plus ordinatæ, sesquialteris, non plus ordinatis, acceptis aliquàlter, sunt æquales. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, in eadē basi, sibi vicinæ, additis vtrisque totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis.
2. p. Et subquadratrix, subquadratrici.

Theor. 37. Prop. 37.

Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, sibi, in eadem basi, vicinæ, additis vtrisque primi lateris speciebus, inferiorum basium. Et subquadratrix, subquadratrici.

Demonstr.

Patet inductione per 12. h.

34. b. Deinde sic. Quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici, sibi, in eadē basi vicinæ, additis vtrisque totis, non plus ordinatis, quàm sit ipsa basis, aliquàlter acceptis. quæ totæ, sunt æquales speciebus inferiorum basium, primi lateris, aliquàlter acceptis.
14. b. Ergo quælibet quadratrix, est æqualis quadratrici sibi in eadem basi vicinæ, additis vtrisque primi lateris speciebus, inferiorum basium. Et subquadratrix, subquadratrici.
2. p.



Petrus Mengolus, Illustrissimo D. Fabio Alamandino, Nobili Bononiensi, Domino suo maxime recolendo, beatè viuere.



E quasi proportionibus, inauditum hucusque Geometricum elementum, ad theoremata, cateroqui difficillima, facili negotio soluenda, cum instituerim: ex ijs, qui meam scholam frequentarunt, prater te, Iuuenis Illustrissime, neminem habeo satis dispositum; qui rem subtilissimam valeat intelligere. Cumque verear, si forte possit intelligi, quod legendum omnibus propono; nisi prius ipse ore tenus, alicui eius doctrina satis capaci, meam sententiam explicauerim: apud te precatore accessi; ut dignareris (licet vacationum tempore admodum necessario) ruralibus partim delicijs, partim negotijs quidquam detrabere; priuatisque meis lucubrationibus auditor interuenire. Pro tua benignitate statim, quod postulabam, imple-

plenisti : & concessum tibi diuinitus intellectum
 subtilissimum, inuentis meis, ea intentione adhi-
 buisti; ut & me ipsum inuentorem, & praelecto-
 rem, in plurimis etiam praeuenires. Plurimas ita-
 que tibi primum gratias profiteor: quod tam humi-
 liter, & liberaliter, me de studijs meis privatis
 tecum patiaris communicare. Deinde illas easdem
 lucubrationes, unà cum alijs praecedentium elemen-
 torum, plenius tractatas, praelegendas offero, scri-
 ptis praesentibus; antequam totum opus pu-
 blici iuris esse incipiat: non quasi gra-
 tiam redditurus; sed in mei erga
 te obsequij monumentum.

Vale.






GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

ELEMENTVM TERTIVM.

DEFINITIONES.



I. **R**atio indeterminata determinabilis, quæ indeter-
minari, potest esse maior, quam data,
quælibet, quatenus ita determinabilis, di-
cetur Quasi infinita.

2. Et quæ potest esse minor, quàm data quælibet, qua-
tenus ita determinabilis, dicetur, Quasi nulla.

3. Et quæ potest esse minor, quàm data quælibet ma-
ior inæqualitas; & maior, quàm data quælibet minor inæ-
qualitas, quatenus ita determinabilis, dicetur, Quasi æqua-
litas. Vel aliter. quæ potest esse propior æqualitati,
quàm data quælibet non æqualitas, quatenus talis, dice-
tur, Quasi æqualitas.

4. Et quæ potest esse minor, quàm data quælibet ma-
ior, propositâ quadam ratione; & maior, quàm data quæ-
libet minor, propositâ eadem ratione, quatenus ita deter-

minat

N

mina-

minabilis, dicetur, Quasi eadem ratio. Vel aliter. Quae potest esse propior cuidam propositæ rationi, quam data quælibet alia non eadem, quatenus talis, dicetur, Quasi eadem.

5. Et rationum quasi earundem inter se, termini dicentur, Quasi proportionales.

6. Et quasi æqualitatum, dicentur, Quasi æquales.



Theor. 1. Prop. 1.

I Næqualium rationum maior, permutando, est maior, item componendo, & diuidendo, est maior.

Demonstr.

def. 8. 5. | Maioris enim rationis antecedens, maior est, quàm proportionalis, cum reliquis terminis: & dempta quantitate, vt proportionalis relinquatur; *2. p.* | permutando, & componendo, & diuidendo, proportionalis erit, & antecedens: eademq; restituta *3. 5.* | quantitate, erit antecedens maior, quàm proportionalis, permutatæ, aut compositæ, aut diuisæ proportionalitatis. Quod &c.

Quare &c.

Theorema 2. Prop. 2.

I Næqualium rationum maior, conuertendo, est minor.

Demonstr.

def. 2. 5. | Nam maioris rationis consequens est minor, quàm proportionalis, cum reliquis terminis: factusque conuertendo antecedens, adhuc est minor, quàm proportionalis, cum reliquis terminis. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 3. Prop. 3.

I Næqualium rationum maior, per conuersionem rationis, est minor.

N 2

Hy-

p. b. | $a_3; b_3$: maior, quàm $a_2; b_2$. Quod &c.
 2. b. | $b_3; a_3$: minor, quàm $b_2; a_2$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 6. Prop. 6.

SI prima ad secundam, maiorem habuerit rationem, quàm tertia ad quartam: etiam æqueproportionales cum prima, & tertia, ad æqueproportionales cum secunda, & quarta, maiorem habebunt rationem, si prout sibi respondent, ita sumantur.

Hypoth.

$a; b$: maior, quàm $c; d$.

$a; c$: $e; f$.

$b; d$: $g; h$.

Dico $e; g$: maiorem esse, quàm $f; h$.

Demonstr.

hypoth. | $a; b$: maior, quàm $c; d$.

p. b. | $a; c$: maior, quàm $b; d$.

13. 5. | $e; f$: maior, quàm $g; h$.

p. b. | $e; g$: maior, quàm $f; h$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 7. Prop. 7.

Ratio quasi infinita, conuertendo, est quasi nulla.

Hypoth.

Estto ratio A ad B ; quasi infinita.

Dico conuertendo, B ad A , esse quasi nullam.

Pro-

*Prepar.*Assumatur quælibet ratio c ad d .*Demonstr.**def. 1. b.* Ratio A ad B , maior potest esse, quàm d ad c :*2. h.* Ergo conuertendo, B ad A , minor potest esse,*def. 2. b.* quàm c ad d . Ergo B ad A , est ratio quasi nulla.

Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 8. Propos. 8.***R**atio quasi infinita, componendo, est quasi infinita:
item diuidendo, est quasi infinita.*Hypoth.*Esto ratio A ad B , quasi infinita.Dico componendo $A+B$ ad B , esse quasi infinitam.*Prepar.*Assumatur quælibet ratio c ad d : quod si c , est maior, quàm d ; sit excessus e .*Demonstr.*

8. 5. Siquidem c est æqualis, vel minor, quàm d : patet, quod $A+B$ ad B , maior potest esse, quàm c ad d . Quod si e est maior, quàm d : quoniam

def. 1. A ad B , maior potest esse, quàm c ad d : ergo componendo, $A+B$ ad B , maior potest esse, quàm $c+d$ ad d : sed $c+d$ est c : ergo $A+B$ ad B , maior potest esse, quàm c ad d . Ergo $A+B$ ad B , ratio est quasi infinita. Quod &c.

Dico

p. b. | $a_3; b_3$: maior, quàm $a_2; b_2$: Quod &c.
2. b. | $b_3; a_3$: minor, quàm $b_2; a_2$: Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 6. Prop. 6.

SI prima ad secundam, maiorem habuerit rationem, quàm tertia ad quartam: etiam æqueproportionales cum prima, & tertia, ad æqueproportionales cum secunda, & quarta, maiorem habebunt rationem, si prout sibi respondent, ita sumantur.

Hypoth.

$a; b$: maior, quàm $c; d$.

$a; c$: $e; f$.

$b; d$: $g; h$.

Dico $e; g$: maiorem esse, quàm $f; h$.

Demonstr.

hypoth. | $a; b$: maior, quàm $c; d$.

p. b. | $a; c$: maior, quàm $b; d$.

13. 5. | $e; f$: maior, quàm $g; h$.

p. b. | $e; g$: maior, quàm $f; h$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 7. Prop. 7.

Ratio quasi infinita, conuertendo, est quasi nulla.

Hypoth.

Esto ratio A ad B , quasi infinita.

Dico conuertendo, B ad A , esse quasi nullam.

Pra-

*Prepar.*Assumatur quaelibet ratio c ad d .*Demonstr.*

def. 1. b. Ratio A ad B , maior potest esse, quàm d ad c ;

2. b. Ergo conuertendo, B ad A , minor potest esse,

def. 2. b. quàm c ad d . Ergo B ad A , est ratio quasi nulla.

Quod &c.

Quare &c.

Theor. 8. Propos. 8.

Ratio quasi infinita, componendo, est quasi infinita:
item diuidendo, est quasi infinita.

*Hypoth.*Esto ratio A ad B , quasi infinita.Dico componendo $A+B$ ad B , esse quasi infinitam.*Prepar.*Assumatur quaelibet ratio c ad d : quod si c , est maior, quàm d ; sit excessus e .*Demonstr.*

S. 5. Siquidem c est æqualis, vel minor, quàm d : pa-
def. 1. tet, quod $A+B$ ad B , maior potest esse, quàm
p. h. c ad d . Quod si c est maior, quàm d : quoniam
prepar. A ad B , maior potest esse, quàm c ad d : ergo
def. 1. componendo, $A+B$ ad B , maior potest esse, quàm
 $e+d$ ad d : sed $e+d$ est c : ergo $A+B$ ad B , ma-
ior potest esse, quàm c ad d . Ergo $A+B$ ad B ,
ratio est quasi infinita. Quod &c.

Dico

Dico diuidendo $A-B$ ad B , rationem esse quasi infinitam.

Demonstr.

def. 1. | Ratio A ad B , potest esse maior, quàm $c+d$ ad d .
 p. 14. | Ergo diuidendo $A-B$ ad B , potest esse maior,
 def. 1. | quàm c ad d . Ergo $A-B$ ad B , ratio est quasi
 infinita. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 9. Pro. 9.

Ratio quasi infinita, per conuersionem rationis, est quasi æqualitas.

Hypoth.

Esto ratio A ad B , quasi infinita.

Dico, per conuersionem rationis, A ad $A-B$, esse quasi æqualitatem.

Præpar.

Assumatur quælibet ratio non æqualitas, cuius maior terminus c , minor d .

Demonstr.

def. 1. b. | Ratio A ad B , potest maior esse, quàm c ad
 3. b. | $c-d$: ergo, per conuersionem rationis, A ad
 | $A-B$, potest minor esse, quàm c ad d : & est
 | maior æqualitate: ergo A ad $A-B$, est proportio
 def. 3. b. | æqualitati, quàm sit proposita ratio c ad d : ergo
 | ratio A ad $A-B$, est quasi æqualitas. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. I c. Prop. I c.***R**atio quasi nulla, conuertendo, est quasi infinita.*Hypoth.*Est ratio A ad B , quasi nulla.Dico conuertendo, rationem B ad A , esse quasi infinitam.*Prepar.*Assumatur quælibet ratio c ad d .*Demonstr.*

def. 2. b. Ratio A ad B , minor potest esse, quam d ad
2. b. c : ergo conuertendo, ratio B ad A , maior potest
def. 1. b. esse, quam c ad d : ergo ratio B ad A , est quasi
 infinita. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. II. Prop. II.***R**atio quasi nulla, componendo, est quasi æqualitas.*Hypoth.*Est ratio A ad B , quasi nulla.Dico componendo, rationem $A+B$ ad B , esse quasi æqualitatem.*Prepar.*Assumatur quælibet ratio c ad d , non æqualitas; cuius maior terminus c , minor d .*Demonstr.*

def. 2. b. Ratio A ad B , potest minor esse, quam c ad
2. b. d : ergo conuertendo, B ad A , potest maior
7. b. esse, quam d ad $c-d$: ergo componendo $A+B$
 O ad

3. h. | ad A , potest maior esse, quàm c ad $c \dashv d$: ergo
 per conuersionem rationis $A \dashv B$ ad B potest mi-
 nor esse, quàm c ad d : & est maior æqualitate: er-
 go $A \dashv B$ ad B , est propior æqualitati, quàm c ad d :
 def. 3. b. | ergo $A \dashv B$ ad B , est quasi æqualitas. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 12. Prop. 12.

EX rationibus quasi infinitis, ex æquali, quasi infinitæ
 sunt rationes compositæ.

Hypoth.

A ad B , & C ad D , sunt rationes quasi infinitæ.

Dico ex æquali, ex A ad B , & C ad D compositam,
 esse quasi infinitam.

Præpar.

Assumatur e ad f , ratio quælibet.

Demonstr.

Quoniam A ad B , & C ad D , sunt rationes
 def. 1. b. | quasi infinitæ: posunt esse A ad B , maior, quàm
 4. b. | e ad f ; & C ad D , maior æqualitate. Quare
 & utrisque A ad B , & C ad D , composita ra-
 tio, potest esse maior, quàm ex e ad f , & ex
 7. 5. | æqualitate, composita; idest, quàm ipsa e ad f
 def. 1. b. | ratio. Quare ex utrisque A ad B , & C ad D ,
 composita ratio est quasi infinita. Quod &c.
 Quare &c.

Theor.

Theor. 13. Prop. 13.

EX rationibus quasi nullis, ex æquali, quasi nullæ sunt rationes compositæ.

Hypoth.

A ad B , & C ad D , sunt rationes quasi nullæ.

Dico ex æquali, ex A ad B , & C ad D rationem compositam, esse quasi nullam.

Prepar.

Assumatur quælibet ratio e ad f .

Demonstr.

Quoniam A ad B , & C ad D sunt rationes quasi nullæ, possunt esse, A ad B , minor, quàm e ad f : & C ad D , minor æqualitate. Quare ex utrisque A ad B , & C ad D , composita ratio, potest esse minor, quàm ex utrisque e ad f , & ex æqualitate composita, idest, quàm ipsa e ad f . Quare ex utrisque A ad B , & C ad D , composita ratio est quasi nulla. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 14. Prop. 14.

Ratio quasi æqualitas, convertendo, est quasi æqualitas.

Hypoth.

Esto ratio A ad B , quasi æqualitas.

Dico convertendo, B ad A , quasi æqualitatem esse.

Prepar.

Assumantur duæ quælibet rationes, c ad d , maior æqualitate: & e ad f , minor.

Demonstr.

Quoniam ratio c ad d , est maior æqualitate; ergo conuertendo, d ad c , est minor æqualitate: & quoniam e ad f , est minor æqualitate; ergo conuertendo f ad e , est maior æqualitate. Et quoniam A ad B , est quasi æqualitas: ergo potest A ad B , maior esse, quàm d ad c , & minor, quàm f ad e : ergo conuertendo potest B ad A , minor esse, quàm c ad d , & maior, quàm e ad f . Ergo B ad A , est quasi æqualitas. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 15. Prop. 15.

Ratio quasi æqualitas, componendo, est quasi dupla.

Hypoth.

Esto ratio A ad B , quasi æqualitas.

Dico componendo $A + B$ ad B , esse quasi duplam.

Prepar.

Assumatur duæ quælibet rationes c ad d , maior, quàm dupla: & e ad f , maior quidem æqualitate, sed minor, quàm dupla.

Demonstr.

Quoniam c ad d , est maior, quàm dupla, diuidendo, $c - d$ ad d , est maior æqualitate: & quo-

constr. | quoniam e ad f , est maior æqualitate, sed mi-
p. b. | nor, quàm dupla; diuidendo, $e - f$ ad f , est minor
def. 3. b. | æqualitate. Et quoniam A ad B , est quasi æqua-
p. b. | litas; potest A ad B , minor esse, quàm $c - d$ ad
def. 4. b. | d ; & maior, quàm $e - f$ ad f . Ergo compo-
 nendo, potest $A + B$ ad B , minor esse, quàm c ad
 d ; & maior, quàm e ad f . Ergo $A + B$ ad B ,
 est quasi dupla. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 16. Prop. 16.

Ratio quasi æqualitas, diuidendo, est quasi nulla.

Hypoth.

Esto ratio A ad B quasi æqualitas: & esto A maior,
 quàm B .

Dico diuidendo $A - B$ ad B , esse quasi nullam.

Prepar.

Assumatur quælibet ratio c ad d .

Demonstr.

hyp. | Quoniam A ad B , est quasi æqualitas; & est A
 ... | maior, quàm B ; & $c + d$ maior, quàm d : ergo
def. 3. b. | potest A ad B ratio, minor esse, quàm $c + d$ ad
p. b. | d : ergo diuidendo potest $A - B$ ad B ratio, mi-
def. 3. b. | nor esse, quàm c ad d : ergo $A - B$ ad B , ratio
 est quasi nulla. Quod &c.

Quare &c.

Theor.

Theor. 17. Prop. 17.

Ratio quasi æqualitas, per conuersionem rationis est quasi infinita.

Hypoth.

Esto ratio quasi æqualitas A ad B : & esto A maior, quàm B .

Dico, per conuersionem rationis, A ad $A--B$, rationem esse quasi infinitam.

Prepar.

Assumatur quælibet ratio maioris inæqualitatis c ad d .

Demonstr.

| | |
|-------------------|--|
| <i>hyp.</i> | Quoniam A ad B , est quasi æqualitas; & est A |
| <i>def. 3. b.</i> | maior, quàm B ; item c maior, quàm $c--d$: er- |
| <i>3. b.</i> | go ratio A ad B , potest minor esse, quàm c ad |
| | $c--d$: ergo per conuersionem rationis, A ad |
| | $A--B$ ratio, potest maior esse, quàm c ad d : & |
| | est maior omnibus, tum æqualitatis, tum minoris |
| <i>def. p. b.</i> | inæqualitatis rationibus: ergo A ad $A--B$ ratio |
| | est quasi infinita. Quod &c. |

Quare &c.

Theor. 18. Prop. 18.

Quæ eidem sunt quasi æqualia, inter se sunt quasi æqualia.

Hypoth.

Sunt A , B , quasi æqualia: item B , C , quasi æqualia.

Dico A , C , quasi æqualia esse.

Præ-

Prepar.

Assumatur quælibet ratio d ad e , non æqualitas: cuius maior terminus d , minor e . & inter d , e , media sumatur f .

Demonstr.

def. 3. b. Quoniam A , B , sunt quasi æqualia, potest A ad B , minus esse, quàm d ad f : & maius, quàm f ad d . Item B ad C potest minus esse, quàm f ad e , & maius, quàm e ad f . Ergo ex æquali, potest A ad C minus esse, quàm d ad e ; & *def. 3. b.* maius, quàm e ad d , ergo A ad C , quasi est æqualis. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 19. Propos. 19.

QUÆ eidem sunt quasi eædem rationes, inter se sunt quasi eædem.

Hypoth.

A ad B , quasi eadem est, quæ C ad D : & C ad D , quasi eadem, quæ E ad F .

Dico A ad B , quasi eandem esse quæ E ad F .*Prepar.*

Assumatur quælibet ratio g ad h , maior, quàm cui propior potest esse E ad F : & quælibet i ad l , minor.

Demonstr.

def. 4. b. Quoniam C ad D , quasi eadem est, quæ E ad F : potest C ad D , minor esse, quàm g ad h ; & *def. 4. b.* maior, quàm i ad l . Ergo g ad h , maior est, quàm

quàm cui propior potest esse C ad D ; & i ad l ,
def. 4. h. minor. Et quoniam A ad B , quasi est eadem,
 quæ C . ad D : ergo A ad B , potest esse minor,
constr. quàm g ad h ; & maior, quàm i ad l . Sed g ad
 h est quælibet assumpta, maior, quàm cui pro-
 prior potest esse E ad F ; & i ad l , est quælibet
def. 4. h. assumpta, minor: ergo A ad B , est quasi eadem,
 quæ E ad F . Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 20. Prop. 20.

Quasi proportionales, conuertendo, sunt quasi pro-
 portionales.

Hypoth.

Sint quasi proportionales A ad B , vt C ad D .

Dico conuertendo, quasi proportionales esse B ad A ,
 vt D ad C .

Prepar.

a. b. Sumatur quælibet e ad f , maior, quàm cui
 propior potest esse D ad C : & quælibet g ad h ,
 minor: & erit conuertendo, sumpta f ad e , mi-
 nor, quàm cui propior potest esse C ad D ; & h ad
 g , maior.

Demonstr.

hypoth. Quoniam A ad B , quasi est eadem, quæ C
def. 4. b. ad D : ergo A ad B , potest esse minor, quàm h
a. b. ad g ; & maior, quàm f ad e : ergo conuertendo,
 do,

• do, B ad A , potest esse maior, quàm g ad h ; &
def. 4. b. minor, quàm e ad f : ergo B ad A , quasi eadem
 est, quæ D ad C . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 21. Prop. 21.

EX quasi iisdem rationibus, ex æquali, quasi eadem
 sunt rationes compositæ.

Hypoth.

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| A | B | C | D |
| E | F | G | H |
| i | n | r | k |
| l | o | s | m |

A ad B , quasi eadem ratio est, quæ C ad D : & E ad
 F , quasi eadem, quæ G ad H .

Dico ex æquali, ex A ad B , & E ad F compositam,
 quasi eadem esse, quæ ex C ad D , & G ad H compo-
 sita.

Prepar.

Assumatur i ad k , quælibet ratio maior, quàm cui
 propior potest esse, ex C ad D , & G ad H composita:
 item assumatur quælibet l ad m , minor. Deinde fiant
 i ad n , & l ad o , sicut cui propior potest esse C ad D :
 item p ad k , & q ad m , sicut cui propior potest esse G
 ad H . Denique sumatur inter n, p , media quælibet quan-
 titas r : & inter o, q , media quælibet s .

P

De

Demonstr.

constr. Quoniam i ad k , maior est, quàm cui propior potest esse, ex C ad D , & G ad H composita; & est i ad n , cui propior potest esse C ad D ; &

4. *b.* p ad k , cui propior potest esse G ad H : ergo i ad k , maior est, quàm, quæ ex i ad n , & ex p ad k , composita. Ergo n , maior est, quàm p . Si

p. b. enim n , esset æqualis ipsi p : ex i ad n , & ex æqualitate, & ex p ad k , cõposita ratio i ad k , esset eadem, quæ ex ea, cui propior potest esse C ad D , ex æqualitate, & ex ea, cui propior potest esse G

4. *b.* ad H , composita est; contra assumptum. Quod si n , essent minor, quàm p : ex i ad n , & minori inæqualitate, & p ad k , composita ratio i ad k , esset minor, quàm quæ ex ea, cui propior potest esse C ad D , ex æqualitate, & ex ea, cui propior potest esse G ad H , composita est; contra idem assumptum.

constr. Ergo n , maior est, quàm p : & r , minor, quàm

8. 5. n ; & maior quàm p : habetque i ad r , maiorem rationem, quàm i ad n ; idest maiorem, quàm,

8. 5. cui propior potest esse C ad D : habet quoque r ad k , maiorem, quàm p ad k ; idest, maiorem, quàm, cui propior potest esse G ad H .

constr. Similiter, quoniam l ad m , minor est, quàm, cui propior potest esse ex C ad D , & G ad H composita: & est l ad o , eadem, cui propior potest esse C ad D : & q ad m , eadem, cui propior

4. *b.*

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> |
| <i>i</i> | <i>n</i> | <i>r</i> | <i>k</i> |
| <i>l</i> | <i>o</i> | <i>s</i> | <i>m</i> |
| | | <i>q</i> | |

4. b. | prior potest esse *G* ad *H*: ergo *l* ad *m*, minor
 est, quàm quæ est ex *l* ad *o*, & *q* ad *m* compo-
 sita. Ergo *o*, minor est, quàm *q*. demonstrari
 enim potest vt supra, quod si *o*, esset æqualis; vel
 p. h. | maior, quàm *q*: esset *l* ad *m* ratio non minor,
 4. b. | quàm cui propior potest esse, ex *C* ad *D*, & *G* ad
H composita; contra assumptum.

constr. | Cum itaque *o*, sit minor, quàm *q*: erit *s*, ma-
 8. 5. | ior, quàm *o*; minor, quàm *q*: habetque *l* ad *s*,
 minorem rationem, quàm *l* ad *o*; idest, minorem,
 8. 5. | quàm, cui propior potest esse *C*. ad *D*. habet quo-
 que *s* ad *m*, minorem rationem, quàm *q* ad *m*:
 idest, minorem, quàm, cui propior potest esse
G ad *H*.

Sup. | Itaque *i* ad *r*, maior est, quàm, cui propior
 hyp. | potest esse *C*. ad *D*: & *l* ad *s*, minor. Sed *A* ad
 def. 4. b. | *B*, quasi eadem est, quæ *C* ad *D*: ergo *A* ad *B*,
 potest esse minor, quàm *i* ad *r*, & maior, quàm
 sup. | *l* ad *s*. Similiter *r* ad *k* maior est, quàm, cui pro-
 hypob. | prior potest esse *G* ad *H*; & *s* ad *m*, minor: & est
 def. 4. b. | *E* ad *F*, quasi eadem, quæ *G* ad *H*: ergo *E* ad
F potest esse minor, quàm *r* ad *k*; & maior,
 4. b. | quàm *s* ad *m*. Ergo ex æquali, potest ex *A* ad *B*,

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | • |
| <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | |
| <i>i</i> | <i>n</i> | <i>r</i> | <i>p</i> | <i>k</i> |
| <i>l</i> | <i>o</i> | <i>s</i> | <i>q</i> | <i>m</i> |

constr. & *E* ad *F* composita, minor esse, quàm, quæ ex *i* ad *r*, & *r* ad *k*, componitur, *i* ad *k*; & maior, quàm, quæ ex *l* ad *s*, & *s* ad *m*, componitur, *l* ad *m*. Est autem *i* ad *k*, sumpta quælibet maior, quàm cui propior potest esse composita ex *C* ad *D*, & *G* ad *H*; & *l* ad *m*, minor.

def. 4. b. Ergo composita ex *A* ad *B*, & *E* ad *F*, quasi eadem est, quæ composita ex *C* ad *D*, & *G* ad *H*.
Quod &c.

Quare &c.

Theor. 22. Prop. 22.

Quasi proportionales, permutando, sunt quasi proportionales. *Hypoth.*

Sint quasi proportionales *A* ad *B*, vt *C* ad *D*.

Dico permutando, quasi proportionales esse *A* ad *C*, vt *B* ad *D*. *Demonstr.*

hypoth. Sunt enim quasi eædem rationes *A* ad *B*, & *B* ad *C*; quæ *B* ad *C*, & *C* ad *D*: ergo ex æquali, *A* ad *C*, & *B* ad *D*, rationes compolite sunt quasi eædem: Ergo *A* ad *C*, & *B* ad *D*, sunt quasi proportionales. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 23. Prop. 23.

Rationes quasi eadem, componendo, sunt quasi eadem.

Hypoth.

A ad B , quasi eadem esto, quæ C ad D .

Dico componendo $A+B$ ad B , quasi eadem esse, quæ $C+D$ ad D .

Prepar.

Assumatur e ad f , quælibet ratio maior, quàm cui propior potest esse $C+D$ ad D : itē g ad h , quælibet maioris inæqualitatis, sed minor.

Demonstr.

constr. Quoniam e ad f , maior est, quàm cui propior potest esse $C+D$ ad D : diuidendo, $e-f$ ad f , maior est, quàm cui propior potest esse C ad D .

constr. Item quoniam g ad h , minor est, quàm cui propior potest esse $C+D$ ad D : diuidendo $g-h$ ad h minor est, quàm cui propior potest esse C ad D .

hypoth. Sed A ad B , quasi eadem est, quæ C ad D : ergo A ad B , potest esse minor, quàm $e-f$ ad f ; & maior, quàm $g-h$ ad h . Ergo componendo $A+B$ ad B potest esse minor, quàm e ad f ; & maior, quàm g ad h . Ergo $A+B$ ad B , quasi eadem est, quæ $C+D$ ad D . Quod &c.

Quare &c.

Theor.

Theor. 24. Prop. 24.

Rationes quasi eadem, diuidendo, sunt quasi eadem.

Hypoth.

Sint rationes quasi eadem A ad B , & C ad D .

Dico diuidendo, quasi eadem esse rationes $A - B$ ad B , & $C - D$ ad D .

Prepar.

Assumatur e ad f , quælibet ratio maior, quàm cui propior potest esse $C - D$ ad D : & assumatur g ad h , quælibet minor.

Demonstr.

constr. Quoniam e ad f , maior est, quàm, cui propior potest esse $C - D$ ad D ; & g ad h , minor: ergo componendo $e + f$ ad f , maior est, quàm cui propior potest esse C ad D ; & $g + h$ ad h , minor.

hyp. Sed A ad B , quasi eadem est, quæ C ad D : ergo A ad B potest minor esse, quàm $e + f$ ad f ; & maior, quàm $g + h$ ad h . Ergo diuidendo $A - B$ ad B , potest minor esse, quàm e ad f ; & maior, quàm g ad h . Ergo $A - B$ ad B , quasi eadem est, quæ $C - D$ ad D . Quod Sic.

Quare Sic.

Theor. 25. Prop. 25.

Rationes quasi eadem, per conuersionem rationis, sunt quasi eadem.

Hypoth.

Hypoth.

Sint rationes quasi eadem, A ad B , & C ad D .

Dico per conuersionem rationis, quasi eadem esse rationes A ad $A - B$, & C ad $C - D$.

Demonstr.

- hyp.* | $A; B$: quasi $C; D$.
 24. *b.* | $A - B; B$: quasi $C - D; D$.
 20. *b.* | $B; A - B$: quasi $D; C - D$.
 21. *b.* | $A; A - B$: quasi $C; C - D$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 26. Propos. 26.

SI quotcumque quantitates fuerint quasi proportionales, colligendo, quasi proportionales erunt, omnes antecedentes, ad omnes consequentes.

Hypoth.

$A; B$: quasi $C; D$:

Dico $A + C; B + D$: quasi $C; D$.

Demonstr.

- hypoth.* | $A; B$: quasi $C; D$.
 22. *b.* | $A; C$: quasi $B; D$.
 23. *b.* | $A + C; C$: quasi $B + D; D$.
 22. *b.* | $A + C; B + D$: quasi $C; D$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 27. Pro. 27.

SI prima ad secundam quasi proportionalis fuerit, sicut tertia ad quartam; & quinta ad secundam, quasi sicut sexta

sexta ad quartam: erit prima cum quinta ad secundam,
quasi sicut tertia cum sexta ad quartam.

Hypoth.

$A; B$: quasi $C; D$.

$E; B$: quasi F ad D .

Dico $A + E; B$: quasi $C + F; D$.

Prepar.

hypoth. | $A; B$: quasi $C; D$.

22. b. | $A; C$: quasi $B; D$.

hypoth. | $E; B$: quasi $F; D$.

22. b. | $E; F$: quasi $B; D$.

19. b. | $A; C$: quasi $E; F$.

22. b. | $A; E$: quasi $C; F$.

23. b. | $A + E; E$: quasi $C + F; F$.

hypoth. | $E; B$: quasi $F; D$.

21. b. | $A + E; B$: quasi $C + F; D$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 28. Prop. 28.

Quasi partes, cum quasi æquemultiplicibus, in quasi eadem sunt ratione, si prout sibi mutuò respondent, ita sumantur.

Hypoth.

$A; B$: quasi tripla.

$C; D$: quasi tripla.

Dico $A; C$: quasi $B; D$.

Demonstr.

18. b. | $A; B: \text{quasi } C; D.$

22. b. | $A; C: \text{quasi } B; D. \text{ Quod \&c.}$

Quare &c.

Theor. 29. Prop. 29.

SI totam ad totam quasi proportionalis fuerit, ut ablatam ad ablatam: & reliqua ad reliquam, quasi proportionalis erit, ut tota ad totam.

Hypoth.

$A; B: \text{quasi } C: D.$

Dico $A---C; B---D: \text{quasi } A; B.$

Demonstr.

hypoth. | $A; B: \text{quasi } C; D.$

22. b. | $A; C: \text{quasi } B; D.$

25. b. | $A; A---C: \text{quasi } B; B---D.$

22. b. | $A---C; B---D: \text{quasi } A; B. \text{ Quod \&c.}$

Quare &c.

Theor. 30. Prop. 30.

Quantitates quasi proportionales, & per homologiam, sunt quasi proportionales.

Demonstr.

Nam conuertendo, quasi proportionales fiunt, 20. h: & colligendo, 26, & 27. h: & æquemultiplicando, & æquepartiando, 28. h: & permutando, 22. l: & diuidendo, 24. h: & componendo, 23. h: & homologas ab ho-

Q

mologis

mologis auferendo, 29. *h.* & per conuerſionem rationis, 25. *h.* & ex æquali, 21. *h.* & coniunctis omnifariam argumentis huiusmodi, quocumque ordine, per homologiam, quaſi proportionales fiunt.

Theor. 31. Prop. 31.

Quaſi æquales, ad quaſi æquales, rationes habent, vel quaſi infinitas vtraſque, vel quaſi nullas, vel quaſi eadem inter ſe.

Hypoth. comm.

A, B ſunt quaſi æquales.

C, D ſunt quaſi æquales.

Hypoth. p. caſus.

A; C : eſt quaſi infinita.

Dico *B; D* : eſſe quaſi infinitam.

Præpar.

Aſſumatur *e* ad *f*, quælibet ratio : vnde fit componendo *e + f* ad *f* : deinde per conuerſionem rationis *e + f* ad *e* : & conuertendo *e* ad *e + f*.

Demonſtr.

def. 3. b. | *B; A* : poteſt maioreſſe, quàm *e; e + f*.

def. p. b. | *A; C* : poteſt maior eſſe, quàm *e + f; f*.

4. h. | *B; C* : poteſt maior eſſe, quàm *e; f*.

def. p. h. | *B; C* : ratio eſt quaſi infinita.

def. p. b. | *B; C* : poteſt maior eſſe, quàm *e + f; f*.

def. 3. b. | *C; D* : poteſt maior eſſe, quàm *e; e + f*.

4. h. | *B; D* : poteſt maior eſſe, quàm *e; f*.

B; D :

def. p. b. | $B; D$: ratio est quasi infinita : Quod &c.

Hypoth. 2. casus.

$A; C$: est quasi nulla.

Dico $B; D$: esse quasi nullam.

Demonstr.

10. b. | $C; A$: quasi infinita.

sup. | $D; B$: quasi infinita.

7. b. | $B; D$: quasi nulla. Quod &c.

Hypoth. 3. casus.

$A; C$: neq; quasi infinita, neq; quasi nulla est.

Dico $B; D$: quasi esse $A; C$.

Demonstr.

B ad D , neque est quasi infinita, neque quasi nulla:

sup. | alioquin A ad C esset quasi infinita, vel quasi nulla, contra hypothesim.

19. b. | $A; B$: quasi $C; D$.

22. b. | $A; C$: quasi $B; D$: Quod &c.

Quare &c.

Theorema 32. Prop. 32.

SI prima ad secundam, rationem habuerit quasi infinitam; item ad tertiam, rationem quasi infinitam : habebit & ad vtriusque summam, & ad vtriusque differentiam, rationem quasi infinitam.

Hypoth.

$A; B$: quasi infinita.

$A; C$: quasi infinita.

Q 2

Dico

Dico $A; B \rightarrow C$: quasi infinitam esse.

Et $A; B \leftarrow C$: quasi infinitam esse .

Demonstr.

| | |
|----------------|--|
| <i>hypoth.</i> | $A; B$: quasi infinita . |
| 8. <i>b.</i> | $A \rightarrow B; B$: quasi infinita . |
| 9. <i>b.</i> | $A \rightarrow B; A$: quasi æqualis . |
| <i>hypoth.</i> | $A; C$: quasi infinita . |
| 31. <i>b.</i> | $A \rightarrow B; C$: quasi infinita . |
| 8. <i>b.</i> | $A \rightarrow B \rightarrow C; C$: quasi infinita . |
| 9. <i>b.</i> | $A \rightarrow B \rightarrow C; A \rightarrow B$: quasi æqualis . |
| <i>sup.</i> | $A \rightarrow B; A$: quasi æqualis . |
| 18. <i>b.</i> | $A \rightarrow B \rightarrow C; A$: quasi æqualis . |
| 16. <i>b.</i> | $B \rightarrow C; A$: quasi nulla . |
| 10. <i>b.</i> | $A; B \rightarrow C$: quasi infinita . Quod &c. |
| <i>sup.</i> | $A \rightarrow B; C$: quasi infinita . |
| 8. <i>b.</i> | $A \rightarrow B \leftarrow C; C$: quasi infinita . |
| 7. <i>b.</i> | $C; A \rightarrow B \leftarrow C$: quasi nulla . |
| 11. <i>b.</i> | $A \rightarrow B; A \rightarrow B \leftarrow C$: quasi æqualis . |
| <i>sup.</i> | $A; A \rightarrow B$: quasi æqualis . |
| 18. <i>b.</i> | $A \rightarrow B \leftarrow C; A$: quasi æqualis . |
| 17. <i>b.</i> | $A \rightarrow B \leftarrow C; B \leftarrow C$: quasi infinita . |
| 8. <i>b.</i> | $A; B \leftarrow C$: quasi infinita . Quod &c. |
| | . Quare &c. |

Theor. 33. Propos. 33.

SI fuerint tres termini, primus indeterminatus, reliqui duo determinati; fuerit autem primus ad secundum quasi

quasi æqualis: habebit secundus ad tertium eandem rationem, quàm quasi habet primus.

Hypoth.

Tres termini sunt, primus indeterminatus A ; reliqui duo determinati, b , & c . & est A ad b , quasi æqualis:

Dico b ad c eandem esse rationem, quàm quasi habet A ad c .

Prepar.

Assumatur d , æqualis ipsi c .

Demonst.

hypoth. | A ; b : quasi æqualis.

constr. | c ; d : æqualis.

def. 4. b. | A ; b : quasi c ; d .

22. b. | A ; c : quasi b ; d .

8. 5. | b ; d : b ; c .

19. b. | A ; c : quasi b ; c . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 34. Prop. 34.

Tota ad unitatem, quasi est infinita.

Demonstr.

Nam tota, cum non dicatur, cuius numeri tota sit; est indeterminata: ideoque totæ ad unitatem, ratio est indeterminata. Cumque possit dici, cuius numeri tota sit; est determinabilis: ideoque totæ ad unitatem, ratio est determinabilis. Cum denique possit dici eius numeri tota, qui maior sit, quàm ut ad unitatem, habeat quamlibet rationem

def. p. h. nem datam; quī numerus, ipsa sui ipsius est tota: erit ratio totæ ad vnitatem, maior, quàm data quælibet. Ergo tota ad vnitatem, quasi est infinita.

Theor. 35. Prop. 35.

Sesquitota ad vnitatem, quasi est infinita. Item semitota.

Demonstr.

34. h. | Tota ad vnitatem, quasi est infinita: ergo com-
8. h. | ponendo, sesquitota ad vnitatem, quasi est infi-
8. h. | nita. Item diuidendo, semitota ad vnitatem, qua-
si est infinita.

Theor. 36. Prop. 36.

TOta, sesquitota, & semitota, quasi sunt æquales inter se.

Demonstr.

35. h. | Sesquitota ad vnitatem, quasi est infinita: ergo
9. h. | per conuersionem rationis, sesquitota ad totam,
34. h. | quasi est æqualis. Rursum tota ad vnitatem quasi
9. h. | sit infinita: ergo per conuersionem rationis, tota
18. h. | ad semitoram, quasi est æqualis. Ergo sesquito-
ta ad semitoram, quasi est æqualis.

Theor. 37. Prop. 37.

TOta quantumlibet ordinata ad vnitatem, quasi est infinita. Item sesquitota, & semitota.

Dico

Dico $t_3 ; u$: quasi infinitum :

Demonstr.

34. b. | $t_3 ; u$: quasi infinita .

def. 6. p. | $t_3 ; u$: triplicata $t_3 ; u$.

12. b. | $t_3 ; u$: quasi infinita . Quod &c.

ex 35. b. | Similiter ostendetur $q_3 ; u$: quasi infinita :

| Item $m_3 ; u$: quasi infinita .

Quare &c.

Theor. 38. Prop. 38.

Totarum inæqualiter ordinarum , magis ordinata ,
ad minus ordinatam , quasi est infinita . Item sesqui-
totarum , & semitotarum .

Hypoth.

t_5 magis est ordinata , quam t_3 :

Dico $t_5 ; t_3$: quasi infinitam .

Demonstr.

34. b. | $t_5 ; u$: quasi infinita .

def. 6. p. | $t_5 ; t_4$: $t_3 ; u$.

def. 6. p. | $t_4 ; t_3$: $t_3 ; u$.

13. 5. | $t_5 ; t_4$: quasi infinita .

13. 5. | $t_4 ; t_3$: quasi infinita .

12. b. | $t_5 ; t_3$: quasi infinita . Quod &c.

Similiter ostendetur $q_5 ; q_3$: quasi infinita .

Et $m_5 ; m_3$: quasi infinita .

Quare &c.

Theor.

18. b. | $A+B=C, A+B, A=C$, quasi sunt æquales.
 Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 42. Prop. 42.

Quælibet quadratrix quasi est æqualis ad totam vnitatem plus ordinatam, quam sit eius basis. item ad semitotam: & ad sesquiototam.

Hypoth.

Est quadratrix A : & esto tota B , vnitatem plus ordinata, quam basis quadratricis A .

Dico A ad B , quasi æqualem esse.

Demonstr.

22. 2. | A , est æqualis ipsi B , demptis, additisque aliquantiter acceptis totis, non plus ordinatis, quam basis A . Sed B , est tota vnitatem plus ordinata, quam basis A ; ideòque totæ, non plus ordinatæ, quam basis A , sunt minus ordinatæ, quam B . Ergo A ; est æqualis ipsi B , demptis, additisque aliquantiter acceptis totis, minus ordinatis, quam

41. b. | B . Sed & B , demptis, additisque aliquantiter acceptis totis, minus ordinatis, quam B , quasi est

18. b. | æqualis ipsi B . Ergo A , quasi est æqualis ipsi B .
 Quod &c.

31. 2. | Idem, & eodem modo demonstraretur, si B

32. 2. | esset semitota: necnò si B esset sesquiotota. Quæ &c.

Quare &c.

T E R T I U M .

131

Theor. 43. Prop. 43.

Quælibet quadratrix, ad totas non plus ordinatas, quam sit eius basis, quomodolibet acceptas, quasi est infinita. item ad semitotas: necnon ad sesquitotas.

Hypoth.

Esto quadratrix *A*: & in *B* sint sumptæ totæ quomodolibet, vel semitotæ, vel sesquitotæ.

Dico *A* ad *B* quasi infinitam esse.

Prepar.

Sumatur *C*, tota, vnitæ plus ordinata, quam basis quadratricis *A*: vel semitota, vel sesquitota.

Demonstr.

| | | |
|--------|--|--|
| 41. b. | | <i>C</i> ; <i>B</i> : quasi infinita. |
| 42. b. | | <i>A</i> ; <i>C</i> : quasi æqualis. |
| 31. b. | | <i>A</i> ; <i>D</i> : quasi infinita. Quod &c. |

Quare &c.

Theor. 44. Prop. 44.

Rationis quasi infinitæ diuiso antecedente per datum numerum, ratio est quasi infinita.

Hypoth.

A ad *B*, quasi est infinita.

Dico subtriplem *A* ad *B*, quasi infinitam esse.

Prepar.

Assumatur quælibet ratio *c* ad *d*.

Demonstr.

| | |
|-------------------|---|
| <i>hypoth.</i> | $A; B$: quasi infinita. |
| <i>def. p. b.</i> | $A; B$: potest maior esse, quàm $3c; d$. |
| <i>p. b.</i> | $A; 3c$: potest maior esse, quàm $B; d$. |
| 15. 5. | $A; 3c$: subtripla $A; c$. |
| 13. 5. | Subtripla $A; c$: potest maior esse, quàm $B; d$. |
| <i>p. b.</i> | Subtripla $A; B$: potest maior esse, quàm $c; d$. |
| <i>def. p. b.</i> | Subtripla $A; B$: quasi est infinita. Quod &c. |
| | Quare &c. |

Theor. 45. Prop. 45.

Rationis quasi infinitæ multiplicato consequente,
ratio est quasi infinita.

Hypoth.

A ad B , quasi est infinita.

Dico A ad duplam B , quasi esse infinitam.

Prepar.

Assumatur quælibet ratio c ad d .

Demonstr.

| | |
|-------------------|--|
| <i>hypoth.</i> | $A; B$: quasi infinita. |
| <i>def. p. b.</i> | $A; B$: potest maior esse, quàm $2c; d$. |
| <i>p. b.</i> | $A; 2c$: potest maior esse, quàm $B; d$. |
| 15. 5. | $B; d$: $2B; 2d$. |
| 13. 5. | $A; 2c$: potest maior esse, quàm $2B; 2d$. |
| <i>p. b.</i> | $A; 2B$: potest maior esse, quàm $2c; 2d$. |
| 15. 5. | $2c; 2d$: $c; d$. |
| 13. 5. | $A; 2B$: potest maior esse, quàm $c; d$. |

 $A; 2B$:

def. p. h. $A; 2B$: quasi est infinita. Quod &c.

Quare &c.

Theorema 46. Prop. 46.

Ratio composita ex duabus rationibus, altera, quasi quadam proposita, altera, quasi infinita; quasi est infinita.

Hypoth.

$A; B$: quasi quadam proposita.

$B; C$: quasi infinita.

Dico $A; C$: quasi esse infinitam.

Prepar.

Assumatur quaelibet ratio, a ad e : item assumatur quaelibet d ad f , minor, quam, cui quasi eadem esse dicitur A ad B .

Demonstr.

hypoth. $B; C$: quasi est infinita.

def. p. h. $B; C$: potest maior esse, quam $f; e$.

def. 3. h. $A; B$: potest maior esse, quam $d; f$.

4. b. $A; C$: potest maior esse, quam $d; e$.

def. p. h. $A; C$: quasi est infinita. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 47. Prop. 47.

Quadratrices in eadem basi iacentes, inter se sunt quasi aequales.

Hyp.

*Hypoth.*Sint in eadem basi quadratrices A, B .Dico A, B , quasi æquales esse.*Prepar.*Sumatur C , tota, unitate plus ordinata, quam sit be-
lis ipsarum A, B .*Demonstr.*43. b. | $A; C$: quasi æqualis.43. b. | $B; C$: quasi æqualis.18. b. | $A; C$: quasi æqualis. Quod &c.

Quare &c.

*Theor. 48. Propos. 48.***S**ub quadratrics in eadem basi iacentes, sunt quasi
æquales.*Hypoth.*Sint in eadem basi subquadratrices A, B .Dico A, B , quasi æquales esse.*Prepar.*Sumantur homonymæ quadratrices C, D .*Demonstr.*def. 13. 2 | C ad A , æquemultiplex est, ut D ad B .15. 5. | $C; A; D; B$.16. 5. | $C; D; A; B$.47. b. | $C; D$: quasi æqualis.19. b. | $A; B$: quasi æqualis. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 49. Prop. 49.

IN diuersis basibus, quadratrix in magis ordinata, ad quadratricem in minùs ordinata, quasi est infinita,

Hypoth.

Sint quadratrices A, B , in diuersis basibus: A , in magis ordinata basi, quàm B .

Dico A ad B , quasi esse infinitam.

Prepar.

Assumatur tota C , vnitae plus ordinata, quàm sit basis quadratricis A : & tota D , vnitae plus ordinata, quàm sit basis quadratricis B .

Demonstr.

hypoth. | Quoniam A est in basi magis ordinata, quàm
38. *b.* | B : ergo etiam C est magis ordinata tota, quàm
42. *b.* | D : ergo C ad D , quasi est infinita. Sed C, A ,
31. *b.* | sunt quasi æquales: & D, B , quasi æquales. Er-
| go A ad B , quasi est infinita. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 50. Prop. 50.

IN diuersis basibus, quælibet massa in magis ordinata, ad quamlibet massam, in minùs ordinata, quasi est infinita.

Hypoth.

Sint massæ A, B , in diuersis basibus: A in magis ordinata basi, quàm B .

Dico A ad B , quasi esse infinitam.

Pre-

Prepar.

Assumantur quadratrices C, D : C quidem homonyma ipsi A ; & D , ipsi B .

*Demonstr.**hypoth.*

Quoniam A , est in basi magis ordinata, quàm B : etiam C , est in basi magis ordinata, quàm D : & C ad D , quasi est infinita. Est autem ratio A ad C , quædam proposita, quàm habent propositi numeri multiplicantes homonymam speciem: ergo ex æquali, A ad D , ratio est quasi infinita. Item D ad B , ratio est quædam proposita, quàm habent propositi numeri multiplicantes homonymam speciem: ergo ex æquali, A ad B , ratio est quasi infinita. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 51. Prop. 51.

Species in eadem basi iacentes, sunt reciproçè quasi proportionales, vt numeri, in tabula multiplicium, similiter iacentes. *Hypoth.*

Sint in eadem basi species A, B : & sint numeri similiter iacentes, in tabula multiplicium; c similiter, atque A ; & d , similiter, atque B .

Dico $A; B$: quasi $d; c$.

Prepar.

Sumantur subquadratrices E, F : E quidem homonyma ipsi A ; & F , ipsi B .

De-

Demonstr.
 deff. 11. | $A; E: u; a.$
 p. 2. | $E; F: \text{quasi } \alpha\text{qualis.}$
 48. b. | $F; B: d; u.$
 deff. 11. | $A; B: \text{quasi } d; c. \text{ Quod \&c. Quare \&c.}$
 p. 2. |
 21. b. |

Theor. 52. Prop. 52.

Massæ in eadem basi iacentes, quasi eandem habent rationem compositam, ex directa suorum numerorum, & reciproca numerorum in tabula multiplicium, similiter iacentiam.

Hypoth.

Sint in eadem basi, massæ A, B : quarum numeri c, d : c quidem, qui multiplicans homonymam speciem A , facit massam A ; & d , qui multiplicans homonymam speciem B , facit massam B . Et sint numeri e, f , similiter iacentes in tabula multiplicium; e quidem, sicut A ; & f , sicut B .

Dico $A; B: \text{quasi } c; d, + f; e.$

Præpar.

Sumantur species homonymæ: G, H : G quidem ipsi d ; & H , ipsi B .

Demonstr.

hypoth. | $A; G: c; d.$
 51. b. | $G; H: \text{quasi } f; e.$
hypoth. | $H; B: u; d.$
 21. b. | $A; B: \text{quasi } c; d, + f; e. \text{ Quod \&c. Quare \&c.}$

Problema primum Prop. 53.

Data ratione; datoque numero pariter pari: subtuplicatam rationem inuenire, quotus est datus numerus.

Hypoth.

Sit data ratio a ad b : datusque numerus c , pariter par.

Oportet rationem inuenire, subtuplicatam rationis, a ad b , quotus est c .

Constr.

Subdiuidatur numerus c , vsque ad vnitatem: & sit c ad d , duplus: & d ad f , duplus: & f ad vnitatem, duplus. Deinde sumatur, inter a , b , media proportionalis g : & inter a , g , media proportionalis h : & inter a , h , media proportionalis i : vt fiant sumptiones totidem, quot sunt, numeri c diuisiones bifariam, vsque ad vnitatem.

Dico a ; i : subtuplicatam a ; b , quotus est c .

Demonstr.

| | |
|----------------|--|
| <i>constr.</i> | a ; b : duplicata a ; g , sicut c ; d : duplus. |
| <i>constr.</i> | a ; g : duplicata a ; h , sicut d ; f : duplus. |
| <i>constr.</i> | a ; h : duplicata a ; i , sicut f ; c : duplus. |
| <i>p. p.</i> | a ; b : multiplicata a ; i , sicut c ; u : multiplus. |
| | a ; i : subtuplicata a ; b , quotus est c . Quod erat faciendum. |

Quare data ratione, datoque numero pariter pari, subtuplicatam rationem inuenimus, quotus est datus numerus.

Probl. 2. Prop. 54.

Data ratione inæqualitatis; & proposito numero ordinis potestatum: numerum inuenire, pro quo sesquitota, & semitota æqueordinata, sunt ad inuicem propiores a qualitati.

Hypoth.

Sit data ratio inæqualitatis a , ad b : & sit a , maior, quàm b : sitque datus numerus quinararius.

Oportet numerum inuenire, quo quo sesquitota quinta, ad semitotam quintam, minor est, quàm ut a ad b : & semitota quinta, ad sesquitotam quintam, maior, quàm, ut b ad a .

Constr.

Sumatur numerus pariter par, nō minor, quàm
 53. b. | datus quinararius: & sit sumptus octonarius: & sub-
 octuplicata ratio inueniatur, rationis a ad b ; que
 sit a ad c : & sumatur numerus d , maior ad bi-
 narium, quàm ut a ad c : qui, depro binario,
 relinquitur e : & inter d , e , sumatur nume-
 45. 18. | rus f : pro quo, ut radice tota; semitota est e ; ses-
 19. 2 | quitota d .

Dico d ; e : minorem esse, quàm a ; b .

Et e ; d : maiorem, quàm b ; a .

Demonstr.

constr. | d ; 2: maior, quàm a ; c .
 3. b. | d ; e minor, quàm a ; c .
 4. b. | d ; e : minor, quàm a ; c .

S. 2

53.

5. b. | $a_5; c_5$: minor, quàm $a_8; c_8$.
 constr. | $a_8; c_8$: $a; b$.
 13. 5. | $d_5; e_5$: minor, quàm $a; b$. Quod &c.
 a. b. | $e_5; d_5$: maior, quàm $b; a$. Quod &c.
 Quare &c.

Probl. 3: Prop. 55.

Data ratione; & propositis ordinibus potestatum inæqualibus, numerum inuenire, pro quo, plus ordinata potestas, ad minùs ordinatam, maior est, quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio, a ad b : sint propositi ordines potestatum inæquales, quinaris, & binarius.

Oportet numerum inuenire, pro quo, potestas quinta ad secundam, maior est, quàm ut a ad b .

Constr.

Sumatur numerus c , in serie tertiarum potestatum ab omnibus numeris, maior ad vnitatem, quàm ut a ad b : numeri autem c , sit radix d .

Dico, pro d radice, $d_5; d_2$: maiorem esse, quàm $a; b$.

Demonstr.

constr. | $c: d_3$.
 8. 5. & | $c; u: d_3; u: d_5; d_2$.
 def. 6. p. | $c; u$: maior, quàm $a; b$.
 constr. | $d_5; d_2$: maior, quàm $a; b$. Quod &c.
 13. 5. |
 Quare &c.

Probl. 4. Prop. 56.

Data ratione; propositisque ordinibus potestatum inæqualibus: numerum inuenire, pro quo, semitota plus ordinata, ad sesquitotam minus ordinatam, maior est, quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio a ad b : sintque propositi ordines potestatum, quinari, atque ternari.

Oportet numerum inuenire, pro quo, semitota quinta ad sesquitotam tertiam, maior est, quàm ut a ad b .

Constr.

Inueniatur per 55. *h.* numerus c , pro quo, semitota d : & semitota quinta d_5 , ad semitotam tertiam d_3 , maior est, quàm ut $a+b$ ad b : Inueniatur deinde per 54. *h.* numerus e , non minor, quàm c ; pro quo, semitota m , & sesquitota q ; & m_3 ad q_3 , maior est, quàm ut a ad $a+b$.

Dico, pro numero e radice; m_5 ; q_3 : maiorem esse, quàm a ; b .

Demonstr.

constr. | c : non minor, quàm c .

def. 18.2 | m : non minor, quàm d .

5. h. | m_5 ; d_5 : non minor, quàm m_3 ; d_3 .

p. b. | m_5 ; m_3 : non minor, quàm d_5 ; d_3 .

constr. | d_5 ; d_3 : maior, quàm $a+b$; b .

13. 5. | m_5 ; m_3 : maior, quàm $a+b$; b .

constr. | m_3 ; q_3 : maior, quàm a , $a+b$.

4. b. | m_5 ; q_3 : maior, quàm a ; b . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 5. Prop. 57.

DAtis duabus rationibus; & propositis duobus inæqualibus ordinibus potestatum: numerum inuenire, pro quo, ratio composita ex vna data ratione, & ex ratione semitotæ plus ordinatæ, ad sesquiotam minùs ordinatam, maior est, quàm altera data ratio.

Hypoth.

Sint datæ rationes, a ad b , & c ad d : & sint propositi ordines inæquales, quaternarius, & binarius.

Oportet numerum inuenire, pro quo, ratio composita ex a ad b , & ex semitotæ quintæ ad sesquiotam secundam, maior est, quàm c ad d .

Constr.

56. h. | Fiat vt b ad a , ita d ad e : & inueniatur f numerus, pro quo, semitota g , sesquiotota h ; & g^5 ad h^3 , maior, quàm c ad e .

Dico, pro f radice, a ; b ; $+g^5$; h^3 : maiorem esse, quàm c ; d .

Demonstr.

constr. | g^5 ; h^3 : maior, quàm c ; e .

constr. | a ; b ; e ; d .

4. b. | a ; b ; $+g^5$; h^3 : maior, quàm c ; d . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 6. Prop. 58.

DAta ratione inæqualitatis; & propositis duabus in eadem basi iacentibus quadraticibus numerum.

inuenire, pro quo quadratrices propositæ, sunt propior-
res æqualitati, quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio inæqualitatis a ad b : & sit a maior, quàm
 b : sintque propositæ in quinta basi, duæ quadratrices c , d .

Oportet numerum inuenire, pro quo, c , & d , sunt ad
inui cem, minores, quàm vt a ad b ; maiores, quàm vt
 b ad a .

Constr.

54. b . | Inueniatur numerus e , pro quo, semitota f ,
sesquitota g ; & $f6$ ad $g6$, maior est, quàm vt b
ad a ; & $g6$ ad $f6$, minor, quàm vt a ad b .

Dico, pro e radice, quadratrices c , d , esse ad inui-
cem minores, quàm vt a ad b ; maiores, quàm vt b ad a .

Demonstr.

30. 2. | c , est maior, quàm $f6$. minor, quàm $g6$.

30. 2. | d , est maior, quàm $f6$. minor, quàm $g6$.

8. 5. | c ; d : maior, quàm $f6$, $g6$. minor, quàm $g6$; $f6$.

2. b . | d ; c : minor, quàm $g6$. $f6$. maior, quàm $f6$; $g6$.

constr. | $f6$; $g6$: maior, quàm b ; a .

constr. | $g6$; $f6$: minor, quàm a ; b .

13. 5. | c ; d : maior, quàm b ; a . minor, quàm a ; b .

Quod &c.

13. 4. | d ; c : minor, quàm a ; b . maior, quàm b ; a .

Quod &c.

Quare &c.

Probl. 7. Prop. 59.

Data ratione; & propositis duabus non in eadem basi iacentibus quadratricibus: numerum inuenire, pro quo, quadratrix, quæ iacet in plus ordinata basi, ad alteram, maior est; quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio a ad b : & propositæ sint quadratrices duæ c , d ; c , in quinta basi; d , in secunda.

Oportet numerum inuenire, pro quo, c ad d , maior est, quàm vt a ad b .

Constr.

56. b. | Inueniatur numerus e , pro quo, semitota f ,
| sesquitota g : & $f6$ ad $g3$, maior sit, quàm vt
| a ad b .

Dico, pro e radice, c ; d : maiorem esse, quàm a ; b .

Demonstr.

30. 2. | c , maior est, quàm $f6$.

30. 2. | d , minor est, quàm $g3$.

8. 5. | c ; d : maior est, quàm $f6$; $g3$. Quod &c.

Quare &c.

Probl. 8. Prop. 60.

Data ratione; & propositis duabus non in eadem basi iacentibus massis: numerum inuenire, pro quo, massa, quæ iacet in plus ordinata basi, ad alteram, maior est, quàm in data ratione.

Hy-

Hypoth.

Sit data ratio a ad b : sintque duæ massæ c , d ; quidem, in quinta basi; d , in tertia.

Oportet numerum inuenire, pro quo, c ad d , maior est, quàm vt a ad b .

Constr.

59. b. | Fiat, vt massa c ad sibi synonymam quadratricem e , sic a ad f : & vt synonyma ipsi d quadratrix g , ad ipsam d , sic fiat h ad b : & inueniatur numerus i , pro quo, quadratrix e , ad quadratricem g , maior est, quàm vt f ad h .

Dico pro i radice, massam c ad massam d , maiorem esse, quàm vt a ad b .

Demonstr.

constr. | c ; e : a ; f .

constr. | e ; g : maior, quàm f ; h .

constr. | g ; d : h ; b .

4. b. | c ; d : maior, quàm a ; b . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 9. Prop. 61.

PROPOSITIS in eadem basi iacentibus duabus massis; & datis duabus rationibus, non iisdem, quàm quasi habent ad inuicem massæ, sed maiore vna, minore altera: numerum inuenire, pro quo, massæ propositæ rationem habent minorem, quàm data maior, & maiorem, quàm data minor.

T

Hy-

Hypoth.

Sint massę a, d : & sit ratio i ad s , quàm quasi habet a ad d : & sit e ad h , maior, quàm i ad s ; & n ad r , minor.

Oportet numerum inuenire, pro quo, a ad d , est minor, quàm e ad h ; & maior, quàm n ad r .

Constr.

Sumatur ipsi a , synonyma quadratrix b ; & ipsi d synonyma c . Fiat deinde.

a ; b : e ; f : i ; k ; n ; o .

e ; d : g ; h : l ; s : p ; r .

Demonstr.

| | |
|------------------|---|
| <i>hypoth.</i> | a ; d : quasi i ; s . |
| <i>def. 17.5</i> | a ; b , $+b$; c , $+c$; d : quasi i ; k , $+k$; l , $+l$; s . |
| <i>constr.</i> | a ; b : i ; k . |
| <i>constr.</i> | c ; d : l ; s . |
| | b ; c : quasi k ; l . |
| <i>27. h.</i> | b ; c : quasi æqualitas. |
| | k ; l : æqualitas. |
| <i>hypoth.</i> | e ; h : maior, quàm i ; s . |
| <i>def. 17.5</i> | e ; f , $+f$; g , $+g$; h : maior, quàm i ; k , $+k$; l , $+l$; s . |
| <i>constr.</i> | e ; f : i ; k . |
| <i>constr.</i> | g ; h : l ; s . |
| | f ; g : maior, quàm k ; l . |
| | f : maior, quàm g . |
| <i>hypoth.</i> | n ; r : minor, quàm i ; s . |
| <i>def. 17.5</i> | n ; o , $+o$; p , $+p$; r : minor, quàm i ; k , $+k$; l , $+l$; s . |
| <i>constr.</i> | n ; o : i ; k . |

 p ; r :

constr. | $p; r; l; s.$
 | $o; p:$ minor, quàm $k; l.$
 | $o:$ minor, quàm $p.$

Constr.

58. *b.* | Assumatur alterutra f ad g , vel p ad o , mi-
 | nor: & sit assumpta f ad g . Et inueniatur nume-
 | rus t , pro quo, quadratrix b ad quadratricem c ,
 | sit minor, quàm f ad g ; maior, quàm g ad f .

Dico, pro t , massam a , ad massam d , minorem esse,
 quàm e ad h ; & maiorem, quàm n ad r .

Demonstr.

constr. | $a; b; e; f.$

constr. | $b; c:$ minor, quàm $f; g.$

constr. | $c; d; g; h.$

4. *b.* | $a; d:$ minor, quàm $e; h.$ Quod &c.

assumpt. | $f; g:$ minor, quàm $p; o.$

2. *b.* | $g; f:$ maior, quàm $o; p.$

constr. | $b; c:$ maior, quàm $g; f.$

13. 5. | $b; c:$ maior, quàm $o; p.$

constr. | $a; b; n; o.$

constr. | $c; d; p; r.$

4. *b.* | $a; d:$ maior, quàm $n; r.$ Quod &c.

Quare &c.



Petrus Mengolus, D. Iacobo Tesino Philosophiæ
Doctori S. D.




*I*bi primùm ex mea schola, Vir Excellentiss. atque alteri è schola Excellentissimi Cassini, amico nostro Io. Galeatio Manzio, contigit hoc elementum communicari: quod non, sine tuo, atque illius nomine, publicari oportebat; quoniam ipsi mihi tum placere cepit, cum utramque vestrùm obtinuit approbationem. Postulabam honesti furis laudem. quòd, cum huiusmodi contemplationis aliena sit materia, eorum videlicet, quibus logarithmos debemus; cumque aliena sit etiam forma, & contemplationis modus, ipsissimus Euclidis in quinto: meum fecerim ex utraque compositum. & quemadmodum, præcedentium elementorum in utraque subiecti, & modi novitate gloriabar: ita presentis in vetustate, novam laudem quarebam. Ille, visis definitionibus, & audita primarum octo propositionum, ex Euclide, traductione fideli; statim omnibus

*nibus titulis propositionum, à me cursim lectis, & si-
 ne demonstratione facilem, pro sui acumine ingenij,
 præstabat assensum: & suggestit, potuisse totam
 hanc lucubrationem, unica propositione comprehen-
 di. Quæ demonstrat Euclides in quinto elemen-
 torum, de magnitudinibus maioribus, minoribus,
 æqualibus, æquemultiplicibus, & eandem, vel ma-
 iorem rationem habentibus: posse demonstrari de
 rationibus altioribus, depressioribus, æquealtis, æque-
 multiplicatis, & eandem, vel maiorem logarith-
 micam rationem habentibus. Cogitabam si possem
 huiusmodi uti consilio: tibi que interim rure superue-
 nienti capi communicare. Itaque singulis proposi-
 tionibus & demonstrationibus, toto animo intendebas,
 & cum quinto Euclidis diligenter conferebas, cumq;
 duo inciderimus, in traducendo, difficiliora (unum,
 minoris inæqualitatis rationes, quæ, quò minores
 sunt, eò altiores dicuntur, pro maioribus magnitu-
 dinibus vsuuenire. alterum, rationem ex ratione
 subtrahi, vel decomponi, per suæ compositionem
 conuertæ:) intellexi non esse operis dispendium,
 mutatis mutandis, ex Euclide integram traductio-
 nem perficere, & exhibere. Tuque ipse iustum
 furtum, & honestissimum probasti: quod non ab*

omnibus faciliè probarentur peculiare propositiones,
 qua sub illa unica continentur. Et certè à me
 non possent commodè allegari, ad alia in sequentibus
 elementis demonstranda. Quos ergo semel approba-
 sti labores meos, ut amicis Et committices,
 Et commendes, enixè rogo: nam non
 mihi soli, non paucis, sed
 omnibus laboro.

Vale.






GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

ELEMENTVM QVARTVM.

DEFINITIONES.



1.  Varum rationum inæqualitatis, vtrarumque maioris, vel vtrarumque minoris, Altior, dicitur, ab æqualitate remotior.
2. Et Depressior, æqualitati propior.
3. Submultiplicata est ratio rationis, depressior, altioris, cum depressior, aliquoties composita, facit altio-rem.
4. Multiplicata verò altior, depressioris; cum depres-
sior, aliquoties composita, facit altio-rem.
5. Ratio logarithmica dicitur, duarum rationum in-
equalitatis, vtrarumque maioris, vel vtrarumque minoris,
mutua quædam; secundùm altitudinem, vel depressionem
habitudò.
6. Proportio logarithmica, dicitur, similitudo loga-
rithmarum rationum, vel ad inuicem, vel ad alias rationes.
7. Rationem logarithmicam habere inter se rationes
dicen-

dicentur, quæ multiplicatæ, possunt se mutuo, altitudine superare.

8. In eadem ratione logarithmicè, dicuntur esse rationes duæ, prima, ad secundam, atque duæ quantitates, prima, ad secundam: cum primæ rationis, quælibet multiplicata ratio, & primæ quantitatæ æquemultiplex, à secundæ rationis quælibet multiplicata, & à secundæ quantitatæ æquemultiplici, vel vnà deficiunt, vel vnà æquales sunt, vel vnà excedunt; ratio quidem, altitudine, & quantitas ipsâ quantitate.

9. Et dicetur prima ratio ad secundam, proportionalis logarithmicè, sicut prima quantitas ad secundam.

10. Cum verò primæ rationis multiplicata ratio, altior fuerit, quàm multiplicata secundæ; multiplex autem primæ quantitatæ, non maior fuerit, quàm multiplex secundæ: dicetur logarithmica ratio rationum, maior, quàm ratio quantitarum.

11. Cumque è contra, multiplex primæ quantitatæ, maior fuerit multiplici secundæ; multiplicata autem ratio primæ rationis, non altior, quàm multiplicata, secundæ: dicetur ratio quantitarum, maior, quàm logarithmica ratio rationum.

12. Rursum in eadem ratione logarithmicè, dicentur esse rationes quatuor prima ad secundam, atque tertia ad quartam: cum primæ, as tertiæ, rationes æquemultiplicatæ, à secundæ, & quartæ, rationibus æquemultiplicatis, qualiscunque sit hæc multiplicatio, vtraque, ab vtraque,
vel

vel vnà altiores sunt, vel vnà æquealtæ, vel vnà depressiores, si eę sumantur, quæ inter se respondent.

13. Eandem autem habentes rationem logarithmicam, rationes, logarithmicè proportionales vocentur.

14. Cum verò æquemultiplicatarum, multiplicata primæ rationis altior fuerit, quàm multiplicata secundæ; multiplicata autem tertiæ, non altior fuerit, quàm multiplicata quartæ: tunc prima ratio ad secundam, maiorem rationem logarithmicam habere dicetur, quàm tertia ad quartam.

15. Homologæ rationes rationibus, aut quantitibus dicuntur, antecedentes quidem antecedentibus, & consequentes consequentibus.

16. Homologia logarithmica est sumptio homologarum rationum, aut & quantitatum, vt in alia quadam logarithmica proportionalitate, fiant homologæ.

17. Alterna ratio logarithmica, est rationum sumptio antecedentis comparatæ ad antecedentem, & consequentis ad consequentem.

18. Inuersa ratio logarithmica, est rationum sumptio consequentis, ceu antecedentis, comparatæ ad antecedentem, velut ad consequentem.

19. Compositio rationis logarithmicæ, est sumptio compositæ ex rationibus antecedenti, & consequenti, ceu vnus ad ipsam consequentem.

20. Diuisio rationis logarithmicæ, est sumptio rationis, quacum composita consequens facit antecedentem,

ad ipsam consequentem.

21. Conuersio rationis logarithmicæ, est sumptio antecedentis, ad eam, quæ cum composita consequens facit ipsam antecedentem.

22. Ex æqualitate ratio logarithmica est, si plures duabus sint rationes, & his, vel quantitates, vel aliæ rationes, multitudine pares, quæ binæ sumatur, & in eadem ratione logarithmica: cum vt in primis rationibus, prima logarithmicè se habet ad vltimam, sic in secundis vel rationibus, vel quantitatibus, prima ad vltimam se habuerit. Vel aliter sumptio extremarum, per subtractionem mediarum.

23. Ordinata proportio logarithmica est, tribus positis rationibus, & alijs, vel quantitatibus, vel rationibus, quæ sint his multitudine pares: cum, vt in primis rationibus, logarithmicè se habet antecedens, ad consequentem; ita in secundis, vel quantitatibus, vel rationibus, antecedens ad consequentem: & vt in primis, consequens, ad aliam quampiam; sic in secundis, consequens, ad aliã quampiam.

24. Perturbata autem logarithmica proportio est: cum vt in primis, logarithmicè se habet antecedens, ad consequentem; ita in secundis, antecedens ad consequentem: & vt in primis, consequens, ad aliam quampiam; sic in secundis, alia quampiam, ad antecedentem.

Theor. 1. Prop. 1.

SI sint quotcunque rationes, quotcunque rationum, æqualium numero, singulæ singularum æquemultiplicata: quàm multiplicata est vnâ, vnus; tam multiplicata est composita omnium, compositæ omnium.

Hypoth.

$a_3; b_3$: multiplicata $a; b$.

$c_3; d_3$: æquemultiplicata $c; d$:

Dico $a_3; b_3, +c_3; d_3$: æquemultiplicatam $a; b, +c; d$.

Demonstr.

hypoth. | $a_3; b_3$: $a; b, +a; b, +a; b$.

hypoth. | $c_3; d_3$: $c; d, +c; d, +c; d$:

p. p. | $a_3; b_3, +c_3; d_3$: $a; b, +c; d, +a; b, +c; d, +a; b, +c; d$.

hypoth. | Multitudo rationum $a; b$, & $a; b$, & $a; b$:
 æqualis est multitudini $c; d$, & $c; d$, & $c; d$:
 necnon multitudini $a; b, +c; d$, & $a; b, +c; d$, & $a; b, +c; d$.

def. 4. b. | $a_3; b_3, +c_3; d_3$: æquemultiplicata $a; b, +c; d$.

Quod &c.

Quare &c.

Theor. 2. Prop. 2.

SI prima ratio, secundæ, fuerit æquemultiplicata, atque prima quantitas, est multiplex secundæ; fuerit autem & tertia ratio, secundæ, æquemultiplicata, atque tertia

quantitas, est multiplex secundæ: erit composita ratio ex prima, & tertia, secundæ, æquemultiplicata, atque aggregata quantitas ex prima, & tertia, est multiplex secundæ.

Hypoth.

$a_2; b_2$: multiplicata $a; b$. sicut $2c; c$, multiplex.

$a_3; b_3$: multiplicata $a; b$. sicut $3c; c$, multiplex.

Dico $a_2; b_2, + a_3; b_3$: multiplicatam $a; b$. sicut $2c + 3c; c$, multiplicem.

Demonstr.

hypoth. | $a_2; b_2$: $a; b, + a; b$. sicut $2c: c + c$. Et quot sunt rationes $a; b$, & $a; b$: tot sunt c , & c , quantitates.

hypoth. | $a_3; b_3$: $a; b, + a; b, + a; b$. sicut $3c: c + c + c$. Et quot sunt rationes $a; b$, & $a; b$, & $a; b$: tot sunt quantitates, c , & c , & c .

p. p. | $a_2; b_2, + a_3; b_3$: $a; b, + a; b, + a; b, + a; b, + a; b$. sicut $2c + 3c: c + c + c + c + c$. & quot sunt rationes $a; b$, & $a; b$, & $a; b$, & $a; b$, & $a; b$, & $a; b$: tot sunt quantitates, c , & c , & c , & c , & c .

def. 4. h. | $a_2; b_2, + a_3; b_3$: multiplicata $a; b$: sicut $2c + 3c; c$, multiplex. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 3. Prop. 3.

SI prima ratio, secundæ, æquæ fuerit multiplicata, atque tertia, quartæ; fuerit autem & quinta; secundæ,

dæ, æquemultiplicata, atque sexta, quartæ: erit & composita ex prima, & quinta, secundæ æquemultiplicata, atq; composita ex tertia, & sexta, quartæ.

Hypoth.

$a_2; b_2$: multiplicata $a; b$. sicut $c_2; d_2$: multiplicata $c; d$.

$a_3; b_3$: multiplicata $a; b$. sicut $c_3; d_3$: multiplicata $c; d$.

Dico $a_2; b_2, +a_3; b_3$: multiplicatam $a; b$. sicut $c_2; d_2, +c_3; d_3$: multiplicatam $c; d$.

Demonstr.

hypoth. $a_2; b_2: a; b, +a; b$. sicut $c_2; d_2: c; d, +c; d$.
Et quot sunt $a; b$, & $a; b$: tot sunt $c; d$, & $c; d$.

hypoth. $a_3; b_3: a; b, +a; b, +a; b$. sicut $c_3; d_3: c; d, +c; d, +c; d$. Et quot sunt $a; b$, & $a; b$, & $a; b$: tot sunt $c; d$, & $c; d$, & $c; d$.

P. P. $a_2; b_2, +a_3; b_3: a; b, +a; b, +a; b, +a; b, +a; b$. sicut $c_2; d_2, +c_3; d_3: c; d, +c; d, +c; d, +c; d, +c; d$. Et quot sunt $a; b$, & $a; b$, & $a; b$, & $a; b$, & $a; b$: tot sunt $c; d$, & $c; d$, & $c; d$, & $c; d$, & $c; d$.

def. 4. b. $a_2; b_2, +a_3; b_3$: multiplicata $a; b$. sicut $c_2; d_2, +c_3; d_3$: multiplicata $c; d$. Quod &c.

Quare &c.

Theor.

Theor. 4. Prop. 4.

SI prima ratio, secundæ æquemultiplicata fuerit, atque prima quantitas, secundæ; sumantur autem ratio, & quantitas; & sumpta ratio, sit æquemultiplicata primæ rationis, atque sumpta quantitas, multiplex primæ quantitatis: erit & ex æquo, sumpta ratio, æquemultiplicata secundæ rationis, atque sumpta quantitas, secundæ quantitatis.

Hypoth.

$a3; b3$: multiplicata $a; b$. sicut $3c; c$, multiplex.

$a6; b6$: multiplicata $a3; b3$. sicut $6c; 3c$, multiplex.

Dico $a6; b6$: multiplicatam $a; b$. sicut $6c; c$, multiplicem.

Demonstr.

hypoth. $a3; b3$: multiplicata $a; b$. sicut $3c; c$, multiplex:

2. *b.* $a3; b3, +a3, b3$: multiplicata $a; b$. sicut $3c + 3c; c$, multiplex.

hypoth. $a6; b6: a3; b3, +a3; b3$. sicut $6c: 3c + 3c$.
Et quot sunt, $a3; b3$, & $a3; b3$: tot sunt $3c$, & $3c$.

$a6; b6$: multiplicata $a; b$. sicut $6c; c$, multiplex. Quod sic. Quare &c.

Theor. 5. Prop. 5.

SI prima ratio, secundæ æquemultiplicata fuerit, atque tertia, quartæ; sumantur autem æquemultiplicatæ rationes,

tiones, primæ, & tertiæ: erit & ex æquo, sumptarum vtraque, vtriusque, æquemultiplicata; altera quidem secunde, altera autem quartæ.

Hypoth.

$a_3; b_3$: multiplicata $a; b$. sicut $c_3; d_3$: multiplicata $c; d$.

$a_6; b_6$: multiplicata $a_3; b_3$. sicut $c_6; d_6$: multiplicata $c_3; d_3$.

Dico $a_6; b_6$: multiplicatam $a; b$. sicut $c_6; d_6$: multiplicatam $c; d$.

Demonstr.

hypoth. $a_3; b_3$: multiplicata $a; b$. sicut $c_3; d_3$: multiplicata $c; d$.

3. b. $a_3; b_3, + a_3; b_3$: multiplicata $a; b$. sicut $c_3; d_3, + c_3; d_3$: multiplicata $c; d$.

hypoth. $a_6; b_6$: $a_3; b_3, + a_3; b_3$. sicut $c_6; d_6$: $c_3; d_3, + c_3; d_3$. Et quot sunt $a_3; b_3$, & $a_3; b_3$: totidem sunt $c_3; c_3$, & $c_3; d_3$.

$a_6; b_6$: multiplicata $a; b$. sicut $c_6; d_6$: multiplicata $c; d$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 6. Propos. 6.

SI fuerint, in eadem ratione logarithmica, prima ratio, ad secundam, atque prima quantitas, ad secundam: etiam multiplicata primæ rationis, & æquemultiplex primæ quantitatibus, ad multiplicatam, secundæ rationis, & æque-

æquemultiplicem secundæ quantitatis, in eadem erunt logarithmica ratione.

Hypoth.

Sint rationes A , & B ; & quantitates a , & b : & sit ratio A , ad rationem B , logarithmicè; sicut quantitas a , ad quantitatem b . Sitque ratio $3A$, multiplicata rationis A ; sicut quantitas $3a$, multiplex quantitatis a item ratio $4B$, multiplicata rationis B ; sicut quantitas $4b$, multiplex quantitatis b .

Dico rationem $3A$, ad rationem $4B$, esse logarithmicè sicut quantitas $3a$, ad quantitatem $4b$.

Præpar.

Accipiatur ratio $6A$, multiplicata rationis $3A$; & quantitas $6a$, æquemultiplex quantitatis $3a$: item ratio $20B$, multiplicata rationis $4B$; & quantitas $20b$, æquemultiplex quantitatis $4b$.

Demonstr.

| | |
|-------------------|--|
| 4. b. | Ratio $6A$, æquemultiplicata est rationis A ; atque quantitas $6a$, multiplex est quantitatis a . item ratio $20B$, æquemultiplicata est rationis B ; atque quantitas $20b$, multiplex est quantitatis b . Sunt autem rationes A ad B logarithmicè, sicut quantitates a ad b . Ergo si ratio $6A$, est altior ratione $20B$; etiam quantitas $6a$, maior est quantitate $20b$: si æque alta; æqualis: si depressior; minor. Sed est ratio $6A$, æquemultiplicata rationis $3A$; atque quantitas $6a$, multiplex |
| <i>hypoth.</i> | |
| <i>def. 8. b.</i> | |
| <i>constr.</i> | |

tiplex

def. 8. h. | triplex quantitatis $3a$; & ratio $20B$, rationis $4B$,
 æquemultiplicata est; atque quantitas $20b$, quan-
 titatis $4b$. Ergo rationes $3A$, ad $4B$, sunt lo-
 garithmicæ; sicut quantitates, $3a$, ad $4b$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 7. Prop. 7.

SI prima ratio, ad secundam, eandem habuerit ratio-
 nem logarithmicè, atque tertia, ad quartam: etiam
 æquemultiplicatæ rationes primæ, & tertiæ, ad æquemul-
 tiplicatas secundæ, & quartæ, iuxta quamvis multiplica-
 tionem, eandem habebunt rationem, si prout inter se re-
 spondent, ita sumptæ fuerint.

Hypoth.

Sunto rationes quatuor A ad B , & C ad D , logarithmi-
 cè proportionales: & sunt ipsarum A , C , æquemulti-
 plicatæ rationes $3A$, $3C$: necnon ipsarum B , D , æque-
 multiplicatæ, $4B$; $4D$.

Dico quatuor rationes $3A$ ad $4B$, & $3C$ ad $4D$, lo-
 garithmicè proportionales esse.

Prepar.

Sumantur ipsarum $3A$, $3C$, æquemultiplicatæ ratio-
 nes $6A$, $6C$: & ipsarum $4B$, $4D$; æquemultiplicatæ;
 $20B$, $20D$.

Demonst.

4. b. | Rationes $6A$, $6C$, æquemultiplicatæ sunt ra-
 tionum, A , C : & $20B$, $20D$, æquemultiplicatæ
 X sunt

hypoth. | sunt rationum B, D . suntque A ad B , logarithmicè proportionales, ut C ad D . Ergo si $6A$, altior est, quàm $20B$; etiam $6C$, altior est, quàm $20D$: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Et sunt $6A, 6C$, ipsarum $3A, 3C$, æquemultiplicatæ; necnon $20B, 20D$, ipsarum $4B, 4D$, æquemultiplicatæ. Ergo $3A$ ad $4B$, & $3C$ ad $4D$, sunt logarithmicè proportionales.
def. 12. b |
hypoth. |
def. 12. b | Quod &c.

Quare &c.

Theor. 8. Prop.

SI fuerint duæ rationes, singulæ, ex binis compositæ, altiores, ex depressioribus, & quodammodo totæ, ex abscissa, & residua: fuerit autem vna tota ratio, ad alteram totam, æquemultiplicata; atque sua abscissa, ad alterius abscissam: erit & æquemultiplicata; atque sua residua, ad alterius residuam.

Hypoth.

Ratio $A+B$, ex rationibus A , & B , altior, ex depressioribus, componitur; item $C+D$ ratio, ex rationibus C , & D , componitur: & esto $A+B$, ad $C+D$, æquemultiplicata, atque A ad C .

Dico $A+B$ ad $C+D$, æquemultiplicatam etiam esse, atque B ad D .

Prepar.

Fiat ratio G ad D ; æquemultiplicata, atque A ad C .

De-

Demonstr.

- p. b.* | $A+B$ ad $C+D$, æquemultiplicata est, atque A
ad C .
- hypoth.* | $A+B$ ad $C+D$, æquemultiplicata est, atque A ad C .
- P. P.* | $A+B$ ratio, eadem est, quæ $A+G$.
- Et composita vtrimque conuersa rationis A ,
- P. P.* | B ratio, eadem est, quæ G .
- P. P.* | B ad D , æquemultiplicata est, atque A ad C .
- p. b.* | $A+B$ ad $C+D$, æquemultiplicata est, atque B ad
 D . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 9. Prop. 9.

SI ratio, & quantitas, cuiusdam rationis, & cuiusdam
quantitatis, æquè sint multiplicata, & multiplex; &
abscissa ratio, & abscissa quantitas, eiusdem rationis, &
eiusdem quantitatis, æquè sint multiplicata, & multiplex:
residua ratio, & residua quantitas, eiusdem rationis, & eius-
dem quantitatis, vel sunt æquealta, & æqualis; vel æquè
sunt multiplicata; & multiplex.

Hypoth.

Ratio $A+B$, rationis C , æquemultiplicata est, atque
quantitas $a+b$, multiplex quantitatis c ; & ratio A , ratio-
nis C , æquemultiplicata est, atque quantitas a , multiplex
quantitatis c .

Dico quòd, vel B æquealta est ipsi C ; sicut b , æqua-
lis ipsi c : vel B æquemultiplicata est ipsius C ; sicut b

X 2 mul-

164 E L E M E N T V M
 multiplex ipsius c .

Demonstr.

hypoth. Numerus rationum C , ex quibus $A+B$ componitur, idem est qui quantitatum c , ex quibus $a+b$ colligitur: item numerus rationum C ex quibus A componitur, idem est qui quantitatum c , ex quibus a componitur. Quorum numerorum, vel est differentia vnitas, vel numerus.

hypoth. Si vnitas est differentia; vna est ratio C , quacum composita ratio A , facit rationem $A+B$; & vna est quantitas c , quacum composita quantitas a , facit quantitatem $a+b$. Sed & B ratio est, quacum composita A , facit rationem $A+B$; & b quantitas est, quacum composita a , facit quantitatem $a+b$. Ergo B æquealta est ipsi C ; atque b æqualis ipsi c .

hypoth. Si verò numerus est differentia, tot sunt rationes C , quibuscum composita ratio A , facit rationem $A+B$; totidemque sunt quantitates c , quibus cum composita quantitas a , facit quantitatem $a+b$. Sed B ratio est, quacum composita ratio facit rationem $A+B$; & b quantitas, quacum composita quantitas a , facit quantitatem $a+b$. Ergo quot ex C rationibus componitur B ; tot ex c , quantitabibus componitur b . Ergo B ad C , æquemultiplicata est, atque b ad c , multiplex. Ergo B ad C , vel æquealta est: atque

def.4. b.

b ad

b -ad c , æqualis: vel æquemultiplicata est; atque multiplex. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 10. Prop. 10.

SI duæ rationes, duarum rationum, sint æquemultiplicatæ; & abscissæ quædam, sint earumdem æquemultiplicatæ: & residuæ, eisdem, aut æquealtæ sunt, aut æquemultiplicatæ.

Hypoth.

Ratio $A+B$, rationis C , æquemultiplicata est, atque ratio $D+E$, rationis F ; & ratio A , rationis C , æquemultiplicata est, atque ratio D , rationis F .

Dico rationem B rationis C , æquealtam esse, atque ratio E rationis F ; vel æquemultiplicatam.

Demonstr.

hypoth. | Quot ex C rationibus, ratio $A+B$ componitur, idem numerus est, indicans etiam, quot ex F rationibus, componitur ratio $D+E$. & quot ex C rationibus, ratio A componitur, idem numerus est, indicans etiam, quot ex F rationibus, ratio D componitur: quorum numerorum vel est differentia vnitas, vel numerus.

| Si vnitas est differentia: vna est ratio C , quacum composita ratio A , facit rationem $A+B$; & vna est ratio F , quacum composita ratio D , facit rationem $D+E$. Sed & B cum A , & E cum D , fa-

D , faciunt rationes compositas $A \rightarrow B$, & $D \rightarrow E$.
Ergo B ad C eadem est, & æquealta, atque ratio
 E ad F . si enim binæ non essent æquealtæ; esset
vna binarum, æqualitati propior, quàm altera, &
non essent eædem inter se.

Si verò numerus est differentia: totidem sunt
rationes C , quibuscum ratio A composita, facit
 $A \rightarrow B$ rationem; quot etiam rationes F , quibus-
cum ratio D composita, facit $D \rightarrow E$ rationem.

hypoth. Sed & B cum A , & E cum D , faciunt rationes
def. 4. b. compositas $A \rightarrow B$, & $D \rightarrow F$. Ergo B ad C æque-
multiplicata est, atque E ad F . Ergo B ad C , vel
æquealta est, vel æquemultiplicata, atque E ad F .
Quod &c.

Quare &c.

Theor. 11. Propos. 11:

Æ Quealtæ, ad eandem, eandem habent rationem
logarithmicam: & eadem, ad æquealtas.

Hypoth.

Rationes A , & B sunt æquealtæ.

Dico A rationem, ad C , esse logarithmicè, vt B , ad
 C . Et C rationem, ad A , esse logarithmicè, vt C , ad B .

Prepar.

Sumantur ipsarum A , B , æquemultiplicatæ rationes
 D , E : & sumatur F ratio multiplicata, rationis C .

Demonstr.

def. 9. b.

Quoniam A ad C , ratio est logarithmica; cuius inæqualitatis est ratio C , eiusdem est & A : item quoniam B ad C , ratio est logarithmica; cuius inæqualitatis est C , eiusdem est & B : ergo A , B rationes, eiusdem inter se sunt inæqualitatis: & sunt A , B æquealtæ; ergo sunt eadem inter se. si enim non essent eadem inter se, esset vna remotior ab æqualitate, quàm altera, & non essent æquealtæ. Sumptæ autem sunt D , E æquemultiplicatæ rationum A , B earumdem inter se: ergo

p. p.

etiam D , E , sunt eadem inter se rationes, & æquealtæ. Ergo si D est altior, quàm F , etiam E altior est, quàm F : si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo ratio A ad C , est logarithmicè, sicut ratio B ad C . Quod &c. Nec

def. 12. b.

non ratio C ad A , est logarithmicè, sicut C ad B . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 12. Prop. 12.

Rationum non æquealtarum, altior ad eandem, maior est logarithmicè, quàm depressior: & eadem ad depressiorem, maior est logarithmicè, quàm ad altiorem.

Hypoth.

Esto ratio $A+B$ altior, quàm B .

Dico $A+B$, ad C , maiorem esse logarithmicè, quàm B , ad C .

Et

Et C , ad B , maiorem logarithmicè, quàm C , ad $A+B$.

Præpar. & Demonstr.

Sumatur A ratio, quæ cum B , componit rationem $A+B$: & duarum rationum A, B , sumatur altera non altior, quæ sit A : & rationis A , multiplicata D , quoties oportet, vt fiat altior, quàm C ; & rationis B , æquemultiplicata sumatur E .

def. 7. b.

*contra p.
p. & p. 3.*

Quoniam A , non est altior, quàm B ; & D, E sunt æquemultiplicatæ ipsarum A, B : oportet D non esse altiorem, quàm E , si enim esset altior; ex iisdem, vel ex propioribus æqualitati, vtrisque maioris, vel vtrisque minoris inæqualitatis rationibus, esset remotior ab æqualitate ratio composita. ergo D , est altior, quàm C : ergo E , est altior, quàm C .

def. 7. b.

Sumatur ipsius C , bis, ter, quater, vel deinceps, quoties oportet, multiplicata ratio F , vt fiat primò altior quàm E . Quare ratio F , non est altior, quàm ratio $E+C$: est autem D altior, quàm C : ergo $D+E$ altior est, quàm $E+C$. alioquin ex remotioribus ab æqualitate rationibus, vtrisque maioris, vel vtrisque minoris inæqualitatis, non altior fieret composita ratio, ideoque non remotior ab æqualitate, *contra p. p. & p. 3.* Sed F . non est altior, quàm $E+C$: ergo $D+E$, est altior, quàm F : & est E depressior, quàm F : & sunt D, E rationes æquemultiplicatæ, rationum A, B : & $D+E$ ratio; est æquemultiplicata, rationis $A+B$:

p. b.

Ergo

def. 14. b. Ergo A ad B ratio, ad rationem C , maior est logarithmicè, quàm B ad C . Quod &c. Et ratio C , ad rationem B , maior est logarithmicè, quàm C , ad A & B . Quod &c. Quare &c.

Theor. 13. Prop. 13.

Quæ, ad eandem, eandem habent rationem logarithmicam; inter se sunt eadem rationes logarithmicæ: & ad quas eadem, eandem habet logarithmicam; inter se sunt eadem rationes logarithmicæ.

Hypoth. 1.

Ratio A ad rationem C , esto logarithmicè, sicut ratio B ad rationem C . Dico rationes A , B , esse eadem inter se.

Demonstr.

def. 5. b. Quoniam A ad C , & B ad C , sunt rationes logarithmicæ; cuius inæqualitatis est C ratio, maioris, vel minoris; eiusdem sunt A , & B rationes: quæ si non eadem essent inter se, non essent æquales: & assignaretur earum altera altior. Assignetur A , si fieri potest, altior, quàm B : ergo A ad C , maior est logarithmicè, quàm B . *contra hypoth.* Ergo rationes A , B , sunt eadem inter se. Quod &c.

Hypoth. 2.

Ratio C , ad rationem A , esto logarithmicè, sicut ratio C , ad rationem B .

Y

Dico

Dico rationes A, B , esse eandem inter se.

Demonstr.

12. h. Assignetur A , si fieri potest depressior, quam B : Ergo C ad A , maior est logarithmicè, quam ad B : *contra hypoth.* Ergo A non est depressior, quam B : item demonstrabitur, quod neque B
11. h. est depressior, quam A : sunt ergo A, B rationes æquealtæ, & eadem inter se. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 14. Prop. 14.

Rationum, ad eandem rationem, quæ maior est logarithmicè, illa est altior: & ad quàm, eadem maior est logarithmicè, illa est depressior.

Hypoth. 1.

Ratio A , maior est logarithmicè ad C , quàm B .

Dico A , altioresse, quàm B .

Demonstr.

11. b. Esto A non altior, quàm B , si fieri potest: erit itaque vel æquealta, vel depressior. Sinto A, B æquealtæ, si fieri potest: Ergo A ad C , est logarithmicè, sicut B : *contra hypoth.* Esto A depressior, quàm B , si fieri potest. Ergo B ad C , minor est logarithmicè, quàm A : *contra hypoth.* Ergo A , non est æquealta, neque depressior, quàm B : ergo est altior. Quod &c.

Hy-

Hypoth. 2.

Ratio C ad A , maior est logarithmicè, quàm ad B .

Dico A , depressiorem esse, quàm B .

Demonstr.

21. b. | Esto A non depressior, quàm B , si fieri potest:
 12. b. | erit itaque vel æquealta, vel altior. Sunt A , B
 æquealte, si fieri potest. Ergo C ad A , est loga-
 rithmicè, sicut ad B . *contra hypoth.* Esto A altior,
 quàm B , si fieri potest. Ergo C ad A , minor
 est logarithmicè, quàm ad B . *contra hypoth.* Er-
 go A non est æquealta, neque altior, quàm B :
 ergo est depressior. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 15. Prop. 15.

Quæ eidem sunt eadem rationes, inter se sunt eodem,
 tum logarithmicè, tum absolute.

Hypoth. 1.

Rationes A ad B , logarithmicè sunt, ut quantitates e
 ad d : & e ad d quantitates, ut quantitates e ad f :

Dico rationes A ad B , logarithmicè esse, sicut quan-
 titates e ad f .

Hypoth. 2.

Rationes A ad B , logarithmicè sunt, ut quantitates e
 ad d : & e ad d quantitates, sunt sicut logarithmicè ra-
 tiones E ad F .

Dico rationes A ad B , esse logarithmicè, sicut rationes
 E ad F .

Hypothesis 3.

Quantitates a ad b , sunt inter se, sicut logarithmicè, rationes C ad D : & rationes C ad D , logarithmicè sunt, sicut quantitates e ad f .

Dico a ad b , esse, ut e ad f .

Hypothesis 4.

Quantitates a ad b , sunt inter se, sicut logarithmicè, rationes C ad D : & rationes C ad D , logarithmicè sunt, ut rationes E ad F .

Dico quantitates a ad b , esse, sicut logarithmicè, rationes E ad F .

Hypothesis 5.

Rationes A ad B , logarithmicè sunt, ut rationes C ad D : & rationes C ad D , logarithmicè, ut rationes E ad F .

Dico rationes A ad B , logarithmicè esse, sicut rationes E ad F .

Prepar. comm.

Sumantur ipsarum rationum, vel quantitarum A , C , E , æquemultiplicatæ, & æquemultiplices, $3A$, $3C$, $3E$: necnon ipsarum B , D , F , æquemultiplicatæ, & æquemultiplices, $4B$, $4D$, $4F$.

Demonstr. comm.

Si $3A$, altior est, vel maior, quàm $4B$; etiam $3C$, altior est, vel maior, quàm $4D$. Quod si $3C$, altior est, vel maior, quàm $4D$; etiam $3E$ altior est, vel maior, quàm $4F$. Ergo si $3A$ altior est,

vel

vel maior, quàm $4B$; etiam $3E$ altior est, vel maior, quàm $4F$. Item si æquealta, vel æqualis; etiam æquealta, vel æqualis: si depressior, vel minor; etiam depressior, vel minor. Ergo proportionales sunt siue rationes, siue quantitates, vel mixtim A ad B , sicut E ad F : tum logarithmice, siquæ sunt rationes; tum absolute, si nullæ sunt rationes; sed solum quantitates, Quod &c.

def 8 vel 12. h. vel 6. 5.

Quare &c.

Theor. 16. Prop. 16.

SI sint quotcunque rationes logarithmicè proportionales; quemadmodum se habuerit logarithmicè vna antecedentium ad vnam consequentium; ita logarithmicè se habebit composita ex omnibus antecedentibus, ad compositam ex omnibus consequentibus.

Hypoth.

Rationes A ad B , & C ad D , & E ad F , sunt logarithmicè proportionales. Ex rationibus A , C , & E composita est $A+C+E$: & ex rationibus B , D , & F composita est $B+D+F$.

Dico $A+C+E$ ad $B+D+F$, & A ad B , esse logarithmicè proportionales.

Prepar.

Rationum A , C , E sumantur æquemultiplicate rationes $3A$, $3C$, $3E$: ex quibus composita ratio $3A+3C+3E$. Item rationum B , D , F ; sumantur æquemultiplicate

cate

catæ rationes $4B$, $4D$, $4F$: ex quibus composita ratio
 $4B+4D+4F$.

Demonstr.

def. 12. b. Quoniam A ad B , & C ad D , sunt logarithmicè proportionales: si $3A$ altior est, quàm $4B$; etiam $3C$ altior est, quàm $4D$: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Item quoniam C ad D , & E ad F , sunt logarithmicè proportionales: si $3C$ altior est, quàm $4D$; etiam $3E$, altior est, quàm $4F$: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo si $3A$, altior est, quàm $4B$: etiam $3A+3C+3E$ altior est quàm $4B+4D+4F$: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Sed est $3A+3C+3E$ ad $A+C+E$, totuplicata, quotuplicata est $3A$ ad A : item $4B+4D+4F$, ad $B+D+F$. totuplicata est, quotuplicata $4B$ ad B . Ergo $A+C+E$ ad $B+D+F$, & A ad B , sunt logarithmicè proportionales. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 17. Propos. 17.

SI sex vel rationum, vel & quantitatum mixtim, prima ad secundam eandem habuerit rationem, quàm tertia ad quartam, tertia vero ad quartam maiorem habuerit, quàm quinta ad sextam, etiam prima ad secundam, maiorem habebit, quàm quinta ad sextam.

Hy-

Hypoth. 1.

Quantitates a ad b , & c ad d , sunt proportionales: sed quantitarum c ad d ratio, maior est, quàm logarithmica, E ad F rationum.

Dico quantitarum a ad b rationem maiorem esse, quàm logarithmica E ad F rationum.

Hypoth. 2.

Quantitates a ad b , & rationes C ad D , sunt logarithmicè proportionales: sed rationum logarithmica ratio C ad D , maior est quàm quantitarum e ad f .

Dico a ad b maiorem esse, quàm e ad f .

Hypoth. 3.

Rationes A ad B , & quantitates c ad d , sunt logarithmicè proportionales: sed quantitarum ratio c ad d , maior est, quàm e ad f .

Dico rationum logarithmicam A ad B , maiorem esse, quàm e ad f .

Hypoth. 4.

Quantitates a ad b , & rationes C ad D , sunt logarithmicè proportionales: sed rationum C ad D logarithmicè maior est, quàm E ad F .

Dico quantitarum a ad b rationem maiorem esse, quàm rationum logarithmica E ad F .

Hypoth. 5.

Rationes A ad B , & quantitates c ad d sunt proportionales logarithmicè: sed quantitarum c ad d , maior est ratio, quàm logarithmica rationum E ad F .

Dico

Dico A ad B , maiorem esse logarithmicè, quàm E ad F .

Hypoth. 6.

Rationes A ad B , & C ad D sunt proportionales: sed C ad D ratio, logarithmicè maior est, quàm E ad F .

Dico rationum A ad B logarithmicam rationem, maiorem esse, quàm quantitatum E ad F .

Hypoth. 7.

Rationes A ad B , & C ad D , sunt proportionales: sed C ad D rationum ratio logarithmicè maior est quàm E ad F ratio logarithmica.

Dico A ad B logarithmicè maiorem esse, quàm E ad F .

Prepar. comm.

Sumantur æquemultiplicatę rationum rationes, & æquemultiplices quantitatum quantitates; antecedentium A , C , E , antecedentes $3A$, $3C$, $3E$; & consequentium B , D , F consequentes $4B$, $4D$, $4F$: secundum eas multiplicationes; quibus $3C$, altior quidem est, vel maior, quàm $4D$; sed $3E$, non altior, vel non maior est, quàm $4F$.

Demonstr. commun.

Quoniam $3C$ est altior, vel maior, quàm $4D$:
 ergo etiam $3A$ est altior, vel maior, quàm $4B$: &
 interim $3E$ non altior est, vel non maior, quàm
 $4F$. ergo A ad B , maior est, quàm C ad D , si
 uè logarithmicè, si uè absolutè. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 18. Prop. 18.

Rationum logarithmicè proportionalium, si prima fuerit altior, quàm tertia: erit & secunda altior, quàm quarta: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior.

Hypoth. commun.

Rationes *A* ad *B*, & *C* ad *D*, sunt logarithmicè proportionales.

Hypoth. 1.

Altior est ratio *A*, ratione *C*.

Dico, quòd altior est ratio *B*, ratione *D*.

Demonstr.

12. b. Est, si fieri potest, non altior *B* ratio, quàm
 11. b. *D*: ergo vel est æquealta, vel depressior. Est si
 17. b. fieri potest æquealta. Ergo *A* ad *B*, maior est
 logarithmicè, quàm *C* ad *B*: sed *C* ad *B* eadem
 est logarithmicè, quæ *C* ad *D*. Ergo *A* ad *B* ma-
 ior est logarithmicè quàm *C* ad *D*, *contra hypoth.*
 Non sunt ergo *B*, *D* rationes æquealtæ.

12. b. Est, si fieri potest, *B* depressior, quàm *D*. Er-
 go *C* ad *B*, maior est logarithmicè, quàm *C* ad
hypoth. *D*. Sed *A* ad *B*, est logarithmicè, vt *C* ad *D*. Er-
 17. b. go *C* ad *B*, maior est logarithmicè, quàm *A* ad
 14. b. *B*. Ergo *C* altior est, quàm *A*. *contra hypoth.*
 Non est ergo *B* depressior, quàm *D*; neque
 æquealta: ergo *B* est altior, quàm *D*. Quod &c.

*Hypoth. 2.*Æquealtæ sunt rationes A, C .Dico quòd & æquealtæ sunt rationes B, D .*Demonst.*

12. b. | Sunt B, D non æquealtæ, si fieri potest: &
 hypoth. | esto B altior, quàm D . Ergo C ad D , maior
 17. b. | est logarithmicè, quàm C ad B . Sed A ad B , ea-
 14. b. | dem est logarithmicè, quæ C ad D . Ergo A ad
 | B , maior est logarithmicè, quàm C ad B . Ergo
 | A , altior est, quàm C . *contra hypoth.* Sunt ergo
 | B, D æquealtæ. Quod &c.

*Hypoth.*Depressior est A , quàm C .Dico quòd & B depressior est, quàm D .*Demonstr.*

hypoth. | Altior est C quàm A : & est C ad D logari-
 sup. | thmicè, vt A ad B : ergo altior est D , quàm B :
 def. 2. b. | ergo depressior est B , quàm D . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 19. Prop. 19.

S Vb multiplicatæ rationes, cum pariter multiplicatis, in eadem sunt ratione logarithmica, si prout sibi mutuo respondent, ita sumantur.

*Hypoth.*Rationū A, B , sunt æquemultiplicatæ rationes $3A, 3B$.Dico A ad B , atque $3A$ ad $3B$, esse logarithmicè proportionales.

De-

Demonstr.

16. b. Rationes A ad B , & A ad B , & A ad B , quot-
cunque oportet, acceptæ, sunt proportionales: er-
go ex antecedentibus composita $3A$, ad ex con-
sequentibus compositam $3B$, est logarithmicè,
vt A ad B . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 20. Prop. 20.

Rationes logarithmicè proportionales, permutan-
do, sunt logarithmicè proportionales.

Hypoth.

Sint rationes logarithmicè proportionales, A ad B ,
vt C ad D .

Dico permutando, esse logarithmicè proportionales,
 A ad C , vt B ad D .

Prepar.

Rationum A, B , sumantur æquemultiplicatæ $3A, 3B$:
& rationum C, D , æquemultiplicatæ $2C, 2D$.

Demonstr.

19. b. Rationes $3A$ ad $3B$, & A ad B , sunt lo-
hypoth, garithmicè proportionales. item A ad B , & C
19. b. ad D . item C ad D , & $2C$ ad $2D$. Ergo
15. b. $3A$ ad $3B$, & $2C$ ad $2D$ sunt logarithmicè
18. b. proportionales. Ergo si $3A$, est altior, quàm
def. 12. b. $2C$; etiam $3B$, est altior, quàm $2D$: si æque-
alta, æquealta: si depressior; depressior. Ergo A
ad C ,

ad C , & B ad D , sunt logarithmicè proportionales.
Quod &c.

Quare &c.

Theor. 21. Prop. 21.

Rationes inter se, vel & cum quantitatibus, logarithmicè proportionales, diuidendo, sunt logarithmicè proportionales.

Hypoth. 1.

Rationes $A+B$ ad B , & $C+D$ ad D , sunt logarithmicè proportionales.

Dico diuidendo rationes A ad B , & C ad D , esse logarithmicè proportionales.

Præpar.

Sumantur ipsarum A , B , C , D , æquemultiplicatæ $3A$, $3B$, $3C$, $3D$: necnon ipsarum C , D , aliæ quælibet æquemultiplicatæ $4C$, $4D$.

Demonstr.

p. h. Rationes $3A$, $3B$, æquemultiplicatæ sunt rationum A , B : Ergo ratio $3A+3B$ totuplicata est rationis $A+B$, quotuplicata est $3A$ ipsius *constr.*
p. b. A : necnon $3C$, & $3D$ ipsarum C , & D : necnon ratio $3C+3D$ rationis $C+D$.

constr. Rationes quoque $3C$, $3D$, rationum C , D , & rationes $4C$, $4D$, earundem C , D rationum sunt æquemultiplicatæ: ergo etiam $7C$, $7D$, earundem C , D rationum sunt æquemultiplicatæ.
p. b. Et

hypoth.
def.12. b

Et quoniam rationes $A+B$ ad B , & $C+D$ ad D , sunt logarithmicè proportionales: si $3A+3B$, altior est, quàm $7B$; etiam $3C+3D$, altior est, quàm $7D$: si æquealta; æquealta: si depressior; depressior.

4. 3. Sed si $3A$ altior est, quàm $4B$; adcomposita communi ratione $3B$; etiam $3A+3B$ altior est, quàm $7B$. nam eiusdem maioris, vel eiusdem minoris inæqualitatis, ex remotioribus rationibus ab æqualitate, composita ratio; est remotior; & ex propioribus, propior. & ostensum est, quòd si $3A+3B$, altior est quàm $7B$; etiam $3C+3D$, altior est, quàm $7D$: & seposita communi ratione $3D$; altior est $3C$, quàm $4D$. nam si $3C$, non esset altior, quàm $4D$: composita, $3D$; fieret ratio $3C+3D$, non altior, quàm $7D$. *contra supersùs probata.*

def.12. b Ergo si $3A$ altior est, quàm $4B$, etiam $3C$ altior est, quàm $4D$: similiter ostendetur, si æquealta; æquealta: si depressior; depressior. Ergo A ad B , est logarithmicè, vt C ad D . Quod &c.

Hypoth. 2.

Rationes $A+B$ ad B , & quantitates $a+b$ ad b , sunt logarithmicè proportionales.

Dico diuidendo, rationes A ad B , & quantitates a ad b esse logarithmicè proportionales.

Præpar.

Rationum A, B , & quantitatum a, b , sumantur æquemultiplicatæ rationes $3A, 3B$, & æquemultiplices quantitates $3a, 3b$. item rationis B , & quantitatis b , multiplicata ratio $4B$, & æquemultiplex quantitas $4b$.

Demonstr.

p. h. Ratio $3A+3B$, totuplicata est rationis $A+B$,
confir. quotuplicata est $3A$, ipsius A ; & quantitas $3a$,
p. 5. quantitatis a ; & quantitas $3b$, quantitatis b ; &
 quantitas $3a+3b$, quantitatis $a+b$.

confir. Quantitates quoque $3a, 3b$, quantitatum a, b ,
 & quantitates $4a, 4b$, earumdem a, b , sunt
2. 5. æquemultiplices; ergo $7a, 7b$, earumdem a, b ,
 sunt æquemultiplices.

hypothesis. Et quoniam rationes $A+B$ ad B , & quanti-
def 8. h. rates $a+b$ ad b , sunt logarithmicè proportionales: si $3A+3B$, altior est, quàm $7B$; etiam $3a+3b$, maior est, quàm $7b$: si æquealta; æqualis: si depressior; minor.

sup. Sed si $3A$, altior est, quàm $4B$; etiam $3A+3B$,
 altior est, quàm $7B$: & si $3a+3b$, maiore est,
 quàm $7b$; etiam, dempta communi $3b$, relin-
 quitur $3a$, maior quàm $4b$. Ergo si $3A$, altior
 est, quàm $4B$; etiam $3a$, maior est, quàm $4b$:
 & similiter ostendetur, si æquealta; æquali; si de-
def. 8. h. depressior; minor. Ergo rationes A ad B , &
 quantitates a ad b , sunt logarithmicè propor-
 tionales. Quod &c. Quare &c.

Theor. 22. Prop. 22.

Rationes inter se, vel & cum quantitatibus, logarithmicè proportionales, componendo, sunt logarithmicè proportionales.

Hypoth. 1.

Rationes A ad B , & C ad D , sunt logarithmicè proportionales.

Dico componendo, rationes $A+B$ ad B , & $C+D$ ad D , esse logarithmicè proportionales.

Prepar.

Assumatur E ratio, ad quam $C+D$ sit logarithmicè, sicut $A+B$ ad B .

Demonstr.

constr. Quoniam $A+B$ ad B , & $C+D$ ad E , sunt logarithmicè proportionales: ergo dividendo A ad B , & $C+D - E$ ad E , sunt logarithmicè proportionales. Sed A ad B , & C ad D sunt logarithmicè proportionales. Ergo C ad D , & $C+D - E$ ad E , sunt logarithmicè proportionales. Ergo D , æquealta est, ideoque eadem, atque E .

18. b. Nam si D , esset altior, quàm E : esset C altior, quàm $C+D - E$. Sed contra, esset $C+D$ altior, quàm $C+E$: & $C+D - E$, altior, quàm C : quod est contradictio. Rursum si D , esset depressior, quàm E : esset C , depressior, quàm $C+D - E$. Sed contra, esset $C+D$, depressior; quàm $C+E$:

&

4. 3. & $C+D \dashv E$, depressior, quàm C : quod est
contradictio.

Ergo D eadem est, atque E . Ergo $C+D$ ad
18. h. D , & $C+D$ ad E , sunt proportionales logarithmi-
constr. cè. Sed $A+B$ ad B est vt $C+D$ ad E : ergo A
15. b. $+B$ ad B , est vt $C+D$ ad D logarithmicè.
Quod &c.

Hypoth. 2.

Rationes A ad B , & quantitates a ad b , sunt loga-
rithmicè proportionales.

Dico componendo, rationes $A+B$ ad B , & quanti-
tates $a+b$ ad b , esse logarithmicè proportionales.

Præpar.

Assumatur c quantitas, ad quàm, $a+b$ est logarithmi-
cè, sicut ratio $A+B$, ad rationem B .

Demonstr.

constr. Quoniam $A+B$ ad B , & $a+b$ ad c , sunt lo-
garithmicè proportionales: ergo diuidendo A ad
 B , & $a+b \dashv c$ ad c , sunt logarithmicè, propor-
tiones. Sed A ad B , & a ad b , sunt logari-
thmicè proportionales. Ergo a ad b , & $a+b$
15. b. $\dashv c$ ad c , sunt proportionales. Ergo b , c , sunt
quantitates æquales.

14. 5. Nam si b , maior esset, quàm c : esset a , maior,
quàm $a+b \dashv c$. Sed contra; esset $a+b$, maior,
quàm $a+c$: & $a+b \dashv c$, maior, quàm a : quod
14. 5. est contradictio. Rursum si b , minor esset, quàm

c : esset

c : esset a , minor, quàm $a+b-c$. sed contra, esset $a+b$, minor, quàm $a+c$: & $a+b-c$, minor quàm a : quod est contradictio.

7. 5. *constr.* Ergo b, c , sunt æquales. Ergo $a+b$, ad b , est vt $a+b$ ad c : Sed ratio $A+B$ ad rationem B , est logarithmicè, vt quantitas $a+b$ ad quantitatem c : Ergo etiam est logarithmicè, vt $a+b$ ad b : Quod &c.

Quare &c.

Theor. 23. Prop. 23.

SI quemadmodum tota ratio, ad totam, ita logarithmicè fuerit abscissa ratio, ad abscissam: erit & reliqua, ad residuam, sicut logarithmicè tota ad totam.

Hypoth.

Rationes $A+B$ ad $C+D$, & A ad C , sunt proportionales logarithmicè.

Dico etiam $A+B$ ad $C+D$, & B ad D , esse proportionales logarithmicè.

Demonstr.

hypoth. | Rationes $A+B$ ad $C+D$, & A ad C , sunt
 20. *b.* | proportionales logarithmicè: ergo permutando,
 21. *b.* | sunt proportionales logarithmicè $A+B$ ad A ,
 & $C+D$ ad C : ergo diuidendo, B ad A , &
 20. *b.* | D ad C , sunt proportionales: ergo permutando
 B ad D , & A ad C , sunt proportionales:
 | Sed A ad C , & $A+B$ ad $C+D$ sunt proportionales.

15. b. | nales. Ergo $A+B$ ad $C+D$, & B ad D , sunt
| logarithmicè proportionales. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 24. Prop. 24.

SI sint tres rationes, atque tres quantitates, quæ binæ,
& in eadem ratione logarithmica sumantur: ex æquo
autem prima ratio, quàm tertia, altior fuerit; erit & prima
quantitas, quàm tertia, maior: quod si prima ratio, fuerit
æquealta tertiæ; erit & prima quantitas, æqualis tertiæ:
si illa depressior; hæc quoque minor erit. Et è conuerso.

Hypoth. commun.

Tres rationes A , B , C , & tres quantitates a , b , c , binæ,
& binæ, sunt logarithmicè proportionales: A ad B ,
vt a ad b ; B ad C , vt b ad c .

Hypoth. 1.

Altior est ratio A , quàm C .

Dico, maiorem esse quantitatem a , quàm c .

Demonstr.

12. b. | Ratio B ad C , maior est logarithmicè, quàm
hypoth. | B ad A : sed b ad c est logarithmicè vt B ad
def. 8. b. | C : & B ad A , est logarithmicè, vt b ad a : er-
17. b. | go b ad c , maior est, quàm b ad a . Ergo
10. 5. | maior est a , quàm c . Quod &c.

Hypoth. 2.

Æquealtæ sunt rationes A , C .

Dico, æquales esse quantitates a , c .

Demonstr.

11. b. | Ratio B ad C , est logarithmicè, ut B ad
^{sup.} | A . Ergo b ad c , est ut b ad a . Ergo æqua-
 9. 5. | les sunt a , c . Quod &c.

Hypoth. 3.

Depressior est ratio A , quàm C .

Dico, minorem esse quantitatem a , quàm c .

Demonstr.

def. p. b. | Altior est, C , quàm A : ergo maior est c ,
^{sup.} | quàm a : Ergo minor est a , quàm c . Quod &c.

Eodem modo demonstrabitur è conuerso: quòd si a quantitas, maior est quantitate c : etiàm ratio A , ratione C est altior: si æqualis; æquealta: si minor; depressior. Quod. &c.

Quare &c.

Theor. 25. Prop. 25.

SI sint tres rationes, aliæque ipsis æquales numero, quæ binæ, & in eadem ratione logarithmica sumantur: ex æquo autem, prima quàm tertia altior fuerit; erit & quarta, quàm sexta altior. Quod si prima tertiæ fuerit æquealta; erit & quarta æquealta sextæ: sin illa depressior; hæc quoque depressior erit.

Hypoth. commun.

Tres rationes A , B , C , aliæque tres D , E , F , binæ, & binæ sunt logarithmicè proportionales: A ad B , ut D ad E ; B ad C , ut E ad F .

*Hypoth. 1.*Altior est ratio A , quàm C .Dico altiorem esse D , quàm F .*Demonstr.*

12. b. | Maior est B , ad C , logarithmicè, quàm B ad
hypoth. | A . Sed B ad C est logarithmicè, vt E ad F : &
def. 12. b. | B ad A , logarithmicè, vt E ad D . Ergo maior
 17. b. | est E ad F , logarithmicè, quàm E ad D . Ergo
 14. b. | altior est D , quàm F . Quod &c.

*Hypoth. 2.*Æquealtæ sunt rationes A , C .Dico, æquealtas esse rationes D , F .*Demonstr.*

11. b. | Eadem est B ad C , logarithmicè, quæ B
sup. | ad A . Ergo eadem est E ad F logarithmicè quæ
 13. b. | E ad D . Ergo æquealtæ sunt rationes D , F .
 Quod &c. *Hypoth. 3.*

Depressior est A , quàm C .Dico, depressiorem esse D , quàm F .*Demonstr.*

def p. b. | Altior est enim C , quàm A : ergo altior est F ,
l. sup. | quàm D : ergo depressior est D , quàm F . Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 26. Prop. 26.

SI sint tres quantitates, atque tres rationes, quæ binæ, &
 in eadem ratione logarithmica sumantur; fueritque
 per-

perturbata earum proportio: ex æquo autem prima quantitas, quàm tertia, maior fuerit; erit & prima ratio, quàm tertia, altior. Quod si prima tertiæ fuerit æqualis quantitas; erit & prima tertiæ, æquealta ratio: sin illa minor, hæc quoque depressior erit. Et è conuerso.

Hypoth. commun.

Tres quantitates a , b , c , atque tres rationes A , B , C , binæ, & binæ, sunt logarithmicè, proportionales; & earum perturbata est proportio: quantitates enim a ad b , & rationes B ad C , sunt logarithmicè proportionales: necnon quantitates b ad c , & rationes A ad B , sunt logarithmicè proportionales.

Hypoth. 1.

Maior est a , quàm c .

Dico altiore esse A , quàm C .

Demonstr.

8. 5. | Maiore est b ad c ratio, quàm b ad a ; Sed
bypoth. | b ad c , est logarithmicè, vt A ad B : & b ad
def. 8. h. | a , logarithmicè, vt C ad B . Ergo A ad B ,
 17. b. | maior est logarithmicè, quàm C ad B . Ergo
 14. b. | altior est A , quàm C . Quod &c.

Hypoth. 2.

Æquales sunt a , c .

Dico æquealtas esse A , C .

Demonstr.

7. 5. | Eadem est b ad c , quæ b ad a . Ergo eadem
sup. | est logarithmicè A ad B , quæ C ad B . Ergo A , C
 13. b. | sunt æquealtæ. Quod &c. *Hy-*

Præpar.

Rationum A, B , & quantitatum a, b , sumantur æquemultiplicatæ rationes $3A, 3B$, & æquemultiplices quantitates $3a, 3b$. item rationis B , & quantitatis b , multiplicata ratio $4B$, & æquemultiplex quantitas $4b$.

Demonstr.

p. b. Ratio $3A+3B$, totuplicata est rationis $A+B$,
confir. quotuplicata est $3A$, ipsius A ; & quantitas $3a$,
p. 5. quantitatis a ; & quantitas $3b$, quantitatis b ; &
 quantitas $3a+3b$, quantitatis $a+b$.

confir. Quantitates quoque $3a, 3b$, quantitatum a, b ,
 & quantitates $4a, 4b$, earundem a, b , sunt
2. 5. æquemultiplices; ergo $7a, 7b$, earundem a, b ,
 sunt æquemultiplices.

hypoth. Et quoniam rationes $A+B$ ad B , & quanti-
 tates $a+b$ ad b , sunt logarithmicè propor-
def 8. b. tionales: si $3A+3B$, altior est, quàm $7B$; etiam $3a$
 + $3b$, maior est, quàm $7b$: si æquealta; æqualis: si
 depressior; minor.

sup. Sed si $3A$, altior est, quàm $4B$; etiam $3A+3B$,
 altior est, quàm $7B$: & si $3a+3b$, maior est,
 quàm $7b$; etiam, dempta communi $3b$, relin-
 quitur $3a$, maior quàm $4b$. Ergo si $3A$, altior
 est, quàm $4B$; etiam $3a$, maior est, quàm $4b$:
 & similiter ostendetur, si æquealta; æquali; si de-
def. 8. b. pressior; minor. Ergo rationes A ad B , &
 quantitates a ad b , sunt logarithmicè propor-
 tionales. Quod &c. Quare &c.

Theor. 22. Prop. 22.

Rationes inter se, vel & cum quantitatibus, logarithmicè proportionales, componendo, sunt logarithmicè proportionales.

Hypoth. 1.

Rationes A ad B , & C ad D , sunt logarithmicè proportionales.

Dico componendo, rationes $A+B$ ad B , & $C+D$ ad D , esse logarithmicè proportionales.

Præpar.

Assumatur E ratio, ad quam $C+D$ sit logarithmicè, sicut $A+B$ ad B .

Demonstr.

constr. Quoniam $A+B$ ad B , & $C+D$ ad E , sunt logarithmicè proportionales; ergo diuidendo A ad B , & $C+D-E$ ad E , sunt logarithmicè proportionales. Sed A ad B , & C ad D sunt logarithmicè proportionales. Ergo C ad D , & $C+D-E$ ad E , sunt logarithmicè proportionales. Ergo D , æquealta est, ideoque eadem, atque E .

18. b. Nam si D , esset altior, quàm E : esset C altior, quàm $C+D-E$. Sed contra, esset $C+D$ altior, quàm $C+E$: & $C+D-E$, altior, quàm C : quod est contradictio. Rursum si D , esset depressior, quàm E : esset C , depressior, quàm $C+D-E$. Sed contra, esset $C+D$, depressior; quàm $C+E$:

&

& ex æqualitate in eadem erunt ratione logarithmica.

Hypoth.

Sint quotcunque rationes A, B, C, D , totidemque quantitates a, b, c, d : binæ, & binæ logarithmicè proportionales: A ad B , vt a ad b ; B ad C , vt b ad c ; C ad D , vt c ad d .

Dico ex æqualitate, A ad C , & a ad c , esse logarithmicè proportionales.

Item A ad D , & a ad d esse logarithmicè proportionales.

Prepar.

Rationis A , & quantitatis a , sumantur æquemultiplicata, & multiplex, $3A, 3a$: item rationis, & quantitatis, B, b , sumantur, $4B, 4b$: & rationis, & quantitatis, C, c , sumantur, $2C, 2c$.

Demonstr.

| | |
|-------------------|--|
| <i>hypoth.</i> | Quoniam A ad B , & a ad b , sunt logarithmicè proportionales: ergo $3A$ ad $4B$, & $3a$ ad $4b$, sunt logarithmicè proportionales. |
| 6. b. | Item quoniam B ad C , & b ad c , sunt logarithmicè proportionales: ergo $4B$ ad $2C$, & |
| <i>hypoth.</i> | $4b$ ad $2c$, sunt logarithmicè proportionales. Ergo ex æquali, si $3A$ est altior, quàm $2C$; etiam |
| 6. b. | $3a$ est maior, quàm $2c$: si æquealta; æqualis: si |
| 24. b. | depressior; minor. Ergo A ad C , & a ad c |
| <i>def. 8. b.</i> | sunt logarithmicè proportionales. Quod &c. |
| <i>hypoth.</i> | Sunt autem C ad D , & c ad d , logarithmicè pro- |

sup. | cè proportionales. Ergo A ad D , & a ad d ,
 | sunt logarithmicè proportionales. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 29. Propos. 29.

SI sint quotcunque rationes, & aliæ ipsis æquales numero, quæ binæ, & in eadem logarithmica ratione sumantur: & ex æqualitate, in eadem erunt logarithmica ratione.

Hypoth.

: Sint quotcunque rationes, & aliæ totidem, A, B, C, D , & E, F, G, H : quæ binæ, & in eadem ratione sumantur: videlicet, A ad B , & E ad F : item B ad C , & F ad G : necnon C ad D , & G ad H .

Dico ex æqualitate A ad C , & E ad G , esse logarithmicè, proportionales.

Item A ad D , & E ad H , esse logarithmicè proportionales.

Præpar.

Rationum A, E , sumantur æquemultiplicatæ, $3A$, $3E$: item rationum B, F , æquemultiplicatæ $4B$, $4F$: & rationum C, G , æquemultiplicatæ $2C$, $2G$.

Demonstr.

hypoth. | Quoniam A ad B , & E ad F , sunt loga-
 7. b. | rithmicè proportionales, etiam $3A$ ad $4B$, &
 | $3E$ ad $4F$, sunt logarithmicè proportionales.

hypoth. | item quoniam B ad C , & F ad G , sunt lo-

7. b. | garithmicè proportionales; etiam $4B$ ad $2C$,
 & $4F$ ad $2G$, sunt logarithmicè, proportio-
 25. b. | nales. Ergo si $3A$ altior est quàm $2C$; etiam
 3 E altior est, quàm $2G$: si æquealta; æquealta: si
 def. 12. b. | depressior; depressior. Ergo A ad C , & E ad G ,
 | sunt logarithmicè proportionales. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 30. Prop. 30.

SI sint tres quantitates, totidemque rationes, quæ binæ
 in eadem ratione logarithmica sumantur; fuerit autem
 perturbata earum proportio: & ex æqualitate, in eadem
 erunt ratione logarithmica.

Hypoth.

Sint tres quantitates a , b , c , totidemque rationes A ,
 B , C , binæ, & binæ logarithmicè proportionales, & earum
 sit perturbata proportio: nempe sint a ad b , & B
 ad C , logarithmicè proportionales; & b ad c , & A ad
 B , logarithmicè proportionales.

Dico, a ad c , & A ad C , esse logarithmicè pro-
 portionales.

Præpar.

Sumantur ipsarum a , b , quantitarum æquemultiplic-
 ces $3a$, $3b$, & rationis A , æquemultiplicata $3A$. ip-
 sarum quoque rationum B , C , & quantitatis c , suman-
 tur æquemultiplicatæ rationes $4B$, $4C$, & æquemultiplex
 quantitas $4c$.

De-

Demonstr.

bypoth. | Quoniam b ad c , & A ad B , sunt logarithmicè proportionales: etiam $3b$ ad $4c$, & $3A$ ad
 6. *b.* | $4B$, sunt logarithmicè proportionales: sunt au-
 15. 5. | tem $3a$ ad $3b$, sicut a ad b : & a ad b , sicut lo-
bypoth. | garithmicè B ad C : & B ad C logarithmicè, si-
 19. *b.* | cut $4B$ ad $4C$. Ergo $3a$ ad $3b$, est vt $4B$ ad $4C$.
 17. *b.* | Sed ostensum est, $3b$ ad $4c$, esse logarithmicè, vt
 26. *b.* | $3A$ ad $4B$. ergo ex æquali, si $3a$ est maior, quàm
def.8.b. | $4c$; etiam $3A$ est altior, quàm $4C$: si æqualis;
 | æquealta: si minor; depressior. Ergo a ad c , est
 | logarithmicè, sicut A ad C . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 3.1. Prop. 31.

Sint tres rationes, aliæque ipsiæ æquales numero, quæ binæ in eadem ratione logarithmica sumantur, fuerit autem perturbata earum proportio logarithmica: etiam ex æqualitate, in eadem erunt logarithmica ratione.

Hypothesis.

Tres rationes A, B, C , aliæque tres D, E, F , binæ sunt in eadem ratione logarithmica, & earum est perturbata proportio logarithmica; sunt enim A ad B , & E ad F logarithmicè proportionales: necnon B ad C , & D ad E sunt logarithmicè proportionales.

Dico, ex æquali, A ad C , & D ad F , esse logarithmicè proportionales.

Prepar.

Rationum A, B, D , sumantur æquemultiplicatæ $3A, 3B, 3D$: & rationum C, E, F , aliæ sumantur æquemultiplicatæ $4C, 4E, 4F$.

Demonstr.

19. *h.* | Rationes $3A$ ad $3B$, & A ad B , sunt logari-
hypoth. | thmicè proportionales: rationes A ad B , & E
 19. *h.* | ad F , sunt logarithmicè proportionales: ratio-
 nes E ad F , & $4E$ ad $4F$, sunt logarithmicè
 17. *h.* | proportionales: ergo rationes $3A$ ad $3B$, & $4E$
hypoth. | ad $4F$, sunt logarithmicè proportionales. Et
 quoniã B ad C , & D ad E rationes, logarithmicè
 7. *h.* | sunt proportionales: etiam $3B$ ad $4C$, & $3D$
 ad $4E$ rationes, logarithmicè sunt proportio-
 27. *h.* | nales. Ergo ex æquali, si $3A$ est altior, quàm $4C$;
 etiam $3D$ est altior, quàm $4F$: si æqualta; æque-
def. 12. h. | alta: si depressior; depressior. Ergo A ad C , &
 D ad F rationes, sunt logarithmicè proportio-
 nales. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 32. Prop. 32.

SI prima ratio ad secundam, logarithmicè fuerit, sicut prima quantitas ad secundam; tertia quoque ratio ad secundam, logarithmicè fuerit, sicut tertia quantitas ad secundam: etiam composita ex prima, & tertia ratione, ad secundam, erit logarithmicè, sicut aggregata quantitas

ex

ex prima, & tertia, ad secundam.

Hypoth.

Sint A, B, C rationes, & a, b, c , quantitates: & sit A ad B logarithmicè, sicut a ad b : item C ad B . logarithmicè, sicut c ad b .

Dico $A+C$ ad B , esse logarithmicè, sicut $a+c$ ad b .

Demonstr.

| | |
|-------------------|---|
| <i>hypoth.</i> | Quoniam C ad B , est logarithmicè, sicut c ad b : conuertèdo, B ad C , est logarithmicè, sicut b ad c : Sed A ad B , est logarithmicè, sicut a ad b : ergo ex æquali A ad C , est logarithmicè, sicut a ad c : ergo componendo $A+C$ ad C , est logarithmicè, sicut $a+c$ ad c . Sed C ad B est logarithmicè, sicut c ad b : ergo ex æquali $A+C$ ad B est logarithmicè sicut $a+c$ ad b . Quod &c. |
| <i>def. 8. b.</i> | |
| <i>hypoth.</i> | |
| <i>28. b.</i> | |
| <i>22. b.</i> | |

Quare &c.

Theor. 33. Prop. 33.

SI prima ratio ad secundam, eadem logarithmicè fuerit, quæ tertia ad quartam; fuerit autem, & quinta ad secundam, eadem logarithmicè, quæ sexta ad quartam: erit & composita prima cum quinta ad secundam, eadem quæ composita tertia cum sexta ad quartam.

Hypoth.

Rationes A ad B , & C ad D , sunt proportionales: item E ad B , & F ad D , sunt proportionales.

Dico $A+E$ ad B , & $C+F$ ad D , esse proportionales.

De

Demonstr.

hypoth. Quoniam E ad B , & F ad D , sunt logari-
def. 12. h. thmicè proportionales: conuertendo B ad E
 & D ad F , sunt logarithmicè proportionales
hypoth. sed A ad B , & C ad D , sunt logarithmicè
29. h. proportionales: Ergo ex æquali A ad E , & C
22. h. ad F ; sunt logarithmicè proportionales: ergo
 componendo $A+E$ ad E , & $C+F$ ad F , sunt
hypoth. logarithmicè proportionales. Sed E ad B , &
29. h. F ad D , sunt logarithmicè proportionales. Er-
 go $A+E$ ad B , & $C+F$ ad D , sunt logarithmi-
 cè proportionales. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 34. Prop. 34.

SI rationes quatuor fuerint logarithmicè proporziona-
 les: composita ex duabus, altiore omnium, & depre-
 ssiore omnium, altior est, quàm composita ex reliquis
 duabus.

Hypoth.

Sint rationes A ad B , & C ad D . logarithmicè
 proportionales: Et esto A altior, quàm B , necnon
 altior quàm C . Et quoniam A altior est, quàm C : er-
 go B altior est, quàm D . Ergo A altior est omnium;
 & D depressior omnium.

Dico rationem $A+D$, altiozem esse ratione
 $B+C$.

Pre-

Præpar.

Quoniam A altior est, quàm B : sumatur E ratio quacum composita B , facit rationem A : vt ita ratio A sit eadem, quæ $B+E$. Item quoniam C altior est, quàm D : sumatur F ratio, quacum composita D , facit rationem C : vt ita ratio C , sit eadem, quæ $D+F$.

Demonstr.

hypoth. Quoniam A ad B , & C ad D , sunt logarithmicè proportionales: & est A , eadem, quæ
constr. $B+E$: & C , eadè, quæ $D+F$. ergo $B+E$ ad B ,
 11. *b.* & $D+F$ ad D ; sunt logarithmicè proportionales:
 21. *b.* ergo diuidendo, E ad B , & F ad D , sunt
b hypoth. logarithmicè proportionales. Sed B altior est,
 18. *b.* quàm D : ergo E altior est, quàm F : compo-
 4. 3. sitisque communiter B , & D rationibus; ergo
constr. $B+E+D$ ratio, altior est, quàm $B+D+F$. Sed
 $B+E$, ratio eadem est, quæ A : & $D+F$, eadem
 quæ C : ergo $A+D$ altior est, quàm
 $B+C$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 35. Prop. 35.

Rationes proportionales, per conuersionem rationis, sunt proportionales.

Hypoth.

Rationes A ad B , & C ad D sunt logarithmicè proportionales: & est A altior, quàm B : ideoque etiam C , altior

altior est, quàm D .

Dico A ad $A-B$, esse logarithmicè, sicut C ad $C-D$.

Demonstr.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| <i>hypoth.</i> | $A; B; C; D.$ |
| <i>21. b.</i> | $A-B; B; C-D; D.$ |
| <i>def. 12. b.</i> | $B; A; D; C.$ |
| <i>29. b.</i> | $A-B; A; C-D; C.$ |
| <i>def. 12. b.</i> | $A; A-B; C; C-D. \text{ Quod \&c.}$ |

Quare &c.

Theor. 36. Prop. 36.

Rationes logarithmicè proportionales, per homologiam sunt logarithmicè proportionales.

Demonstr.

| | |
|--------------------|--|
| <i>def. 12. b.</i> | <p>Nam conuertendo, rationes fiunt proportionales: item homologas depressores ab homologis altioribus decomponendo: & adcomponendo; & per conuersionem rationis: & diuidendo: & æquemultiplicando, & æquesubmultiplicando: & permutando: & colligendo: & ex æquali in proportionem logarithmica ordinata: coniunctisque omnifariam argumentis huiusmodi, quocunque ordine, per homologiam, logarithmicè proportionales fiunt. Quod &c.</p> |
| <i>23. b.</i> | |
| <i>22. b.</i> | |
| <i>35. b.</i> | |
| <i>21. b.</i> | |
| <i>19. b.</i> | |
| <i>20. b.</i> | |
| <i>16. b.</i> | |
| <i>28. b.</i> | |

Quare &c.



Petrus Mengolus, Io. Galeatio Manzio, iuueni
studiosissimo. S. D.



*Q*uintum hoc elementum, de nouis, & naturalibus logarithmis, cuiusque rationis inseparabiliter proprijs, quocum communicarem, neminem in mea, aut cuiusquam alterius Mathematici schola, satis noui dispositum, prater te, omnium bonarum artium, & in primis Mathematicarum studiosissimum. Et hac profectio insignis felicitas, in comparabili virtuti accessit, & meritis Excellentissimi praeceptoris tui Cassini: quod te, tum frequentem in Museo auditorem, tum in suis Astronomicis, & Aquaticis laboribus, comitem indiuiduum, & solertem nactus fuerit adiutorem. Itaque cum tuam mihi consuetudinem, rariùs hoc anno, quàm ante consueueras, offerres; mandauit, meum tui desiderium, tibi significari: ut meorum etiam studiorum particeps fieres, & consultor. Gratiam liberaliter fecisti, quàm volebam: meque domi aliquoties conuenisti, huius-

*see opusculi partem hanc scriptitantem. Et ex me, tum definitiones precedentium elementorum, & rationes nominum, & propriam cuiusque utilitatem elementi, necnon quasdam nobiliores demonstrationes audisti sparsim; tum vel maximè numerosam methodum: qua hyperlogarithmorum, & hypologarithmorum, & logarithmorum rationes mihi contigit inuenire. tuque inuenti subtilitatem laudasti, quòd mihi Deus liberaliter tribuit: atque utilitatem trigonometricam, ad faciliorem logarithmici canonis constructionem, optimè prouidisti. Ex laude tua, plurimum profecisse me fateor: nam alacrior factus, & ex tecum communicatione vegetior, multarum conclusionum, quas prænoui euidentissimis arithmeticis artificijs, qua mihi supererant demonstranda, media lemmata reperire capi, longè feliciter. Libellum igitur hucusque non sine tuo adminiculo perfectum, offero: ut sermones indemonstratos, quos inuicem habebamus, per te ipsum legendo possis comple-
 re. Vale. meque, & labores meos, in primis Excellentissimo Casino, deinde alijs tuis, conscholaribus, & amicis, ut commendes, rogo.*




GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

ELEMENTVM QVINTVM.

DEFINITIONES.



- 1  Differentia duarum quantitatum, quando prima superat secundam, dicitur, Excessus primæ & secundæ.
- 2 Quando verò prima superatur à secunda, dicitur, Defectus primæ, & secundæ.
3. Similes differentiæ dicentur, excessus excessibus, & defectus defectibus.
4. Dissimiles verò, excessus defectibus.
5. Quatuor quantitates, dicentur, Arithmeticè dispositæ; cum primæ & secundæ, tertię & quartæ, fuerint similes, & æquales differentię.
6. Inversio Arithmetica, dicitur; cum quatuor quantitates arithmeticè dispositæ, prima & secunda, tertiã & quarta, rursus disponantur arithmeticè, secunda & prima, quarta & tertiã.

7. Permutatio Arithmetica, dicitur: cum quatuor quantitates arithmetice dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursus disponenter arithmetice, prima & tertia, secunda & quarta.

8. Si fuerint aliquot quantitates, atque alia totidem, & fuerint prima & secunda primarum, item prima & secunda secundarum, dispositæ arithmetice; fuerint quoque secunda & tertia primarum, item secunda & tertia secundarum, arithmetice dispositæ; & sic deinceps vsque ad ultimas: dicentur primæ similiter esse dispositæ arithmetice, atque secunde.

9. Quod si prima & vltima primarum, item prima & vltima secundarum, fuerint arithmetice dispositæ; dicentur, ita dispositæ, ex æqualitate arithmetica.

10. Tres quantitates, dicentur, arithmetice ordinate; cum primæ & secundæ, secundæ & tertiæ, similes, & æquales fuerint differentia.

11. Plures quantitates, dicentur, arithmetice ordinate; cum ternæ deinceps fuerint arithmetice ordinate; id est, cum primæ & secundæ, secundæ & tertiæ, tertiæ & quartæ, & deinceps vsque ad vltimam, similes, & æquales fuerint differentia.

12. Series naturalis arithmetica, dicitur; cuius ordinarum arithmetice quantitarum prima, dimidia est secundæ.

13. Quatuor quantitates, dicentur, Harmonice dispositæ, cum differentia primæ & secundæ, ad similem differ-

rentiam tertiæ & quartæ, rationem compositam habuerit ex rationibus, primæ ad tertiam, & secundæ ad quartam.

14. Inversio Harmonica, dicitur; cùm quatuor quantitates harmonicè dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursùm disponentur harmonicè, secunda & prima, quarta & tertia.

15. Permutatio Harmonica, dicitur, cùm quatuor quantitates harmonicè dispositæ, prima & secunda, tertia & quarta, rursùm disponentur harmonicè, prima & tertia, secunda & quarta.

16. Si fuerint aliquot quantitates, atque aliæ totidem; & fuerint prima & secunda primarum, item prima & secunda secundarum, dispositæ harmonicè; fuerint quoque secunda & tertia primarum, item secunda & tertia secundarum, dispositæ harmonicè; & sic deinceps vsque ad ultimas: dicentur primæ similiter esse dispositæ harmonicè, atque secundæ.

17. Quòd si prima & vltima primarum, item prima & vltima secundarum, fuerint harmonicè dispositæ; dicentur, ita dispositæ, ex æqualitate harmonica.

18. Tres quantitates, dicentur, harmonicè ordinate; cum primæ & secundæ differentia, ad similem differentiam secundæ & tertiæ, fuerit sicut prima, quantitas ad tertiam.

19. Plures quantitates dicentur harmonicè ordinate, cum ternæ deinceps fuerint harmonicè ordinate: idest cum primæ & secundæ differentia, ad similem differentiam secundæ & tertiæ, fuerit vt prima ad tertiam; differentia

quo-

quoque secundæ & tertiæ, ad similem differentiam tertiæ & quartæ, fuerit sicut secunda ad quartam; & sic deinceps vsque ad vltimam.

20. Series naturalis harmonica, dicetur, cuius ordinarum harmonicè quantitarum prima, dupla est secundæ.

21. Si à rationali, series harmonica naturalis fuerit ordinata; & à quotoquoque ordinatorum terminorum quotcunque fuerint deinceps assumpti, & aggregati: summa, dicetur, Prologarithmus.

22. Porrò prologarithmus, dicetur Hyperlogarithmus earum rationum, quas habent inuicem, primus assumptus terminus, & proximus vltior vltimo, non assumptus.

23. Et earum rationum Hypologarithmus, dicetur, quas habent inuicem, vltimus assumptus terminus, & proximus prior primo, non assumptus.

24. Quantitas omni minor hyperlogarithmo earumdem rationum, & omni maior hypologarithmo, earumdem Logarithmus, dicetur.

25. Ex totenis deinceps Prologarithmorum series, dicetur: in qua, ex prioribus, dicetur, Primus; ex totidem immediatè sequentibus, Secundus; ex alijs deinceps totidem, Tertius Prologarithmus; & sic deinceps reliqui. Vt prologarithmorum, ex ternis à secundo, dicetur, Primus, qui ex secundo, tertio, & quarto fit collectis; Secundus, qui ex quinto, sexto, & septimo; Tertius, qui ex octauo, nono, & decimo; & ita deinceps.

26. Si duo prologarithmi, ex inæqualibus multitudine terminis collecti fuerint; & cuius maior est multitudo terminorum, eius termini singuli, per alteram multitudinem fuerint æqualiter diuisi: siquidem factæ partes ordinatim sumptæ maiorum primùm terminorum, deinde minorum, & collectæ totæ, quota est sua maior multitudo terminorum, maiores fuerint singulis terminis alterius prologarithmi: maior profectò prologarithmus erit, ex maioribus partibus; & dicetur, *Perspectè maior*.

27. Si verò factæ partes totæ, minores fuerint singulis: erit profectò minor prologarithmus, ex minoribus partibus; & dicetur *Perspectè minor*.

28. Si quatuor proportionalium, rationalis fuerit prima: quarta, dicetur, *Productus secundæ & tertiæ*. Et significabitur caractere, ex vtrisque secundæ, ac tertiæ caracteribus deinceps conscriptis composito. vtpote ad quam, rationalis habet rationem compositam ex rationibus ad tertiam, & ad secundam. Exempli gratiam. n ad a , est vt b ad ab . Item. n ad ab , est vt c ad abc .

29. Si verò quatuor proportionalium, rationalis fuerit secunda: quarta, dicetur, *Fraçtio*. & significabitur caractere tertiæ, ante caracterem primæ scripto, & patrentheses clauso. Exempli gratia a ad n est vt b ad $b (a)$. Item. ab ad n est vt c ad $c (ab)$. Et c ad n , est vt ab ad $ab (c)$.

30. Tertia autem, dicetur, *Numerator fractionis*: cuius character, scribetur supra lineolam. vt in caractere

fra-

fractionis, b (a), numerator est b .

31. Et prima, dicitur, Denominator fractionis: cuius character, scribetur infra lineolam. ut in caractere fractionis b (a), denominator est a .

32. Numerosa ratio dicitur, cui eandem habet numerus ad numerum.

33. Non numerosa ratio dicitur, cui nulla numerosa est eadem.

34. Non numerosæ rationis logarithmus, dicitur, quantitas, minor omni logarithmo altioris numerosæ rationis, & maior omni logarithmo depressioris.



Theorema prima Propositio prima.

SI trium inæqualium quantitatum, minima, non est minor, quàm secunda potestas differentię extremarum: ipsa differentia extremarum, minor est, ad rationalem, quàm ut minima, ad defectum minimæ, & mediæ.

Hypoth.

Sunto tres inæquales quantitates $a, a+b, a+b+c$: Si esto a , non minor, quàm $b^2+2bc+c^2$.

Dico $b+c$; u : minorem esse, quàm a ; b .

Demonst.

| | | |
|----------------|--|---|
| <i>hypoth.</i> | | $b^2+2bc+c^2$: non maior, quàm a . |
| 3. 5. | | $b^2+2bc+c^2$; $b+c$: non maior, quàm a ; $b+c$. |
| 8. p. | | $b^2+2bc+c^2$; $b+c$: $b+c, u$. |
| 13. 5. | | $b+c$; u : non maior, quàm a ; $b+c$. |
| 8. 5. | | a ; $b+c$: minor, quàm a ; b . |
| 13. 5. | | $b+c$; u : minor, quàm a ; b . Quod &c. |
| Quare &c. | | |

Theor. 2. Prop. 2.

CUm trium inæqualium numerorum, minimus, non est minor, quàm secunda potestas differentię extremorum; si defectus medij & maximi denominetur à minimo; defectus verò minimi & medij auctus vnitare denominetur à maximo: fiunt duæ Fractiones; quarum summa, minor est, quàm differentia extremorum, vnitare aucta, denominata à medio.

Hypoth.

Sunto tres inaequales numeri a , $a+b$, $a+b+c$. & esto
 \rightarrow non minor, quam $b+c$.

Dico $c(a)+b+u(a+b+c)$: minorem esse, quam $b+c$
 $+u(a+b)$.

Demonstr.

p. 1. $b+c$; ut minor est, quam a ; b .

p. 3. $b+c+u$; ut minor, quam $a+b$; b .

3. 3. $b+c+u$; $b+c$ maior, quam $a+b$; a .

Itaque per 19. 7. productus $b+c$, per $a+b$: minor
 est quam productus $b+c+u$, per a .

Additoque communi producto a , per $a+b$. produ-
 ctus $b+c+a$, per $a+b$: minor, quam summa producto-
 rum $b+c+u$, per a ; & $a+b$, per u .

Et communiter multiplicando per c : productus $b+c$
 $+a$, per $a+b$, per c : minor, quam summa productio-
 rum $b+c+u$, per a , per c ; & $a+b$, per a , per c .

Additoque communi producto a , per $b+u$, per $a+b$.
 summa productorum $b+c+a$, per $a+b$, per c ; & a ,
 per $b+u$, per $a+b$: minor, quam productus a , per a
 $+b+c$, per $b+c+u$.

Et communiter dividendo, per a , per $a+b+c$, per a
 $+b$. $c(a)+b+u(a+b+c)$: minor, quam $b+c+u(a+b)$.
 Quod &c.

Quare &c.

Theor. 3. Prop. 3.

SI trium inæqualium numerorum, defectus medij & maximi, auctus vnitatis, denominetur à minimo; defectus verò minimi & medij denominetur à maximo: fiunt due fractiones, quarum summa est maior, quàm differentia extremorum, vnitatis aucta, denominata à medio.

Hypothesis.

Sunto tres inæquales numeri, a , $a+b$, $a+b+c$.

Dico $c+u$ $(a)+b$ $(a+b+c)$: maiorem esse, quàm b $+c+u$ $(a+b)$.

Demonstratio.

Productus $c+u$, per $a+b+c$, per b : maior est producto a , per c , per b .

Additoque communi producto a , per b , per $a+b$. summa productorum $c+u$, per $a+b+c$, per b ; & a , per b , per $a+b$: maior est, quàm productus a , per b , per $a+b+c$.

Additoque communi producto $c+u$, per $a+b+c$, per a . summa productorum $c+u$, per $a+b+c$, per $a+b$; & a , per b , per $a+b$: maior est quàm productus a , per $b+c+u$, per $a+b+c$.

Et communiter diuidendo, per a , per $a+b+c$, per $a+b$. $c+u$ $(a)+b$ $(a+b+c)$: maior est, quàm $b+c+u$ $(a+b)$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 4. Prop. 4.

Quatuor termini arithmetice dispositi, permutando, sunt arithmetice dispositi.

Hypoth.

Quatuor termini $a, a+b, c, c+b$, sunt arithmetice dispositi.

Dico permutando $a, c, a+b, c+b$ esse arithmetice dispositos.

Demonstr.

Siquidem a , maior est, quam c ; tantumdem
def. 5. b. $a+b$, maior est, quam $c+b$: si minor, minor. Er-
 go $a, c, a+b, c+b$, sunt arithmetice dispositi.
 Quod &c. Quare &c.

Theor. 5. Prop. 5.

Si fuerint aliquot quantitates, in vna serie, similiter arithmetice dispositæ, atque totidem, in altera: erunt ex æqualitate arithmetica, prima & vltima, in vna serie, item prima & vltima, in altera, dispositæ arithmetice.

Hypoth.

Sint a, b, c , similiter dispositæ arithmetice, atque alia totidem d, e, f .

Dico ex æqualitate arithmetica, esse dispositas arithmetice, a, c , & d, f .

Demonstr.

def. 8. b. Sunt enim a, b, d, e , arithmetice dispositæ:
4. b. ergo permutando a, d, b, e , sunt arithmetice
def. 5. b. dispositæ: ergo differentia a, d , differentie b, e ,
 similis

similis est, & æqualis. Similiter ostendetur differentia b, c , differentia c, f , similis, & æqualis: ergo differentia a, d , differentia c, f , similis est, & æqualis: ergo a, d, c, f , sunt arithmetice dispositæ: ergo permutando, a, c, d, f , sunt arithmetice dispositæ. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 6. Prop. 6.

A rithmetice dispositarum æquemultiplices, sunt arithmetice dispositæ.

Hypoth.

Sint arithmetice dispositæ $a, a+b, c, c+b$. quorum æquemultiplices $3a, 3a+3b, 3c, 3c+3d$.

Dico $3a, 3a+3b, 3c, 3c+3b$, esse dispositas arithmetice.

Demonstr.

19. 5. | Differentia $3a, 3a+3b$, ad differentiam $a, a+b$, æquemultiplex est, atque $3a$ ad a : sed $3a$
 19. 5. | ad a , æquemultiplex est, atque $3c$ ad c : & $3c$
 ad c , æquemultiplex: atque $3c+3b$ ad $c+b$: ergo differentia $3a, 3a+3b$, ad differentiam $a, a+b$, æquemultiplex est, atque differentia $3c, 3c+3b$ ad differentiam $c, c+b$. Sed differentia $a, a+b$, æqualis est differentia $c, c+b$: ergo differentia $3a, 3a+3b$, æqualis est differentia $3c, 3c+3b$.

Rur-

17. 7. Rursum differentia $3a, 3a+3b$, similis est dif-
 ferentia $a, a+b$: & differentia $a, a+b$ similis dif-
 ferentia $c, c+b$: & differentia $c, c+b$ similis dif-
 ferentia $3c, 3c+3b$. Ergo differentia $3a, 3a$
 $+3b$, similis est, & æqualis differentia $3c, 3c+3b$.
 Ergo $3a, 3a+3b, 3c, 3c+3b$, sunt arithmetice
 disposita. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 7. Prop. 7.

IN serie arithmetica naturali, aliquoteni ab vno, & ali-
 quoteni ab altero, per numeros alterutrorum multitu-
 dinis terminorum multiplicati; sicut primi producti, simi-
 liter secundi, sunt arithmetice dispositi: item tertij, & quar-
 ti, & sic deinceps.

Hypoth.

$a, a+1, a+2. \quad a+3, a+4, a+5.$
 $b, b+1, b+2, b+3. \quad b+4, b+5, b+6, b+7.$
 $4a, 4a+4, 4a+8. \quad 4a+12, 4a+16, 4a+20.$
 $3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9. \quad 3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b+21,$

Sint in serie arithmetica naturali duo termini, a, b : &
 sint ab a , terni; & ternorum primi $a, a+1, a+2$; secun-
 di $a+3, a+4, a+5$: & à b , sint quaterni; & quaternorum
 primi $b, b+1, b+2, b+3$; secundi, $b+4, b+5, b+6, b+7$.

Quoniam in serie arithmetica naturali proximorum
 differentia, sunt vnitates: ergo alterorum, sunt binarij;
 tertiorum, ternarij; quatorum, quaternarij; & sic deinceps.

ceps. Sunt autem primus primorum ex ternis, & primus secundorum, ab invicem tertij: & primus primorum ex quaternis, & primus secundorum, ab invicem quarti: ergo differentia a , $a+3$, est ternarius 3 ; & differentia b , $b+4$, & quaternarius 4 . Multiplicentur itaque terni, per 4 : & quaterni, per 3 : & fiant multiplices terni, & quaterni primi; item terni, & quaterni secundi.

Dico multiplices primorum $4a+8$, $4a+4$, $4a$, $3b$, $3b+3$, $3b+6$, $3b+9$, esse similiter arithmetice dispositos, atque secundorum, $4a+20$, $4a+16$, $4a+12$, $3b+12$, $3b+15$, $3b+18$, $3b+21$.

Demonstr.

| | |
|-------------------|---|
| <i>hypoth.</i> | Termini $a+2$, $a+1$, a , sunt deinceps in serie arithmetica naturali, in qua sunt etiam termini |
| <i>def. 5. b.</i> | $a+5$, $a+4$, $a+3$. Ergo $a+2$, $a+1$, a , sunt similiter arithmetice ordinati, atque $a+5$, |
| <i>6. b.</i> | $a+4$, $a+3$: & eorum æquemultiplices $4a+8$, $4a+4$, $4a$, atque $4a+20$, $4a+16$, $4a+12$. |
| <i>sup.</i> | Defectus simplicium a , $a+3$, est ternarius: |
| <i>5. 5.</i> | ergo earundem quadruplicium defectus $4a$, $4a+12$, est productus 3 , per 4 . Item defectus simplicium b , $b+4$, est quaternarius: ergo earundem triplicium defectus $3b$, $3b+12$, est productus 4 per 3 . Sed productus 3 per 4 , est æqualis producto per 3 . ergo defectus $4a$, $4a+12$, æqualis est defectui $3b$, $3b+12$. Ergo $4a$, $4a+12$, $3b$, $3b+12$, sunt arithmetice |

cè

$$a, a+1, a+2.$$

$$a+3, a+4, a+5.$$

$$b, b+1, b+2, b+3.$$

$$b+4, b+5, b+6, b+7.$$

$$4a, 4a+4, 4a+8.$$

$$4a+12, 4a+16, 4a+20.$$

$$3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9. 3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b+21.$$

4. b. | cè dispositi. Ergo permutando $4a, 3b, 4a+12,$
 5. b. | $3b+12,$ sunt arithmeticè dispositi. Ergo ex equa-
 def. 8. b. | litate arithmetica, $4a+8, 4a+4, 4a, 3b,$ sunt si-
 | militer arithmeticè dispositi, atque $4a+20, 4a$
 | $+16, 4a+12, 3b+12.$

Ostendetur autem similiter vt supra, quod $3b,$
 $3b+3, 3b+6, 3b+9,$ sunt similiter arithmeti-
 cè dispositi, atque $3b+12, 3b+15, 3b+18,$
 5. b. | $3b+21.$ Ergo ex equalitate arithmetica $4a+8,$
 def. 8. b. | $4a+4, 4a, 3b, 3b+3, 3b+6, 3b+9,$ sunt si-
 | militer arithmeticè dispositi, atque $4a+20, 4a$
 | $+16, 4a+12, 3b+12, 3b+15, 3b+18, 3b$
 | $+21.$ Quod &c.

Quare primi terni ab $a,$ & quaterni à $b,$ sunt similiter
 arithmeticè dispositi, atque secundi. Et eadem demon-
 stratione ostendemus, tum secundos, tum primos, esse si-
 militer arithmeticè dispositos, atque tertios, & atque quar-
 tos, & sic deinceps.

Theor. 8. Prop. 8.

Produci, compositam habent rationem producen-
 tium.

Hy

Hypothesis.

Esto quantitatam a, b , productus ab ; & quantitatam c, d , productus cd .

Dico $ab; cd: a; c, +b; d$.

Demonstr.

def. 28b | $ab; u: a; u, +b; u$.

def. 28b | $u; cd: u; c, +u; d$.

p. p. | $ab; cd: a; c, +b; d$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 9. Prop. 9.

Producti communem habentes producentem, sunt ut producentes non communes.

Hypothesis.

Esto quantitatam a, b , productus ab ; & quantitatam a, c , productus ac .

Dico $ab; ac: b; c$.

Demonstr.

8. b. | $ab; ac: b; a, +a; c$.

def. 5.6. | $b; a, +a; c: b; c$.

p. p. | $ab; ac: b; c$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 10. Propos. 10.

Fractiones eundem habentes denominatorem, sunt inter se, ut numeratores.

Hypoth.

Fractionum communis denominator esto a ; suntque numeratores b, c .

Dico $b(a); c(a): b; c$.

Demonstr.

def. 29h | $a; u: b; b(a)$.

def. 29h | $a; u: c; c(a)$.

11. 5. | $b; b(a): c; c(a)$.

2. p. | $b(a); c(a): b; c$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. II. Prop. II.

Quatuor proportionalium quarta est fractio, in qua numerator est productus secundæ & tertiæ, denominator est prima.

Hypoth.

Suntque proportionales prima a , secunda b , tertia c .

Dico $a; b: c; cb(a)$.

Demonstr.

def. 29h | $a; u: c; c(a)$.

def. 28h | $u; b: c; cb$

10. b. | $c; cb: c(a); cb(a)$.

11. 5. | $u; b: c(a); cb(a)$.

p. p. | $a; b: c; cb(a)$. Quod &c. Quare &c.

Theor. I 2. Prop. I 2.

Fractiones, quarum numeratores æquales, reciproce sunt, ut denominatores.

Hy-

Hypoth.

Esto fractionum numerator communis a ; & sunt denominatores b, c .

Dico $b; c: a (c); a (b)$.

Demonstr.

def. 29b | $b; u: a; a (b)$.

def. 29b | $c; u: a; a (c)$.

def. 6.5. | $u; c: a (c); a$.

p. p. | $b; c: a (c); a (b)$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 13. Prop. 13.

DVorum productorum, quorum producentes partim communes, partim sunt non communes, primo alterum dominante, fit eadem fractio; quæ, non communium producentium, primo alterum dominante.

Hypoth.

Sunt producti $a b c, d b c$: quorum communis produciens, $b c$; non communes, a, d . Et dominante $a b c$, numeratorem $d b c$; necnon dominante a , numeratorem b , fiant fractiones $d b c (a b c), d (a)$.

Dico $d b c (a b c): d (a)$.

Demonstr.

def. 29b | $a b c; u: d b c; d b c (a b c)$.

p. p. | $a b c; d b c: u; d b c (a b c)$.

9. 4. | $a; d: a b c; d b c$.

11. 5. | $a; d: u; d b c (a b c)$.

E c 2

$a; u$

2. p. | $a; u; d; dbc (abc).$
 def. 29h | $a; u; d; d (a).$
 9. 5. | $dbc (abc): d (a). \text{ Quod \&c.}$
 Quare &c.

Theor. 13. Prop. 13.

FRactiones, quarum numeratores æquales, & denomi-
 natores arithmetice dispositi, sunt harmonicè di-
 spositæ.

Hypoth.

Esto quatuor fractionum numerator communis a , &
 sunt denominatores arithmetice dispositi b, c, d, e .

Dico $a (b), a (c), a (d), a (e)$ esse harmonicè
 dispositas.

Demonstr.

12. b. | Si differentia b, c , est defectus: ergo reci-
 procè differentia $a (b), a (c)$, est excessus: &
 est differentia d, e , defectus: & reciprocè dif-
 ferentia $a (d), a (e)$ est excessus. Quod si dif-
 ferentia b, c , est excessus: etiam differentia $d,$
 e , est excessus: & differentia $a (b), a (c)$, reci-
 procè est defectus: necnon differentia $a (d), a$
 (e) , est defectus. Quare fractionum $a (b), a (c),$
 & $a (d), a (e)$, similes sunt differentie. Est
 differentia b, c , defectus: Ergo differentia
 $a (b), a (c)$ est excessus: item differentia $a (d), a (e)$.

Hypoth. | $c - b: e - d.$

pro-

producendo per *ade*, & *abc*.

9. b.

$acde - abde; abce - abcd: ade; abc: de; bc.$

denominando communiter per *bcd*.

13. b.

$a(b) --- a(c); a(d) --- a(e): de; bc.$

8. b.

$de; bc: d; b, +e; c.$

12. b.

$d; b: a(b); a(d).$

12. b.

$e; c: a(c); a(e).$

P. P.

$de; bc: a(b); a(d), +a(c); a(e).$

11. 5.

$a(b) --- a(c); a(d) --- a(e): a(b); a(d), +a(c); a(e).$

def. 13. P.

$a(b), a(c), a(d), a(e)$ sunt harmonicè dispositæ. Quod &c.

Similiter ostendetur, si differentia *b, c*, est excessus.

Quare &c.

Theor. 15. Prop. 15.

Fractiones, quarum numeratores æquales, & denominatores, arithmeticè ordinati, sunt harmonicæ ordinatæ.

Hypoth.

Esto fractionum numerator communis *a*: & sunt denominatores arithmeticè ordinati, *b, c, d, e*.

Dico $a(b), a(c), a(d), a(e)$ esse harmonicè ordinatas.

Demonstr.

hypoth. | $b, c, d,$ sunt arithmeticè ordinati.

$b, c,$

- def. 5. b. | b, c, d , sunt arithmetice dispositi.
14. b. | $a(b), a(c), a(d)$, sunt harmonicè dispositæ.
- def. 13 b. | Differentia $a(b), a(c)$, ad similem differentiam $a(c), a(d)$, rationem habet compositam ex rationibus, $a(b)$ ad $a(c)$, & $a(c)$ ad $a(d)$: idest eandem, quam habet $a(b)$ ad $a(d)$.
- def. 18 b. | $a(b), a(c), a(d)$, sunt harmonicè ordinatæ.
- sup. | $a(c), a(d), a(e)$, sunt harmonicè ordinatæ.
- def. 19 b. | $a(b), a(c), a(d), a(e)$, sunt harmonicè ordinatæ. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 16. Prop. 16.

SI aliquot fractiones, alique totidem, communem habentes numeratorem, denominatores habuerint similiter arithmetice dispositos, erunt & ipsæ similiter harmonicè dispositæ.

Hypoth.

Sunto tres fractiones, alique tres, quarum communis numerator a : sint autem denominatores b, c, d , similiter arithmetice dispositi, atque denominatores e, f, g .

Dico $a(b), a(c), a(d)$, similiter harmonicè dispositas esse, atque $a(e), a(f), a(g)$.

Demonstr.

hypoth. | b, c, d , sunt similiter arithmetice dispositi, atque e, f, g .

$b, c, e,$

- def. 8. b. $b, c, e, f,$ sunt arithmeticè dispositi.
 $c, d, f, g,$ sunt arithmeticè dispositi.
 14. b. $a (b), a (c), a (e), a (f),$ sunt harmonicè dispositæ.
 $a (c), a (d), a (f), a (g),$ sunt harmonicè dispositæ.
 def. 16 b $a (b), a (c), a (d),$ sunt similiter harmonicè dispositæ, atque $a (e), a (f), a (g).$ Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 17. Prop. 17.

IN serie arithmetica, non maior, quàm dimidius termini proximi, non est medius.

Hypoth.

Sunto in serie arithmetica, tres termini $a, b, c.$

Dico $b,$ maiorem esse, quàm dimidium, ad $c.$

Demonstr.

- Esto $b,$ non maior, quàm dimidius ad $c,$ si potest: eritque $b,$ equalis, vel minor, quàm dimidius ad $c:$ eritque differentia $b, c,$ defectus: cuius similis differentia $a, b,$ erit defectus.
 def. 10. $b; c:$ non maior, quàm dimidius.
 hypoth. $ab:$ non maior, quàm $c.$
 19. 7. $b:$ non maior, quàm $c - b.$
 def. 10. b. $c - b; b - a.$
 $b:$ non maior, quàm $b - a.$
 $b + a:$ non maior, quàm $b.$ quod est absurdum.
 b non

$| b$ non est dimidius ad c . Quod &c.
Quare &c.

Theor. 18. Prop. 18.

IN serie harmonica, terminus non minor, quàm duplus termini proximi, non est medius.

Hypoth.

Sunto in serie harmonica tres termini a, b, c .
Dico b , minorem esse, quàm duplum, ad c .

Demonstr.

| | |
|------------|---|
| def: 18. b | Esto b , non minor, quàm duplus ad c , si potest. eritque differentia b, c , excessus: item differentia a, b , erit excessus. |
| def: 18. b | $a - b; b - c; a; c$. |
| hypoth. | $b; c$: non minor, quàm duplus. |
| 19. 7. | b : non minor, quàm $2c$.
$b - c$: non minor, quàm c . |
| 14. 5. | $a - b$: non minor, quàm a . Quod est absurdum.
b , minor est, quàm duplus ad c . Quod &c. |

Quare &c.

Theor. 19. Prop. 19.

Quælibet quantitas, & omnes eius multiplices ordinatæ, sunt in serie arithmetica naturali.

Hypoth.

Esto quantitas u , cuius multiplices ordinatæ $2u, 3u, 4u, \&c.$

Dico

Dico u , $2u$, $3u$, $4u$, & c . esse in serie arithmetica naturali.

Demonstr.

hypoth. | Omnes differentie u , $2u$, & $2u$, $3u$, & $3u$,
def. 12. b | $4u$, & reliquæ, sunt similes, & æquales ipsi ratio-
 nali u : & est u ad $2u$ dimidia. Ergo u , $2u$, $3u$,
 $4u$, & c . sunt in serie arithmetica naturali.

Quod &c.

Quare &c.

Theor. 20. Prop. 20.

Quælibet quantitas, & omnes eius submultiplices ordinatæ, sunt in serie harmonica naturali.

Hypoth.

Esto quantitas u , cuius submultiplices u (2), u (3), u (4), &c.

Dico u , u (2), u (3), u (4), &c. esse in serie harmonica naturali.

Demonstr.

19. b. | u , 2, 3, 4, &c. sunt in serie arithmetica.

15. b. | u , u (2), u (3), u (4), &c. sunt in serie harmonica.

hypoth. | u ; u (2): est dupla.

def. 20 b | u , u (2), u (3), u (4), &c. sunt in serie harmonica naturali: Quod &c.

Quare &c.

Theor. 21. Prop. 21.

IN duabus seriebus arithmetica naturalibus, termini sunt similiter proportionales, in proportione ordinata.

Hypoth.

Sint duæ series arithmeticae naturales: vna $a, 2a, 3a, 4a, \&c.$ altera $b, 2b, 3b, 4b, \&c.$

Dico $a, 2a, 3a, 4a$, esse similiter proportionales atque $b, 2b, 3b, 4b$, in proportione ordinata.

Demonstr.

def. 11. h. Defectus deinceps $a, 2a, 3a, 4a$, sunt æquales inter se; & ipsi primo termino a . item defectus deinceps $b, 2b, 3b, 4b$, sunt æquales inter se, & ipsi b .

def. 12. h. $a; 2a: b; 2b.$

2. p. $2a; 3a: 2b; 3b.$

2. p. $3a; 4a: 3b; 4b.$

def. 18. 5 $a, 2a, 3a, 4a$, sunt similiter proportionales, atque $b, 2b, 3b, 4b$, in proportione ordinata. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 22. Prop. 22.

IN duabus seriebus harmonica naturalibus, termini sunt similiter proportionales, in proportione ordinata.

Hypoth.

Sint duæ series harmonicae naturales: vna; $a, a(2), a(3), a(4)$: altera $b, b(2), b(3), b(4)$.

Dico

Dico $a, a(2), a(3), a(4)$, esse similiter proportionales, atque $b, b(2), b(3), b(4)$, in proportione ordinata.

Demonstr.

| | |
|-----------|--|
| def. 20b | $a; a(2): b; b(2)$ |
| 2. p. | $a, -- a(2); a(2): b, -- b(2); b(2)$. |
| (| . Esto, si potest, $a(2); a(3):$ maior, quàm $b(2); b(3)$. |
| 4. 3. | $a(2); a(2) -- a(3):$ minor, quàm $b(2); b(2) -- b(2)$. |
| p. 3. | $a, -- a(2); a(2) -- a(3):$ minor quàm $b, -- b(2); b(2) -- b(3)$. |
| def. 18b | $a, -- a(2); a(2) -- a(3): a; a(3)$. |
| def. 18b | $b, -- b(2); b(2) -- b(3): b; b(3)$. |
| p. 3. | $a; a(3):$ minor, quàm $b; b(3)$. |
| def. 20b | $a(2); a: b(2); b$. |
| p. 3. | $a(2); a(3):$ minor, quàm $b(2); b(3)$. contra suppositum. |
| | $a(2); a(3): b(2); b(3)$. |
| sup. | $a(3); a(4): b(3); b(4)$. |
| def. 18.5 | $a, a(2), a(3), a(4)$ sunt similiter proportionales, atque $b, b(2), b(3), b(4)$ in proportione ordinata. Quod &c. Quare &c. |

Theor. 23, Prop. 23.

DVarum serierum naturalium arithmetice, & harmonicè, inter æqueordinatos terminos, medij pro-

portionales sunt æquales.

Hypoth.

Sint duæ series naturales: vna arithmetica, ab a ; altera harmonica, à b . & sint quarti termini; in arithmetica, $4a$; in harmonica, $b(4)$. sit autem inter a , b , media proportionalis c .

Dico c , mediam proportionalem esse, inter $4a$, & $b(4)$.

Demonstr.

19. *b.* | Quoniam $4a$, $b(4)$, sunt quarti termini, in
20. *b.* | suis seriebus: $4a$ ad a , est quadruplus: & $b(4)$ ad
 b subquadruplus.

$4a$; a : b ; $b(4)$.

hypoth. | a ; c : c ; b .

p. p. | $4a$; c : c ; $b(4)$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 24. Prop. 24.

IN serie arithmetica duo termini, cum æqueordinatis in harmonica, sunt reciprocè proportionales.

Hypoth.

Sint in serie arithmetica duo termini $3a$, $4a$: & in harmonica duo æqueordinati $b(3)$, $b(4)$.

Dico $3a$; $4a$: $b(4)$; $b(3)$.

Prepar.

Assumatur inter æqueordinatos $3a$, & $b(3)$, medius proportionalis c .

De-

Demonstr.

constr. | $3a; c; c; b (3).$
 23. *b.* | $4a; c; c; b (4).$
 2. *p.* | $c; 4a; b (4); c.$
p. p. | $3a; 4a; b (4); b (3).$ Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 25. Prop. 25.

Series naturales, arithmetica, & harmonica, plures terminos habent, quàm quot quisque dixerit, & cuiusq; numerosæ rationis.

Demonstr.

20. *g.* | Nam numeri plures sunt, quàm quot quisque
 19. *b.* | dixerit, secundum quos accepti multiplices ad
 20. *b.* | primum terminum in serie arithmetica, & sub-
 multiplices ad primum in harmonica, sunt plures
 termini, quàm quot quisque dixerit.

Quod si multiplices accepti fuerint, secundum
 21. *b.* | numeros numerosæ rationis: erunt in arithmeti-
 ca serie termini, eandem numerosam habentes
 rationem. item si accepti fuerint submultiplices:
 24. *b.* | erunt in harmonica, termini, eandem reciprocè
 numerosam habentes rationem.

Deinde numeri bini, eandem numerosam ha-
 bentes rationem, minimi omnium, & minimorum
 26. *g.* | æquemultiplices numeri, secundum plures, quàm
 quot quisque dixerit numeros, possunt accipi: se-

sup. | cundum quos acceptos binos numeros, termini
multiplices in arithmetica, & submultiplices in
harmonica, possunt accipi bini plures, quàm quot
quisque dixerit, eandem numerosam habentes
rationem.

Quare &c.

Theor. 26. Prop. 26.

IN serie arithmetica naturali ab vnitare, termini sunt,
vnitas, & omnes numeri ordinatim accepti,

Demonstr.

19. b. | Nam in serie arithmetica naturali ab vnitare,
omnes termini sunt, ipsa vnitas, & omnes mul-
tiplices ad vnitatem, ordinatim accepti: sed nu-
meri sunt multiplices ad vnitatem, & eorum ordo,
est idem multiplicium. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 27. Prop. 27.

IN serie harmonica naturali à rationali, termini sunt, ipsa
rationalis, & fractiones, pro communi numeratore,
habentes rationalem, & pro denominatoribus, habentes
ordinatim omnes numeros.

Demonstr.

20. b. | Nam in serie harmonica naturali à rationali,
termini sunt, ipsa rationalis, & omnes eius sub-
def. 29b | multiplices ordinatim accepti. Sed fractiones,

in

in quibus ipsa rationalis est numerator communis, & omnes numeri sunt denominatores, ipsæ sunt submultiplices ad rationalem; & earum ordo, est idem ordo numerorum, per quos ipsæ submultiplices ordinantur. Ergo &c,

Quare &c.

Theor. 28. Prop. 28.

SI fuerint duæ series totidem terminorum; & inter primos, idem fuerit medius proportionalis, qui inter secundos, inter tertios, & deinceps inter æqueordinatos: siquidem in prima serie, sunt quatuor arithmeticè dispositi; in secunda serie, sunt quatuor harmonicè dispositi.

Hypoth.

Sint in prima serie, quatuor arithmeticè ordinati, $a, a + b, c, c + b$: sit medius d : & sint in altera serie ordinati $d_2 (a), d_2 (a + b), d_2 (c), d_2 (c + b)$.

Dico $d_2 (a), d_2 (a + b), d_2 (c), d_2 (c + b)$ esse harmonicè dispositos.

Demonstr.

hypoth. | Quoniam a ad d , est vt d ad $d_2 (a)$;
 | idest quatuor proportionalium prima quantitas
 11. h. | est a , secunda & tertia est d : ergo quarta est fra-
 | ctio, cuius numerator, secunda potestas d ; deno-
 | minator, prima quantitas a . Similiter ostende-
 | tur quod $d_2 (a + b)$, est secunda potestas d , de-
 | nominata per $a + b$: & $d_2 (c)$, secunda pote-
 | testas d , denominata per c : & denique d_2
 | $(c + b)$,

($c+b$), secunda potestas d , denominata per $c+b$.
 Ergo $d_2(a)$, $d_2(a+b)$, $d_2(c)$, $d_2(c+b)$, sunt
 quatuor fractiones: quarum numerator commu-
 nis, secunda potestas d ; denominatores verò,
 sunt quatuor arithmetice dispositi, a , $a+b$, c , c
 14. b. $+d$. Ergo $d_2(a)$, $d_2(a+b)$, $d_2(c)$, $d_2(c+b)$,
 sunt harmonicè dispositæ. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 29. Propos. 29.

QVorum productorum quidam sunt communes, qui-
 dam non communes producentes, aggregatum, est
 productus producentium communium, & aggrega-
 ti producentium non communium.

Hypoth.

Duorum productorum ab , ac , communis produ-
 cens esto a : non communes sunt b , c ; quorum sum-
 ma d .

Dico $ab+ac: ad$.

Demonstr.

| | |
|---------|---|
| 9. b. | $ab; ac: b; c.$ |
| 2. p. | $ab+ac; ac: b+c; c.$ |
| hypoth. | $b+c: d.$ |
| 7. 5. | $ab+ac; ac: d; c.$ |
| 9. h. | $ad; ac: d; c.$ |
| 11. 5. | $ab+ac; ac: ad; ac.$ |
| 9. 5. | $ab+ac: ad. \text{ Quod \&c. Quare \&c.}$ |

Theor. 30. Prop. 30.

Quorum productorum quidam sunt communes, quidam non communes, & inæquales producentes, differentia, est productus producentis communis, & differentiarum producentium non communium.

Hypoth.

Duorum productorum ab, ac , communis produzens esto a , non communes sunt b, c . & esto b maior, quam c ; quorum differentia d .

Dico $ab - ac = ad$

Propos.

- 9. b. | $ab; ac; b; c.$
- 2. p. | $ab - ac; d; b - c; c.$
- hypoth. | $b - c; d$
- 7. 5. | $ab - ac; ac; d; c.$
- 9. b. | $ad; ac; d; c.$
- 11. 5. | $ab - ac; ad.$

Quod &c.

Quare &c.

Theor. 31. Prop. 31.

Quatuor proportionalium productus extremorum, est æqualis producto mediõrum.

Hypoth.

Sunt proportionales $a; b; c; d.$

Dico $ad = bc.$

Prepar.

Affirmatur productus alternorum $ac.$

Gg

De-

Demonstr.

9. h. | $ac; ad: c; d.$
 9. h. | $ac; bc: a; b.$
 hypoth. | $a; b: c; d.$
 11. 5. | $ac; ad: ac; bc.$
 9. 5. | $ad: bc. \text{ Quod \&c.}$
 Quare &c.

Theor. 32. Prop. 32.

Quatuor termini, quorum extremorum productus est æqualis producto mediorum, sunt proportionales.

Hypoth.

Quatuor terminorum a, b, c, d , productus extremorum ad , & productus mediorum bc , sunt æquales.

Dico $a; b: c; d.$ *Prepar.*Assumatur productus extremorum $ac.$ *Demonstr.*

7. 5. | $ac; bc: ac; ad.$
 9. h. | $ac; bc: a; b.$
 9. h. | $ac; ad: c; d.$
 11. 5. | $a; b: c; d. \text{ Quod \&c.}$
 Quare &c.

Theor. 33. Prop. 33.

SI fuerint duæ series eisdem terminorum; & inter primos idem fuerit medius proportionalis, qui inter secundum-

cundos, inter tertios, & deinceps inter equeordinatos : si-
quidem in prima serie, sunt quatuor harmonicè dispositi ;
in secunda serie, sunt quatuor arithmeticè dispositi.

Hypoth.

Sint in prima serie quatuor harmonicè ordinati $a, b, c,$
 d : & sit medius e : & sint in altera serie ordinati $e_2(a), e_2-$
 $(b), e_2(c), e_2(d)$.

Dico $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$, esse arithmeticè
dispositos.

Demonstr.

| | |
|--------------|--|
| def. 13. b | $a - b_3, c - d_3, a_3, c_3 + b_3, d_{11}$ |
| 8. b. | $ab_3, cd_3, a_3, c_3 + b_3, d_3$ |
| 23, 5. | $a - b_3, c - d_3, ab_3, cd_3$ |
| 30. c | $acd - bcd, abc - abd.$ |
| 31. b. | adhibito communi producente e_2 |
| 9. b. | $e_2acd - e_2bcd, e_2abc - e_2abd.$ |
| | communiter denominando per $abcd.$ |
| 10. c 13. b. | $e_2(b) - e_2(a), e_2(d) - e_2(c).$ |
| def. 5. b. | $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$, sunt arithmeticè
dispositi. Quod &c. |

Quare &c.

Theor. 34. Prop. 34.

Quatuor termini harmonicè dispositi, permutando,
sunt harmonicè dispositi.

Hypoth.

Sint quatuor termini a, b, c, d , harmonicè dispositi.

G g 2

Dico

Demonstr.

9. h. | ac; ad; c; d.
 9. b. | ac; bc; a; b.
 hypoth. | a; b; c; d.
 11. 5. | ac; ad; ac; bc.
 9. 5. | ad; bc. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 32. Prop. 32.

Quatuor termini, quorum extremorum productus est æqualis producto mediorum, sunt proportionales.

Hypoth.

Quatuor terminorum a, b, c, d , productus extremorum ad , & productus mediorum bc , sunt æquales.

Dico $a; b: c; d$.

Prepar.

Assumatur productus extremorum ad .

Demonstr.

7. 5. | ac; bc; ac; ad.
 9. b. | ac; bc; a; b.
 9. b. | ac; ad; c; d.
 11. 5. | a; b; c; d. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 33. Prop. 33.

SI fuerint duæ series eisdem terminorum; & inter primos idem fuerit medius proportionalis, qui inter secundos

cundos, inter tertios, & deinceps inter æque coordinatos : si-
quidem in prima serie, sunt quatuor harmonicè dispositi;
in secunda serie, sunt quatuor arithmeticè dispositi.

Hypoth.

Sint in prima serie quatuor harmonicè ordinati a, b, c, d :
Et sit medius e : & sint in altera serie ordinati $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$.

Dico $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$, esse arithmeticè dispositos.

Demonstr.

| | |
|---------------|---|
| def. 13. b. | $a - b; c - d; a_2, c_2 + b_2, d_2$ |
| 8. b. | $ab; cd; a; c_2 + b_2, d$ |
| 11. 5. | $a - b; c - d; ab; cd$ |
| 30. e. | $acd - bcd; abc - abd$ |
| 31. b. | adhibito communi producente e_2 |
| 9. b. | $e_2acd - e_2bcd; e_2abc - e_2abd$ |
| | communiter denominando per $abcd$ |
| 10. e. 13. b. | $e_2(b) - e_2(a); e_2(d) - e_2(c)$ |
| def. 5. b. | $e_2(a), e_2(b), e_2(c), e_2(d)$, sunt arithmeticè dispositi. Quod &c. |

Quare &c.

Theor. 34. Prop. 34.

Quatuor termini harmonicè dispositi, permutando, sunt harmonicè dispositi.

Hypoth.

Sint quatuor termini a, b, c, d , harmonicè dispositi.

G g 2

Dico

Dico permutando a, c, b, d esse harmonicè dispositos.

Prepar.

Assumatur quælibet quantitas e , & fiat

$a; e; e; f.$

$b; e; e; g.$

$c; e; e; h.$

$d; e; e; l.$

Demonstr.

hypoth. | a, b, c, d sunt harmonicè dispositi.

33. *b.* | f, g, h, l sunt arithmeticè dispositi.

4. *b.* | f, h, g, l sunt arithmeticè dispositi.

28. *b.* | a, c, b, d sunt harmonicè dispositi. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 35. *Prop.* 35.

SI fuerint aliquot quantitates in una serie, similiter harmonicæ dispositæ, atque alia totidem, in altera: erunt ex æqualitate harmonica, prima & ultima, in vna serie, item prima & ultima, in altera, dispositæ harmonicè.

Hypoth.

Sint a, b, c similiter harmonicè dispositæ, atque aliæ totidem d, e, f .

Dico ex æqualitate harmonica, esse dispositas harmonicè, a, c , & d, f .

Prepar.

Assumatur quælibet quantitas g . & fiat

a; g: g; h
 b; g: g; k
 c; g: g; l
 d; g: g; m
 e; g: g; n
 f; g: g; o.

Demonstr.

def.16b | a, b, d, e sunt harmonicè dispositæ.
 33. b. | h, k, m, n sunt arithmeticè dispositæ.
 def.16b | b, c, e, f sunt harmonicè dispositæ.
 33. m. | k, l, n, o sunt arithmeticè dispositæ.
 def.8.b. | h, k, l sunt similiter arithmeticè dispositæ, at-
 que m, n, o.
 5. b. | h, l, m, o sunt arithmeticè dispositæ.
 28. b. | a, c, d, f sunt harmonicè dispositæ. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 36. Prop. 36.

Harmonicè dispositarum æquesubmultiplices, sunt harmonicè dispositæ.

Hypoth.

Sint harmonicè dispositæ a, b, c, d: quarum æque submultiplices a(3), b(3), c(3), d(3).

Dico a(3), b(3), c(3), d(3) esse harmonicè dispositas.

Prepar.

Assumatur quælibet quantitas e. & fiat :

a; e:

$a; e; e; f$

$b; e; e; g$

$c; e; e; h$

$d; e; e; t$

Et quotuplices sunt a, b, c, d ad $a(3), b(3), c(3), d(3)$, totuplices accipiantur ipsarum f, g, h, t , quæ sint $3f, 3g, 3h, 3t$.

Demonstr.

| | |
|----------------|---|
| <i>hypoth.</i> | a, b, c, d sunt harmonicè dispositæ, |
| <i>33. h.</i> | f, g, h, t sunt arithmeticè dispositæ. |
| <i>6. h.</i> | $3f, 3g, 3h, 3t$ sunt arithmeticè dispositæ. |
| <i>prepar.</i> | $a(3); a: f; 3f.$ |
| <i>prepar.</i> | $a; e; e; f.$ |
| <i>p. p.</i> | $a(3); e: e; 3f.$ |
| <i>sup.</i> | $b(3); e: e; 3g.$ |
| <i>sup.</i> | $c(3); e: e; 3h.$ |
| <i>sup.</i> | $d(3); e: e; 3t.$ |
| <i>28. h.</i> | $a(3), b(3), c(3), d(3)$ sunt harmonicè dispositæ. Quod &c. |

Quare &c.

Theor. 37. Prop. 37.

SI fuerint aliquot primæ quantitates, arithmeticè similiter dispositæ, atque aliæ totidem secundæ, utræque in vna serie: fuerint autem & aliæ totidem quantitates primæ, aliæque totidem secundæ in altera: & fuerit vna eadem quantitas media proportionalis inter primas primarum, & in-

& inter secundas primarum, & deinceps inter æqueordinatas; item inter primas secundarum, & inter secundas, & deinceps inter æqueordinatas: erunt in secunda serie primæ similiter harmonicè ordinatæ, atque secundæ.

Demonstr.

def. 3. h. Quoniam enim primarum in prima serie prima, & secunda; & secundarum in prima serie prima, & secunda, sunt arithmeticè dispositæ: constat, quod etiam in secunda serie primarum prima, & secunda; & secundarum prima, & secunda, sunt harmonicè dispositæ. constat similiter, quod in secunda serie, primarum secunda, & tertia; & secundarum secunda, & tertia sunt harmonicè dispositæ. Et ita deinceps vsque ad vltimas primarum, & secundarum. Quare primæ in secunda serie, sunt similiter harmonicè ordinatæ, atque secundæ.

def. 16. h.

Theor. 38. Prop. 38.

SI fuerint aliquot primæ quantitates harmonicè similiter dispositæ, atque aliæ totidem secundæ, vtræque in vna serie fuerint autem & aliæ totidem quantitates primæ, aliæque totidem secundæ, in altera serie: & fuerit vna eadem quantitas media proportionalis inter primas primarum, & inter secundas primarum, & deinceps inter æqueordinatas; necnon media proportionalis inter primas secundarum, & inter secundas secundarum, & deinceps

ceps inter æque ordinatas: erunt in altera serie, primæ similiter arithmetice dispositæ, atque secundæ.

Demonst.

def. 16b | Quoniam enim primarum in prima serie, prima & secunda, & secundarum in prima serie, prima & secunda, sunt harmonicè dispositæ: constat, quod & in secunda serie, primarum prima & secunda, & secundarum prima & secunda, sunt arithmetice dispositæ: item ostendetur, quod primarum in secunda serie secunda, & tertia, & secundarum secunda & tertia, sunt arithmetice dispositæ. & sic deinceps vsque ad ultimas primarum, & secundarum. Quare primæ in secunda serie, sunt similiter arithmetice dispositæ, atque secundæ.

def. 8. b. |

Theor. 39 Prop. 39.

Inter duas quantitates media proportionalis, eadem est etiam inter submultiplicem unius, & æquemultiplicem alterius.

Hypoth.

Esto inter duas a, b , media proportionales c : & esto ipse a , submultiplex $a(3)$; & ipse b , æquemultiplex $3b$.

Dico $a(3)$; c ; $3b$.

Demonstr.

hypoth. | $a(3)$; a ; b ; $3b$.

hypoth. | a ; c ; c ; b .

p. p. | $a(3)$; c ; c ; $3b$.

Quod &c. Quare &c.

Theor. 40. Prop. 40.

IN serie harmonica naturali, aliquoteni ab vno, & aliquoteni ab altero, per numeros alterutrorum multitudinis terminorum submultiplicati; sicut primi quotientes, similiter secundi, sunt harmonicè dispositi: item tertij, & quarti, & sic deinceps.

Hypoth.

Sint in serie harmonica naturali duo termini a, b : & ab a , sumantur terni subquadrupli; & à b , quaterni subtripli.

Dico primos ternos subquadruplos ab a , & primos subtriplos à b , similiter esse dispositos harmonicè; atque secundos subquadruplos ternos ab a , & secundos subtriplos quaternos à b .

Præpar.

Ordinetur series arithmetica naturalis: in qua sint, c æqueordinatus, atque a ; & d æqueordinatus, atque b . sumanturque quadrupli terni à c , & tripli quaterni à d . sumatur etiam inter a , & c medius proportionalis e .

Demonstr.

constr. | Quoniam e , medius proportionalis est inter a ,
 23. b . | c : medius etiam proportionalis est inter b , d ; &
 39. b . | inter æqueordinatos terminos in vtraque serie naturali arithmetica, & harmonica. item est medius proportionalis inter multiples terminorum arithmetice seriei naturalis, & inter æque submultiplices terminorum harmonicæ. sed quadrupli terni à c , & tripli quaterni à d , primi, sunt similiter

Hh

ari-

ceps inter æque ordinatas: erunt in altera serie, primæ si-
militer arithmetice dispositæ, atque secundæ.

Demonst.

def. 16b | Quoniam enim primarum in prima serie, pri-
ma & secunda, & secundarum in prima serie, pri-
53. p. 3 | ma & secunda, sunt harmonicè dispositæ: constat,
quod & in secunda serie, primarum prima & se-
cunda, & secundarum prima & secunda, sunt arith-
metice dispositæ. item ostendetur, quod pri-
marum in secunda serie secunda, & tertia, & secun-
darum secunda & tertia, sunt arithmetice dispo-
sitæ. & sic deinceps vsque ad ultimas primarum,
def. 8. b. | & secundarum. Quare primæ in secunda serie,
sunt similiter arithmetice dispositæ, atque secunde.

Theor. 39. Prop. 39.

Inter duas quantitates media proportionalis, eadem
est etiam inter submultiplicem vnius, & æquemultiplicem
alterius.

Hypoth.

Esto inter duas a, b , media proportionales c : & est
ipsum a , submultiplex $a(3)$; & ipsum b , æquemultiplex

Dico $a(3)$; c : c $3b$.

Demonstr.

hypoth. | $a(3)$; a : b ; $3b$.

hypoth. | a ; c : c ; b .

p. p. | $a(3)$; c : c $3b$. Quod &c. Quare &

IN serie harmonica naturali, aliquoteni ab vno, & aliquoteni ab altero, per numeros alterutrorum multitudinis terminorum submultiplicati; sicut primi quotientes, similiter secundi, sunt harmonicè dispositi: item tertij, & quarti, & sic deinceps.

Hypoth.

Sint in serie harmonica naturali duo termini a, b : & ab a , sumantur terni subquadrupli; & à b , quaterni subtripli.

Dico primos subquadruplos ab a , & primos subtriplos ab b , esse dispositos harmonicè; atque secundos subquadruplos ab a , & secundos subtriplos ab b .

repar.

metica n... in qua sint, c
 d æq... us, atque b . fu-
à c , quaterni à d . fu-
mediu... tionalis e .

Demo

ed... onalis est inter a ,
ro... est inter b, d ; &
at... in vtraque serie na-
ca. item est medius
lices terminorum ari-
& inter æque submulti-
onica. sed quod
à d , pri-
Hh

Theor. 44. Prop. 44.

Qualibet quantitate, à se ipsa, & à suis deinceps per ordinem multiplicibus, denominata; fit series harmonica naturalis.

Hypoth.

Esto quælibet quantitas a , eiusque multiples $2a$, $3a$, $4a$, & deinceps.

Dico $a(a)$, $a(2a)$, $a(3a)$, $a(4a)$, & deinceps esse seriem harmonicam naturalem.

Prepar.

Esto rationalis u : & à rationali ordinetur series harmonica naturalis u , $u(2)$, $u(3)$, $u(4)$, & deinceps.

Demonstr.

def. 29^b | a ; u : a ; $a(a)$.

9. 5. | u : $a(a)$.

12. h. | $a(a)$; $a(2a)$: $2a$; a ; u ; $u(2)$ dupla.

9. 5. | $a(2a)$: $u(2)$.

sup. | $a(3a)$: $u(3)$.

sup. | $a(4a)$: $u(4)$.


def. 20^b | $a(a)$, $a(2a)$, $a(3a)$, $a(4a)$, est series harmonica naturalis. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 45. Prop. 45.

SI fuerint duo prologarithmi, ex terminis ab unitate; alter, ex quocunque terminis; alter, ex totidem, & vno amplius: erit qui ex pluribus, eo qui ex paucioribus, perspectè maior.

Hy-



maior quàm eh : & sic deinceps. Item similiter nk , vnitate maior, quàm ik : & mk , binario maior, quàm ht : & lk , ternario maior, quàm gk . Quare fl , gm , hm , & deinceps, sunt vnitates, binarius, ternarius, & deinceps: item in , hm , gl , sunt vnitates, binarius, ternarius, & deinceps. Est ergo ef , vnitatem maior, quàm lg ; & lg , vnitatem maior, quàm mh ; & mh , vnitatem maior, quàm ni ; & ni , est vnitatem.

3. b. Cum itaque tres sint quantitates inæquales ef , el , eg , quarum ef minima, el media, eg maxima. si lg , vnitatem aucta, denominetur ab ef ; & fl , ab eg : fiunt duæ fractiones, quarum summa, maior est, quàm fg vnitatem aucta, denominata ab el . Sed lg , vnitatem aucta, est ef ; & fg , vnitatem aucta, est el : ergo

$ef(ef) \rightarrow fl(eg)$: maior est, quàm $el(el)$.

Similiter ostendetur,

$lg(eg) \rightarrow gm(eh)$: maior, quàm $lm(em)$.

Et $ml(eh) \rightarrow hn(ei)$: maior, quàm $mn(en)$.

43. b. Deinde, cum duo sint inæquales numeri, ei , ek ; quorum minor ei , maior ek , differentia ik : fitque vnitatem ni : & differentia ik , vnitatem aucta, fit nk . ergo

44. b. $ni(ei) + ik(ek)$: maior est, quàm $nK(eK)$.
Sed $ef(ef)$, $fl+lg(eg)$, $gm+mh(eh)$, $hm+ni(ei)$,

(*ei*), *iK* (*eK*) sunt termini componentes prologarithmum *C*. nam *ef*, *fl+lg*, *gm+mh*, *hn+ni*, *iK*, sunt numeratores æquales ipsi *b*, quos denominant; *ef*, *eg*, *eh*, *ei*, *eK*, nempe simplex *b*, duplex, triplex, & deinceps multiples.

Eadem ratione constat, quod *el* (*el*), *lm* (*em*), *mn* (*em*), *niK* (*eK*) sunt termini componentes prologarithmum *A*.

defash Ergo *C*, respectè maior est, quàm *A*. Quod &c. Quare &c.

Theor. 46. Prop. 46.

SI duorum inæqualium numerorum differentia; denominetur à minore; unitas verò, à maiore: fiunt duæ fractiones; quarum summa, minor est, quàm differentia, unitate aucta, denominata à minore.

Hypoth.

Sunt duo inæquales numeri *a*, *a+b*.

Dico *b(a)+1(a+b)*: minorem esse, quàm *b+1(a)*.

Demonstr.

12. *b.* | *1(a+b)*; *1(a)*: *a*; *a+b*.

| *1(a+b)*: minor, quàm *1(a)*.

| addito communi *b(a)*.

41. *b.* | *b(a)+1(a+b)*: minor, quàm *b+1(a)*. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 47. Prop. 47.

SI fuerint prologarithmi ex duobus terminis à secundo, ex tribus à tertio, ex quatuor à quarto, & sic deinceps: qui ex pluribus, perspectè minor est, quàm, qui ex paucioribus vno.

Hypoth.

Sint duo prologarithmi; alter A , ex terminis ab $1(b)$; & ex tot terminis, quotus est b ; alter C , ex terminis ab $1(d)$, & ex tot terminis, quotus est d : & esto b , vnitatem minor, quàm d .

Constat, quod $1(b)$, totus ordine est, quotus, est b : & $1(d)$, totus ordine, quotus est d . prop. 27. h.

Dico C , perspectè minorem esse, quàm A .

Prepar.

$e \text{---} 20 \text{---} f \dots \dots \dots m \dots \dots \dots n \dots \dots \dots o \dots \dots \dots l$
 $\phantom{e \text{---} 20 \text{---} f} g h i k l$

Sumatur productus bd , qui sit ef : eique adijciantur tot b , quotus est d , qui sint fg, gh, hi, ik, kl : eidemque ef , tot d adijciantur, quotus est b , qui sint fm, mn, no, ol .

Demonstr.

16. 7. | Quoniam productus b per d , & productus d
 | per b , sunt æquales: summa numerorum $fg, gh,$
 | hi, ik, kl , summæ fm, mn, no, ol , est æqua-
 | lis: estque idem numerus fl . Et quoniam $fg, gh,$
 | hi, ik, kl , sunt æquales: ergo $fg, fh, fi, fk,$
 | fl , sunt simplex b , duplex, triplex, & reliqui deinceps

inceps multiplices. Item quoniam *fm*, *mn*, *no*, *ol*, sunt æquales: ergo *fm*, *fn*, *fo*, *fl*, sunt simplex *d*, duplex, triplex, & reliqui deinceps multiplices. Sed *ef*, ad *b* totuplex est, quotus est $d+1$: & *eh*, quotus est $d+2$: ideoque *ef*, *eg*, *eh*, *ei*, *eK*, sunt totuplices ad *b*, quoti sunt d , $d+1$, $d+2$, $d+3$, $d+4$. Item cum sit *ef*, ad *d* totuplex, quotus est *b*: erunt *ef*, *em*, *en*, *eo*, totuplices ad *d*, quoti sunt *b*, $b+1$, $b+2$, $b+3$.

Deinde quoniam *d*, vnitate maior est, quàm *b*: ergo $2d$, binario maior est, quàm $2b$: & $3d$, ternario maior, quàm $3b$; & sic deinceps, & similiter *fm*, vnitate maior, quàm *fg*; & *fn*, binario maior, quàm *fh*; & *fo*, ternario maior, quàm *fi*; & sic deinceps. item similiter *ol*, vnitate maior, quàm *Kl*; & *nl*, binario maior, quàm *il*; & *ml*, ternario maior, quàm *hl*. Quare *gm*, *hm*, *io*, sunt vnitas, binarius, ternarius, & deinceps: item *oK*, *ni*, *mh*, sunt vnitas, binarius, ternarius, & deinceps. Ergo *gm*, auctus vnitate, est *hm*; & *hm*, auctus vnitate, est *io*; & *io*, auctus vnitate, est *iK*, vel *b*.

Itaque sunt inæquales, & minores primùm, deinde maiores hoc ordine, *ef*, *eg*, *em*, *eh*, *en*, *ei*, *eo*, *eK*: quorum minimus *ef*, est productus *bd*: & differentia *ef*, *eg*, est *fg*, nempe *b*: est autem *bd* ad *b2*, sicut *d* ad *b*, maior: ergo minimus *ef*, non est minor, quàm secunda potestas differentiæ *ef*, *eg*. ideoque neque *eg*, minor est, quàm secunda potestas differentiæ *eg*, *eh*.

37. h. | arithmetice dispositi, atque secundi; item, atque
 | tertij, atque quarti, & deinceps. Ergo etiam sub-
 | quadrupli terni ab a , & subtriplici quaterni à b , pri-
 | mi, sunt similiter harmonice dispositi, atque se-
 | cundi; item, atque tertij, atque quarti, & deinceps.
 | Quod &c.

Quare &c.

Theor. 41. Propos. 41.

Summa fractionum communem habentium denomi-
 natorem, est summa numeratorum, ab eodem deno-
 minatore denominata.

Hypoth.

Fractiones $a(b)$, $c(b)$ communem habent denomi-
 natorem: numeratorum summa est $a+c$.

Dico $a(b) + c(b) : a+c(b)$:

Demonstr.

10. h. | $a(b)$; $c(b)$: a ; c
 2. p. | $a(b) + c(b)$; $c(b)$: $a+c$; c
 10. h. | $a+c(b)$; $c(b)$: $a+c$; c
 11. 5. | $a(b) + c(b)$; $c(b)$: $a+c(b)$; $c(b)$
 9. 5. | $a(b) + c(b)$: $a+c(b)$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 42. Prop. 42.

Differentia fractionum communem habentium deno-
 minatorem, est differentia numeratorum, ab eo-
 dem

dem denominatore denominata .

Hypoth.

Fractiones $a(b)$, $c(b)$, communem habent denomi-
natozem b : differentia numeratorum est $a---c$.

Dico $a(b)---c(b)$: $a---c(b)$.

Demonstr.

- | | | |
|--------|--|--|
| 10. b. | | $a(b)$; $c(b)$: a ; c . |
| 2. p. | | $a(b)---c(b)$; $c(b)$: $a---c$; c . |
| 10. b. | | $a---c(b)$; $c(b)$: $a---c$; c . |
| 11. 5. | | $a(b)---c(b)$; $c(b)$: $a---c(b)$; $c(b)$. |
| 9. 5. | | $a(b)---c(b)$: $a---c(b)$. Quod &c. |
- Quare &c.

Theor. 43. Prop. 43.

DVorum inæqualium numerorum, vnitas denomina-
ta à minore, & differentia denominata à maiore,
sunt fractiones duæ, quarum summa est maior, quàm dif-
ferentia eorundem, aucta vnitate, denominata à maiore.

Hypoth.

Sunto duo inæquales numeri, minor a , maior $a+b$.

Dico $1(a) + b(a+b)$: maiorem esse, quàm $b + 1(a+b)$.

Demonstr.

- | | | |
|--------|--|--|
| 12. b. | | $1(a)$; $1(a+b)$: $a+b$; a . |
| | | $1(a)$: maior quàm $1(a+b)$. |
| | | communiter addatur $b(a+b)$. |
| 41. b. | | $1(a) + b(a+b)$: maior est, quàm $b + 1(a+b)$. |
| | | Quod &c. Quare &c. |

Præpar.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | n | K | t | u | x | |
| f | g | h | i | o | p | q | r |

Sumatur numerus b toties, quotus est d : & sint sumpti numeri ef , fg , gh , hi , iK . item numerus d toties, quotus est b : & sint sumpti numeri el , lm , mn , nK . Sumatur iterum b toties, quotus est d : & sint sumpti numeri Ko , op , pq , qr , rs . & iterum d , sumatur toties, quotus est b : & sint sumpti numeri Kt , tu , ux , xs .

Demonstr.

16. 7. | Quoniam productus b per d , est æqualis producto d per b : summa numerorum ef , fg , gh , hi , iK , summæ numerorum el , lm , mn , nK , est æqualis: & summa numerorum Ko , op , pq , qr , rs , summæ Kt , tu , ux , xs , est æqualis. Sunt autem & singulæ partes ek , singulis Ks partibus æquales; & omnes, omnibus: & ef , el , eg , em , eh , en , ei , ek , ipsis ko , kt , kp , ku , kq , kx , kr , ks ; singuli numeri, singulis æquales; & eorum differentia æquales, & similes: atque omnes ordinatim accepti, vt supra, vsque ad k , similiter arithmetice sunt dispositi, atque omnes reliqui, vsque ad
- def. 8. b. | s. Et sicut demonstratum est, quòd :
45. b. | $ef(ef) + fl(eg)$: maior est, quàm $el(el)$.
3. b. | $lg(eg) + gm(eh)$: maior, quàm $lm(em)$.
3. b. | $mh(eh) + hn(ei)$: maior, quàm $mn(en)$.

43. b. *ni (ei) + ik (ek)*: maior, quàm *nk (ek)*.
ita in præfenti demonstrabitur, eodem profusus
argumento, quòd

3. b. *ko (eo) + ot (ep)*: maior est, quàm *ks (et)*.

3. b. *tp (ep) + pu (eq)*: maior, quàm *tu (eu)*.

3. b. *uq (eq) + qx (er)*: maior, quàm *ux (ex)*.

43. b. *xr (er) + rs (es)*: maior, quàm *xs (es)*.

45. b. Item sicut demonstratum est, quòd

ef (ef), *fl + lg (eg)*, *gm + mh (eh)*, *hn + ni (ei)*,
ik (ek), sunt termini componentes primum pro-
logarithmum seriei C: & quòd *el (el)*, *ln (em)*,
mn (en), *nK (ek)*, sunt componentes primum se-
riei A. ita demonstrabitur in præfenti, quòd

Ko (eo), *ot + tp (ep)*, *pu + uq (eq)*, *qx + xr (er)*, *rs +*
(es), sunt termini componentes prologarithmum
secundum seriei C: & quòd *Kt (et)*, *tu (eu)*, *ux (ex)*,
xs (es), sunt componentes secundum prologa-
rithmum seriei A.

45. b. Et omninò sicut ostensum est, quòd primus se-
riei C, est perspectè maior, primo seriei A: ita
def. 8. b. demonstrabitur, quòd secundus seriei C, est per-
spectè maior secundo seriei A. Quod &c.

Similiter ostendetur, quòd & tertius tertio, & quartus
quarto, sunt perspectè maiores: & quòd quisque prolo-
garithmus seriei C, perspectè maior est, æqueordinato
prologarithmo seriei A.

Quare &c.

Theor. 49. Prop. 49.

SI fuerint series prologarithmorum, ex binis à secundo, ex ternis à tertio, ex quaternis à quarto, & sic deinceps: secundus prologarithmus eius, quæ ex pluribus, perspectè minor est, quàm secundus eius, quæ ex paucioribus vno: & tertius, perspectè minor, quàm tertius: & quartus, quàm quartus: & sic deinceps vnusquisque perspectè est minor, quàm suus æqueordinatus prologarithmus.

Hypoth.

Sint duæ series prologarithmorum: altera *A*, ex terminis ab $1(b)$, & ex totenis, quotus est b : altera *C*, ex terminis ab $1(d)$, & ex totenis, quotus est d . & esto b , vni-
tate minor, quàm d .

Constat, quòd $1(b)$ totus est ordine, quotus b : & $1(d)$, totus ordine, quotus d . *prop. 27. h.*

Dico secundum prologarithmum seriei *C*, perspectè minorem esse, secundo seriei *A*.

Prepar.

e---2o---f.....m n o.....q s u
g h i K l.....p r t x

Sumatur productus bd , qui sit ef : eique adijciantur tot b , quotus est d , qui sint fg, gh, hi, iK, Kl : eidemque ef , tot d , adijciantur, quotus est b , qui sint fm, mn, no, ol , & iterum ipsi el , adijciantur tot b , quotus est d , qui sint lp, pr, rt, tx, xy : necnon iterum eidem el , adijciantur tot

 d ,

d, quotus est *b*, qui sint *lq*, *qs*, *su*, *uy*.

Demonstr.

16. 7.

Quoniam productus *b* per *d*, est æqualis producto *d* per *b*: summa numerorum *fg*, *gh*, *hi*, *iK*, *Kl*, summae *fm*, *mn*, *no*, *ol*, est æqualis: & summa *lp*, *pr*, *rt*, *tx*, *xy*, summae *lq*, *qs*, *su*, *uy*, æqualis. Sunt autem & singulae partes *fl*, singulis *ly* partibus æquales; & omnes, omnibus: & *fg*, *fm*, *fh*, *fn*, *fi*, *fo*, *fk*, ipsis *lp*, *lq*, *lr*, *ls*, *lt*, *lu*, *lx*, singuli numeri, singulis æquales: & eorum differentiae æquales, & similes: additisque vtrinq; communibus numeris *of*, *el*, etiam compositorum differentia sunt æquales & similes: & *ef*, *eg*, *em*, *eh*, *en*, *ei*, *eo*, *eK*, sunt similiter arithmetice dispositi, atque *el*, *op*, *eq*, *er*, *es*, *et*, *eu*, *ex*. Est autem *ef*, non minor, quam secunda potestas *fg*, & est *el*, maior, quam *of*; & *lp* æqualis ipsi *fg*: ergo *el* non minor est, quam secunda potestas *lp*: ideoque similiter etiam *op*, non minor, quam secunda potestas *pr*: & *er*, non minor, quam secunda potestas *rt*: & *et*, non minor, quam secunda potestas *tx*. Itaque sicut demonstratum est, quod

45. b.

fg(*ef*)+*gm*(*eg*): minor est, quam *fm*(*ef*).

2. b.

nh(*eg*)+*hn*(*eh*): minor, quam *mn*(*eh*).

2. b.

ni(*eh*)+*io*(*ei*): minor, quam *no*(*en*).

2. b.

oK(*ei*)+*Kl*(*eK*): minor, quam *ol*(*eo*).

Sic

$m \quad n \quad o \quad \dots \quad q \quad s \quad u$
 $e \rightarrow 20 \rightarrow f, \dots \dots \dots l \dots \dots \dots p \quad r \quad t \quad x \rightarrow 7$
 $g \quad h \quad i \quad K$

Sic demonstrabitur, quòd

46. h. $lp(el) + pq(ep)$ minor est, quàm $lq(el)$.

2. h. $qr(ep) + rs(er)$ minor, quàm $qs(eq)$.

2. h. $st(er) + tu(et)$ minor, quàm $su(es)$.

2. h. $ux(et) + xy(ex)$ minor, quàm $uy(eu)$.

47. b. Item sicut demonstratum est, quòd

$fg(ef)$, $gm + mb(eg)$, $hm + ni(eh)$, $io + ok(ei)$,
 $Kl(ek)$.

componunt primum prologarithmum seriei C: &
quòd

$fm(ef)$, $mn(em)$, $no(en)$, $ol(éo)$, componunt
primum seriei A. sic

$lp(el)$, $pq + qr(ep)$, $rs + st(er)$, $tu + ux(et)$, $xy(ex)$,
componunt secundum prologarithmum seriei C: &

$lq(el)$, $qs(eq)$, $su(es)$, $uy(eu)$, componunt se-
47. h. cundum seriei A. Et omninò sicut primus seriei

def. 8. b. C, perspectè est minor primo seriei A: ita secun-
dus prologarithmus, est perspectè minor secun-
do. Quod &c.

Similiter ostendetur, quod & tertius tertio, & quartus
quarto, sunt perspectè minores: & quod quisque prologa-
rithmus seriei C; perspectè minor est, æqueordinato pro-
logarithmo seriei A.

Quare &c.

Theor. 50. Prop. 50.

Hyperlogarithmi rationum duplę, & superparticularium, quò sunt, minores inter terminos, eò sunt minores.

Prępar.

Esto *A*, series harmonica naturalis: & ordinentur *B*, *C*, *D*, series prologarithmorum; *B* quidem, ex binis à secundo; *C*, ex ternis à tertio; *D*, ex quaternis à quarto; & sic deinceps, à quotoquolibet, ex totenis.

Demonstr.

def. 12. b | Nam in serie arithmetica naturali, ratio subd-
21. 7. | pla, est inter minimos terminos, primum, & se-
19. b. | cundum; deinde inter maiores, ordinatim multi-
24. b. | plos minimorum; videlicet inter secundum, &
def. 20 b | quartum; inter tertium, & sextum; inter quartum,
 octauum. Ergo reciprocè, in serie harmonica na-
 turali, ratio dupla, est inter maximos terminos,
 primum, & secundum; deinde inter minores ordi-
 natim submultiplos maximorum; videlicet inter
def. 22 b | secundum, & quartum; inter tertium, & sextum;
 inter quartum, & octauum. Ergo rationis duplę,
 inter maximos terminos primum, & secundum,
 hyperlogarithmus, est primus terminus seriei *A*,
 nempe vnitas. deinde inter minores terminos se-
 cundum, & quartum, hyperlogarithmus, est pri-
 mus prologarithmus seriei *B*, ex duobus à secun-
 do, nempe ex secundo, & tertio. & inter tertium,

& sextum, minores adhuc terminos, hyperlogarithmus, est primus prologarithmus seriei *C*, ex tribus à tertio, nempe ex tertio, quarto, & quinto. Et deinceps inter minores terminos quartum, & octauum, hyperlogarithmus, est primus prologarithmus seriei *D*, ex quatuor à quarto, nempe ex quarto, quinto sexto, & septimo. Sed huiusmodi primorum prologarithmorum, minor est qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus terminis. Ergo hyperlogarithmorum duplæ rationis minor est, qui minores inter est terminos, quàm qui inter maiores. Quod &c.

Rursum in serie arithmetica naturali, ratio sesquialtera, est inter minimos terminos, secundum, & tertium; deinde inter maiores, ordinatim multiplos minimorum; videlicet inter quartum, & sextum; inter sextum, & nonum; inter octauum, & duodecimum. Ergo reciproè in serie harmonica naturali, ratio sesquialtera est inter maximos terminos, secundum, & tertium; deinde inter minores, submultiplos maximorum, quartum, & sextum; & inter minores, sextam, & nonum; & adhuc inter minores, octauum, & duodecimum. Ergo rationis sesquialteræ inter maximos terminos, secundum, & tertium, hyperlogarithmus, est secundus seriei *A*. deinde inter minores, quartum, & sextum, hyperlogarithmus, est secundus prologa-

49. h. | logarithmus seriei B, ex duobus à quarto, nempe
 ex quarto, & quinto. & inter sextum, & nonum,
 adhuc minores, hyperlogarithmus, est secundus
 seriei C, ex tribus à sexto, nempe ex sexto, septi-
 mo, & octavo. & inter octavum, & duodecimum,
 adhuc minores, hyperlogarithmus, est secundus
 seriei D, ex quatuor ab octavo, nempe ex octavo,
 nono, decimo, & undecimo. Sed in seriebus hu-
 iusmodi, secundorum prologarithmorum, minor
 est, qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus ter-
 minis. Ergo sesquialteræ rationis hyperloga-
 rithmorum minor est, qui minores inter termi-
 nos, quàm qui est inter maiores. Quod Sic.

Similiter prorsus demonstratione ostendetur, de ses-
 quitertia ratione, adhibitis tertijs prologarithmis earum-
 dem serierum: & de sesqui quarta, adhibitis quartis pro-
 logarithmis: & de omni superparticulari ratione.

Quare &c.

Theor. 51. Propos. 51.

Omnis ratio multiplica, vel est dupla, vel ex dupla & su-
 perparticularibus composita.

Demonstr.

def. 5. 6. | Nam tripla 3 ad 1, ex sesquialtera, 3 ad 2, &
 dupla, 2 ad 1, componitur: quadrupla, 4 ad 1,
 ex sesquitertia, 4 ad 3, sesquialtera, 3 ad 2, & du-
 pla, 2 ad 1: quinquupla, 5 ad 1, ex sesquiquarta, 5
 Kk 2 ad 4,

ad 4, sesquitercia, 4 ad 3, sesquialtera, 3 ad 2, & dupla, 2 ad 1. Et sic de reliquis.

Quare &c.

Theor. 52. Prop. 52.

Omnis ratio numerosa, ex superparticularibus componitur.

Hypoth.

Est ratio numerosa a ad b .

Dico a ad b rationem ex superparticularibus esse compositam.

Prepar.

Assumantur numeri 8, 5, eandem inter se rationem habentes a ad b . & inter 8, & 5. medij numeri. 7. 6.

Demonstr.

def. 5. 6. | Ratio 8 ad 5 ex rationibus 8 ad 7, 7 ad 6, 6 ad 5, componitur. Sed 8 ad 7, ratio numeri ad numerum unitate minorem, est superparticularis, item 7 ad 6, 6 ad 5, sunt rationes superparticulares: ergo ratio numerosa, 8 ad 5, vel a ad b , ex rationibus superparticularibus componitur. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 53. Prop. 53.

Quotcunque terminorum, è serie harmonica naturali, ordine quantitatis acceptorum, hyperlogarithmus

rithmus rationis compositæ inter extremos, componitur ex hyperlogarithmus rationum componentium, inter extremos, & hypologarithmus ex hypologarithmis.

Hypoth.

In serie harmonica naturali, sint tres termini a, b, c : & esto a , maior, quàm b ; & b , maior, quàm c .

Dico rationis a ad c , inter terminos a, c , hyperlogarithmum, ex rationis a ad b , inter a, b , & rationis b ad c , inter b, c , hyperlogarithmis componi.

Et hypologarithmum, ex hypologarithmis.

Præpar.

Sumantur inter terminos a, b , omnes medij in serie harmonica naturali: necnon inter b, c . & sint inter a, c termini.

$a \ g \ h \ i \ b \ K \ l \ m \ n \ c$

Demonstr.

Hyperlogarithmus rationis a ad b , inter terminos a, b , est $a+g+h+i$. Hyperlogarithmus rationis b ad c , inter terminos b, c , est $b+K+l+m+n$. Hyperlogarithmus rationis a ad c , inter terminos a, c , est $a+g+h+i+b+K+l+m+n$. ex utrarumque rationum a ad b , & b ad c , hyperlogarithmis, inter eosdem terminos compositus.

Quod &c.

Item rationis a ad b , inter a, b , hypologarithmus est, $g+h+i+b$: & rationis b ad c , inter b, c , est $K+l+m+n+c$: & rationis a ad c , est $g+h+i+b+K+l+m+n+c$. ex utrisque compositus. Quod &c. Quare &c.

Theor. 54. Prop. 14.

Cuiusque numerosa rationis hyperlogarithmi, quæ sunt, minores inter terminos, eò sunt minores.

Hypoth.

Esto numerosa ratio inter seriei harmonice terminos ab unitate, maiores $1(3a)$, $1(3b)$, & deinde inter minores $1(4a)$, $1(4b)$.

Dico inter $1(4a)$, $1(4b)$, minorem esse hyperlogarithmum, quàm inter $1(3a)$, $1(3b)$.

Prepar.

Assumantur minimi numeri in eadem ratione
 21. 7. a, b : & deinceps maiores, nempe dupli, tripli,
 27. b . quadrupli, donec inueniatur denominatores pro-
 positorum terminorum, $3a, 3b, 4a, 4b$. Deinde
 inter a, b ordinentur omnes medij, in serie arithmetica naturali, quorum deinceps supparticulares sunt rationes, a, c, d, b ; & eorum æquemultipli $3a, 3c, 3d, 3b$, easdem supparticulares habentes rationes deinceps; necnon & æquemultipli easdem habentes rationes $4a, 4c, 4d, 4b$. Sumantur denique in serie harmonica termini, ab his denominati $1(3a), 1(3c), 1(3d), 1(3b)$: & $1(4a), 1(4c), 1(4d), 1(4b)$.

Demonstr.

24. b . Terminorum $1(4a), 1(4c), 1(4d), 1(4b)$ rationes deinceps, necnò terminorum $1(3a), 1(3c), 1(3d), 1(3b)$, reciprocè sunt eadem, quæ terminorum

50. b. notum $4a, 4c, 4d; 4b$, necnon $3a, 3c, 3d, 3b$:
 idest, eadem superparticulares. Quarum rationis
 inter $1(4a), 1(4c)$, minor est hyperlogarithmus,
 quàm inter $1(3a), 1(3c)$: & inter $1(4c), 1(4d)$, mi-
 nor, quàm inter $1(3c), 1(3d)$: & inter $1(4d), 1(4b)$,
 52. b. minor, quàm inter $1(3d), 1(3b)$. Et ex minoribus
 hyperlogarithmis, minor est hyperlogarithmus
 compositus, rationis compositæ inter extremos
 $1(4a), 1(4b)$, quàm ex maioribus, inter extremos
 $1(3a), 1(3b)$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 55. Prop. 55.

Hyperlogarithmi rationum duplæ, & superparticula-
 rium, quæ sunt, minores inter terminos, eò sunt
 maiores.

Præpar.

Esto *A* series harmonica naturalis: & ordinantur *B, C,*
D, series prologarithmorum ab unitate; *B* quidem, ex bi-
 nis; *C,* ex ternis; *D,* ex quaternis; & sic deinceps.

Demonst.

def. 12. b. Nam in serie arithmetica naturali, ratio subdu-
 pla est inter minimos terminos, primum, & secun-
 dum; deinde inter maiores, ordinatim multiplos
 61. 7. minimorum; videlicet inter secundum, & quantum;
 19. b. inter tertium, & sextum; inter quantum, & octauum.
 34. b. Ergo reciproçè in serie harmonica naturali, ratio
 def. 30 b. dupla

dupla est inter maximos terminos, primū, & secundum; deinde inter minores ordinatim submultiplos maximorum; videlicet, inter secundum, & quartum; inter tertium, & sextum; inter quartum, & octauum. Ergo rationis duplæ, inter maximos terminos primū, & secundum, hypologarithmus, est secundus terminus seriei *A*, nempe 1(2). deinde inter minores terminos secundum, & quartum, hypologarithmus, est secundus prologarithmus seriei *B*, ex duobus à tertio, nempe ex tertio, & quarto: & inter tertium, & sextum, minores adhuc terminos hypologarithmus, est secundus prologarithmus seriei *C*, ex tribus à quarto, nempe ex quarto, quinto, & sexto. & deinceps inter minores terminos, quartum, & octauum, hypologarithmus, est secundus prologarithmus seriei *D*, ex quatuor à quinto, nempe ex quinto sexto, septimo, & octauo. Sed huiusmodi secundorum prologarithmorum, maior est, qui ex pluribus, quàm qui ex paucioribus terminis. Ergo hypologarithmorum duplæ rationis maior est, qui minores inter est terminos, quàm qui inter maiores. Quod &c.

Rursum in serie arithmetica naturali, ratio sub-
 26. h. sesquialtera, est inter minimos terminos, secun-
 21. 7. dum, & tertium; deinde inter maiores, ordinatim
 19. h. multiplos minimorum; videlicet, inter quartum,
 & sex-

24. h. & sextum; inter sextum, & nonum; inter octauum, & duodecimum. Ergo reciproce in serie harmonica naturali, ratio sesquialtera est inter maximos terminos, secundum, & tertium; deinde inter minores, submultiplos maximorum, quartum, & sextum; & inter minores sextum, & nonum; & adhuc inter minores octauum, & duodecimum.

def. 23b Ergo rationis sesquialteræ inter maximos terminos, secundum, & tertium, hypologarithmus, est tertius seriei A. deinde inter minores, quartum, & sextum, hypologarithmus, est tertius prologarithmus seriei B, ex duobus à quinto, nempe ex quinto, & sexto. & inter sextum, & nonum, adhuc minores terminos, hypologarithmus est tertius seriei C, ex tribus à septimo, nempe ex septimo, octauo, & nono. & inter octauum, & duodecimum adhuc minores, hypologarithmus, est tertius seriei D, ex quatuor à nono, nempe ex nono, decimo, undecimo, & duodecimo. Sed in seriebus huiusmodi, tertiorum prologarithmorum, maior est, qui ex pluribus, quam qui ex paucioribus terminis. Ergo sesquialteræ rationis hypologarithmorum, maior est, qui minores inter terminos, quam qui est inter maiores. Quod &c.

48. h.

Simili prorsus demonstratione ostendetur; de sesquitertia ratione, adhibitis quartis prologarithms earumdem serierum: & de sesquiquarta, adhibitis quintis prologarithmis:

rithmis: & de omni superparticulari ratione .

Quare &c.

Theor. 56. Propof. 56.

C Viusque numerosæ rationis hypologarithmi, quò sunt, minores inter terminos, eò sunt maiores .

Hypoth.

Esto numerosa ratio inter seriei harmonicæ naturalis terminos ab vnitare, maiores $1(3a)$, $1(3b)$, & deinde inter minores $1(4a)$, $1(4b)$.

Dico inter $1(4a)$, $1(4b)$, maiorem esse hypologarithmum, quàm inter $1(3a)$, $1(3b)$.

Præpar.

Assumantur minimi numeri in eodem ratione a, b : & inter minimos, medij omnes c, d : quorum terminorum a, c, d, b , rationes deinceps sunt superparticulares; assumantur & eorum multipli, donec propositorum terminorum denominatores inueniantur, $3a, 3c, 3d, 3b$, & $4a, 4c, 4d, 4b$, eadem superparticulares habentes rationes deinceps. Sumantur denique in serie harmonica, termini ab his denominati $1(3a)$, $1(3c)$, $1(3d)$, $1(3b)$, & $1(4a)$, $1(4c)$, $1(4d)$, $1(4b)$: quorum rationes deinceps, reciprocè sunt eodem, & superparticulares.

Demonstr.

55. b. | Inter $1(4a)$, $1(4c)$, maior est hypologarithmus, quàm inter $1(3a)$, $1(3c)$: & inter $1(4c)$,
| $1(4d)$,

Q V I N T V M.

267

53. b. | $1(4a)$, maior, quàm inter $1(3c)$, $1(3d)$: & inter
 | $1(4a)$, $1(4b)$, maior, quàm inter $1(3d)$, $1(3b)$.
 | Et ex maioribus hypologarithmis, maior est hy-
 | pologarithmus compositus, rationis compositæ,
 | inter extremos $1(4a)$, $1(4b)$, quàm ex minoribus,
 | inter extremos $1(3a)$, $1(3b)$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 57. Prop. 57.

Eiusdem rationis, inter eisdem terminos, hyperloga-
 rithmus hypologarithmo est maior.

Hypoth.

Sint in serie harmonica naturali ab vnitae, termini a ,
 b : & esto a prior, quàm b .

Dico rationis a ad b , inter a , b terminos, hyperloga-
 rithmum hypologarithmo maiorem esse.

Prepar.

Inter a , b , sumantur medij omnes in serie harmonica,
 quorum summa c .

Demonst.

hypoth. | a : prior, quàm b .

27. b. | a : maior, quàm b .

| $a+c$: maior, quàm $c+b$.

def. 22b | $a+c$: hyperlogarithmus.

def. 23b | $c+b$: hypologarithmus.

| Ergo rationis a ad b , inter a , b terminos, hy-
 | perlogarithmus, est maior hypologarithmo.

| Quod &c. Quare &c.

Theor. 58. Prop. 58.

Eiusdem rationis inter quoscunque terminos, hyperlogarithmus hypologarithmo est maior.

Hypoth. comm.

In serie harmonica naturali ab unitate, sunt termini proportionales a ad b , ut c ad d .

Dico inter a, b hypologarithmum, hypologarithmo inter c, d , maiorem esse.

Hypoth. p. cas.

Esto a , maior, quàm c .

Demonstr.

14. 5. | Quoniam a , maior est, quàm c ; etiam b , maior est, quàm d : & inter a, b , maior est hyperlogarithmus, quàm inter c, d : sed inter c, d , hyperlogarithmus hypologarithmo est maior: ergo inter a, b hyperlogarithmus, hypologarithmo inter c, d , est maior. Quod &c.

Hypoth. 2. cas.

Esto a , minor, quàm c .

Demonstr.

14. 5. | Quoniam a , minor est, quàm c ; etiam b minor est, quàm d : & inter a, b , hyperlogarithmus hypologarithmo est maior: hypologarithmus autem inter a, b , hypologarithmo inter c, d , est maior. Ergo inter a, b hyperlogarithmus, hypologarithmo inter c, d , est maior. Quod &c.

Quare &c.

Probl. 1. Prop. 59.

Data ratione, terminos inuenire cuiuspiam determinatæ rationis numerosæ, in serie harmonica naturali ab vnitate, quos inter hypologarithmus ad vltimum, maior est, quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio a ad b : & sit determinata ratio numerosa c ad d .

Oportet inuenire in serie harmonica naturali ab vnitate, terminos proportionales, vt c ad d : quos inter hypologarithmus ad vltimum eorum, maior est, quàm vt a ad b .

Constr.

Rationis c ad d , minimi numeri inueniantur c, d : & esto c minor, quàm d ; cuius defectus e : & inueniatur f multiplex ipsius e , & maior ad vnitatem, quàm vt a ad b : & quotuplex est f ad e , totus numerus accipiatur g : per quem multiplicentur c, d , termini, & fiant gc, gd producti: quibus denominatæ sumantur vnitates in serie harmonica naturali, $1(gc), 1(gd)$.

Dico inter $1(gc), 1(gd)$ hypologarithmum ad $1(gd)$, maiorem esse, quàm vt a ad b .

Demonstr.

9. b. | Quoniam c , minor est, quàm d : & gc , minor
12. b. | quàm gd : ergo reciprocè $1(gc)$ maior est, quàm
def. 19. b | $1(gd)$: & singuli medij harmonici inter $1(gc), 1-$
p. 3. | (gd) , sunt maiores, quàm $1(gd)$: & simul omnes

ad

p. 3. ad $1(gd)$ maiores sunt, quàm vt eorum multitu-
 do ad vnitatem. & componendo hypologari-
 thmus inter $1(gc)$, $1(gd)$, maior est ad $1(gd)$,
 quàm vt eius multitudo terminorum ad vnitatem.
 44. b. Termini autem seriei harmonicę ab vnitatem in-
 clusiue, vsque ad $1(gd)$ inclusiue, tot sunt, quotus
 est gd : & vsque ad $1(gc)$ inclusiue, quotus est, gc .
 & ab $1(gc)$ exclusiue, vsque ad $1(gd)$ inclusiue,
 30. b. tot, quotus est, $gd--gc$. Sed $d--c$, est e : & gd
 $--gc$, est gc : & g multiplicans e , facit f . Ergo
 termini ab $1(gc)$ exclusiue, vsque ad $1(gd)$ inclu-
 def. 23b siue, tot sunt, quotus est f . Sed termini ab $1(gc)$
 exclusiue, vsque ad $1(gd)$ inclusiue, componunt
 hypologarithmum inter $1(gc)$, $1(gd)$: ergo mul-
 titudo terminorum hypologarithmi inter $1(gc)$,
 1(gd), est f . Sed f ad vnitatem maior est, quàm
 constr. vt a ad b . Ergo hypologarithmus inter $1(gc)$,
 $1(gd)$, ad $1(gd)$, maior est, quàm vt a ad b .
 Quod &c.

Quare &c.

Probl. 2. Prop. 60.

DAta ratione, terminos inuenire cuiuspiam determi-
 natae rationis numerosę, in serie harmonica natu-
 rali ab vnitatem, quos inter hyperlogarithmus ad primum
 maior est, quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio a ad b : & sit determinata ratio numero-
sa c ad d : & esto c , minor, quàm d .

Oportet inuenire, in serie harmonica naturali ab vni-
tate, terminos proportionales vt c ad d : quos inter hy-
perlogarithmus ad primum eorum, maior est, quàm vt a
ad b .

Constr.

59. b. | Fiat vt d ad c , ita b ad e : & inueniantur ter-
mini in serie harmonica naturali ab vnitae, pro-
portionales f ad g , vt d ad c ; inter quos hypolo-
garithmus, maior sit ad g , quàm vt a ad e .

Dico inter f, g hyperlogarithmum, ad f , maiorem esse,
quàm vt a ad b .

Demonstr.

constr. | Inter f, g hypologarithmus, ad g , maior est,
constr. | quàm vt a ad e : g ad f , est vt e ad b : ergo inter
4. 3. | f, g hypologarithmus, ad f , maior est, quàm vt
57. b. | a ad b . Sed inter f, g hyperlogarithmus hypo-
8. 5. | logarithmo est maior; maioremque habet ad f ra-
13. 5. | tionem: ergo inter f, g hyperlogarithmus, ad f ,
maior est, quàm vt a ad b . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 3. Prop. 61.

DAtis duabus numerosis, & non æquealtis rationi-
bus, vtrisque maioris, vel vtrisque minoris inæ-
quali-

qualitatis: iuuenire in serie harmonica naturali, terminos duarum rationum, vt hypologarithmus altioris, maior sit hyperlogarithmo depressioris.

Hypoth.

Sint duæ rationes numerosæ, vtræque maioris, vel vtræque minoris inæqualitatis, *A* altior, *B* depressior.

Oportet in serie harmonica naturali, terminos inuenire vtrarumque, vt hypologarithmus *A*, sit maior hyperlogarithmo *B*.

Constr.

35. 7. Inueniantur *c*, *d*, minimi numeri numerosæ rationis *A*: quorum *c*, minor, quàm *d*. Item
35. 7. inueniantur *e*, *f*, minimi numerosæ rationis *B*:
def. 28. b. quorum *e*, minor, quàm *f*. Fiat ex *c*, *e* pro-

| <i>A</i> | <i>B</i> |
|----------------------------|--|
| <i>c</i> <i>d</i> | <i>e</i> <i>f</i> |
| <i>ce</i> | <i>cf</i> <i>g</i> <i>de</i> |
| <i>cef</i> <i>eg</i> | <i>cf²</i> <i>fg</i> <i>def</i> |
| <i>I(cef)</i> <i>I(eg)</i> | <i>I(fg)</i> <i>I(def)</i> |

9. b. ductus *ce*: & vt *c* ad *d*, ita *ce* ad *de*: & vt *e* ad *f*, ita *ce* ad *cf*. Et quoniam altior est *A*, quàm *B*; idest, *c* ad *d*, quàm *e* ad *f*; idest, *ce* ad *de*, quàm *ce* ad *cf*. & sunt minoris inæqualitatis. ergo *ce* minor est ad *de*, quàm ad *cf*. Ergo *cf*, minor est, quàm *de*. Sumatur inter *cf*, *de* mediùs quilibet numerus *g*. & multiplicentur omnes *ce*, *cf*, *g*, *de*, communiter per *f*: & sint pro-

def. 28b | producti cef , cf_2 , fg , def . necnon multiplicetur
 9. h. | g , per e : & fit productus eg . Et quoniã cef ad cf_2 , est
 11. 5. | vt e ad f : itẽm eg ad fg , est vt e ad f : ergo cef ad cf_2 ,
 constr. | est vt eg ad fg . Est autem cf , minor, quã g : er-
 14. 5. | go cf_2 , minor est, quã fg : ergo cef , minor est,
 | quã eg : ergo sunt quatuor numeri, hoc ordine,
 27. h. | cef , eg , fg , def , priores minores posterioribus; à
 | quibus denominatæ unitates $I(cef)$, $I(eg)$, $I(fg)$,
 24. h. | $I(def)$, sunt in serie harmonica naturali ab unitate,
 24. & | hoc ordine, priores maiores posterioribus. &
 9. h. | est $I(cef)$ ad $I(def)$, vt d ad c ; & $I(eg)$ ad I -
 | (fg) , vt f ad e .

Dico hypologarithmum inter terminos $I(cef)$, $I(def)$,
 maiorẽ esse hyperlogarithmo inter terminos $I(eg)$, $I(fg)$.

Demonstr.

def. 23b | Nam hypologarithmus inter terminos $I(cef)$,
 | $I(def)$, ex $I(eg)$, & ex $I(fg)$, & ex omnibus inter-
 def. 22b | medijs, alijsque terminis componitur: hyperloga-
 | rithmus verò inter $I(eg)$, $I(fg)$, ex $I(eg)$, & ex
 | intermedijs terminis, vsque ad $I(fg)$ exclusiue,
 | componitur. Ergo hyperlogarithmus inter I -
 | (cef) , $I(def)$, maior est hyperlogarithmo inter
 | $I(eg)$, $I(fg)$. Quod &c. Quare &c.

Probl. 4. Prop. 62.

DAta qualibet ratione inæqualitatis, inuenire in serie
 harmonica naturali ab unitate, terminos determi-

M m

natam

natam habentes rationem inter quos hyperlogarithmus ad hypologarithmum propior est æqualitati, quàm in data ratione.

Hypoth.

Sit data ratio inæqualitatis a ad b : & sit determinata quædam ratio C .

Oportet inuenire terminos in serie harmonica naturali ab unitate, habentes eandem C rationem; inter quos hyperlogarithmus ad hypologarithmum est propior æqualitati, quàm ut a ad b .

Constr.

60. h. | Esto a maior quàm b . & inueniantur in serie harmonica naturali ab unitate, termini, prior d , posterior e ; inter quos hyperlogarithmus ad priorem d , maior est, quàm ut a ad $a - b$.

Dico inter d , e hyperlogarithmum ad hypologarithmum, maiorem esse, quàm ut a ad b ; maiorem, quàm ut b ad a .

Præpar.

Inter d , e , assumatur mediorum omnium harmonicorum summa f .

Demonstr.

deff. 22. | Inter d , e hyperlogarithmus est $d + f$ & hypologarithmus $f + e$: & est $d + f$ ad d , maior, quàm
 & 23 h. |
 constr. |
 3. 3. | ut a ad $a - b$: & per conuersionem rationis, $d + f$ ad f , minor, quàm ut a ad b . Sed $d + f$ ad $f + e$, minor est, quàm ut $d + f$ ad f . Ergo $d + f$ ad $f + e$,
 8. 5. |
 13. 5. |

$f \rightarrow e$, minor est, quàm vt a ad b . Ergo inter d , e hyperlogarithmus ad hypologarithmum, minor est, quàm vt a ad b . Quod &c.

Et est hyperlogarithmus hypologarithmo maior: b autem, minor, quàm a . Ergo hyperlogarithmus ad hypologarithmum maior est, quàm vt b ad a . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 59. Prop. 63.

SI fuerit prima ad secundam, minor, quàm vt tertia ad quartam; fuerit autem prima, quàm tertia, maior: erit & secunda, quàm quarta, maior.

Demonstr.

Nam si esset secunda, æqualis quarta: esset prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam: contra hypothefim. Quòd si secunda esset minor, quàm quarta: esset prima ad secundam, maior, quàm vt ad quartam: prima autem ad quartam, maior est, quàm vt tertia ad quartam: esset ergo prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam: contra hypothefim. Est ergo secunda, quàm quarta maior. Quod &c. Quare &c.

Theor. 60. Prop. 64.

SI fuerit prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam; fuerit autem prima, quàm tertia minor: erit

erit & secunda, quàm quarta, minor.

Demonstr.

8. 5. | Nam si esset secunda æqualis quartæ : esset pri-
 ma ad secundam minor, quàm vt tertia ad quar-
 tam. contra hypothesim. Quòd si secunda esset
 8. 5. | maior, quàm quarta : esset prima ad secundam,
 8. 5. | minor, quàm vt ad quartam : prima autẽ ad quar-
 13. 5. | tam, minor est, quàm vt tertia ad quartam : esset
 ergo prima ad secundam, minor, quàm vt tertia
 ad quartam. contra hypothesim. Est ergo se-
 cunda, quàm quarta; minor.

Quare &c.

Theor. 61. Prop. 65.

E Arundem numerosarum rationum vna tantam
 quantitas est logarithmus.

Hypoth.

Sunto duæ quantitates inæquales a, b & esto a , loga-
 rithmus rationis C .

Dico b non esse logarithmum rationis C .

Prepar.

62. b. | Sumatur eiusdem rationis C , hyperlogarithmus
 d , & hypologarithmus e , propiores æqualitati,
 quàm vt a ad b .

Demonstr.

57. b. | d : maior quàm e .
 Si a , maior est, quàm b .

$d; e$

constr. | $d; e$ minor, quàm $a; b$.
def. 24b | d : maior, quàm a .
63. b. | e : maior, quàm b .
def. 24b | b , non est logarithmus rationis C . Quod &c.
 Si a , minor est, quàm b .
constr. | $e; d$: maior, quàm $a; b$.
def. 24b | e : minor, quàm a .
64. b. | d : minor, quàm b ,
def. 24b | b , non est logarithmus rationis C . Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 62. Prop. 66.

Determinate numerosæ rationis hypologarithmi ad ultimum terminum, & hyperlogarithmi ad primum, sunt rationes quasi infinitæ.

Demonstr.

59. b. | Possunt enim inueniri cuiusque determinatæ rationis numerosæ termini in serie harmonica naturali ab unitate, quorum ad ultimum, hypologarithmus maior est, quàm in data quacunque ratione item, quorum ad primum, hyperlogarithmus maior est, quàm in data quacunque ratione. Quare hypologarithmi ad ultimum terminum, & hyperlogarithmi ad primum, ratio quasi est infinita.
60. b.
def. p. 3.

Theor.

Theor. 63, Propos. 67

SI trium inæqualium quantitarum, maxima, & minima, fuerint propiores æqualitati, quàm data ratio inæqualitatis: etiam maxima, & media; media, & minima, erunt propiores æqualitati, quàm data eadem ratio.

Hypoth.

Sint inæquales quantitates a, b, c , maxima quidem a , minima c : & sit data ratio inæqualitatis d ad e ; cuius maior terminus d , minor e : & sit a ad e , propior æqualitati, quàm d ad e .

Dico $a; b$, & $b; c$: propiores æqualitati, quàm $d; e$:

Demonstr.

| | |
|----------------------|---|
| <i>hypoth.</i> | $a; c$: propior æqualitati, quàm $d; e$. |
| <i>def. 3.3.</i> | $a; e$: minor, quàm $d; e$. & $e; a$: maior, quàm $e; d$. |
| <i>8. 5.</i> | $a; b$: minor, quàm $a; e$. & $b; a$: maior, quàm $e; b$. |
| <i>13. 5.</i> | $a; b$: minor, quàm $d; e$. & $b; a$: maior, quàm $e; d$. |
| <i>def. 3.3.</i> | $a; b$: propior æqualitati, quàm $d; e$. Quod &c. |
| <i>8. 5.</i> | $b; c$: minor, quàm $a; e$. & $e; b$: maior, quàm $e; c$. |
| <i>13. 5.</i> | $b; c$: minor, quàm $d; e$. & $e; b$: maior, quàm $e; d$. |
| <i>def. 3.3.</i> | $b; c$: propior æqualitati, quàm $d; e$. Quod &c. |
| <i>Quare &c.</i> | |

Probl. 5. Propos. 68

DATA qualibet ratione inæqualitatis, invenire eundem determinatæ rationis hyperlogarithmos, & hypologarithmos ad invicem, & ad logarithmum propiores æqualitati, quàm in data ratione.

Hy-

Hypoth.

Sit data ratio inaequalitatis a ad b ; cuius maior terminus a , minor b ; & sit determinata quaedam ratio C .

Oportet inuenire hyperlogarithmos, & hypologarithmos ad inuicem, & ad logarithmum rationis C , propiores aequalitati, quam in ratione a ad b .

Constr.

52. *b.* Inueniantur in serie harmonica naturali ab unitate duo termini d , e , habentes eandem rationem C ; inter quos hyperlogarithmus f , ad hypologarithmum g , fit propior aequalitati, quam in ratione a ad b . Sumanturque minore termini quam d , e , eandem habentes rationem C ; inter quos esto hyperlogarithmus h ; & esto hypologarithmus i ; & eiusdem rationis C , esto logarithmus k .

Dico f , g , h , i , k propiores esse aequalitati, quam in ratione a ad b .

Demonstr.

54. *b.* f maior est, quam h .

def. 24b h maior, quam k .

def. 24b k maior, quam i .

56. *b.* i maior, quam g .

constr. f , g propiores aequalitati, quam a , b .

67. *b.* f , h , k , i , g , propiores aequalitati, quam in ratione a ad b . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 64. Prop. 69.

Eiusdem rationis hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus, quasi sunt æquales.

Demonstr.

68. b. Possunt enim inueniri eiusdem rationis hyperlogarithmi, & hypologarithmi, & ad inuicem, & ad logarithmum propiores æqualitati, quàm in
def. 3. 3. data qualibet ratione inæqualitatis. Quare eiusdem rationis hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus, quasi sunt æquales.

Theor. 65. Prop. 70.

Æquealtarum numerosarum rationum, æquales sunt logarithmi.

Demonstr.

65. b. Earumdem enim numerosarum rationum, vna tantùm quantitas, est logarithmus. Sed æquealtæ, sunt eadem inter se. nam si non essent eadem, cum vel vtraque sit maioris, vel vtraque minoris inæqualitatis; vtrarumque maioris, quæ minor esset, vel vtrarumque minoris inæqualitatis, quæ maior esset, propior esset æqualitati: & non essent inter se æquealtæ; contra hypothesim. Ergo etiam æquealtarum rationum, vna tantùm quantitas est logarithmus.

Quare &c.

Theor. 66. Prop. 71.

Numerosarum rationum, altioris, maior est logarithmus, & depressioris, minor.

Hypoth.

Sunto numerosæ rationes; *A* altior, *B* depressior: & esto ipse *A*, logarithmus *a*; & ipse *B*, logarithmus *b*.

Dico *a*, maiorem esse, quàm *b*.

Præpar.

61. *b.* | Inueniatur *c*, hypologarithmus rationis *A*; & *d*, hyperlogarithmus rationis *B*; vt sit *c*, maior, quàm *d*.

Demonstr.

def. 24h | *a*: maior, quàm *c*.

constr. | *c*: maior, quàm *d*.

def. 24h | *d*: maior, quàm *b*.

| *a* maior, quàm *b*. Quod &c. Quare &c.

Theor. 67. Prop. 72.

Multiplicatarum numerosarum rationum hyperlogarithmi sunt quasi æquemultiplices: item hypologarithmi, quasi æquemultiplices.

Hypoth.

Sunto rationes numerosæ *A*, *B*: & esto *A*, triplicata ipse *B*.

Dico hyperlogarithmos *A*, hyperlogarithmorum *B*, quasi triplices esse. item hypologarithmos hypologarithmorum.

Demonstr.

53. b. | Ex B, B rationibus deinceps, duplicatæ ratio-
 nis hyperlogarithmus, est ex hyperlogarithmis
 vtrarumque B, B compositus. Et ex B, B, B ra-
 tionibus deinceps, triplicatæ rationis A , hyperlo-
 69. h. | garithmus, est ex hyperlogarithmis trium B, B, B
 compositus. item hypologarithmus ex hypolo-
 garithmis. Sed rationum B, B, B deinceps, hy-
 75. 3. | perlogarithmi, sunt quasi æquales: item hypolo-
 garithmi, quasi æquales. Ergo componendo, ra-
 tionis ex duabus B, B , duplicatæ hyperlogari-
 23. 3. | thmus, ad hyperlogarithmum vnius B , quasi est
 duplex: & iterum componendo, rationis A , ex tri-
 bus B, B, B , triplicatæ hyperlogarithmus ad hy-
 perlogarithmum vnius B , quasi est triplex. item
 hypologarithmus ad hypologarithmum, quasi est
 triplex. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 68. Prop. 73.

Multiplicatarum numerosarum rationum, sunt æque-
 multiplices logarithmi.

Hypoth.

Sunto rationes A, B , numerosæ: & esto A , multipli-
 cata ipsius B .

† Dico logarithmum A , logarithmi B , totuplicem esse,
 quotuplicata est A ad B .

De

Demonstr.

69. b. Hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus A , sunt quasi æquales: item hyperlogarithmi, hypologarithmi, & logarithmus B , sunt quasi æquales. Sed hyperlogarithmi A , ad hyperlogarithmos B ; & hypologarithmi, ad hypologarithmos, sunt quasi totuplices, quorum multiplicata est
 72. b. A ad B . Ergo hyperlogarithmi A , ad logarithmum B , sunt quasi totuplices. Sunt autem logarithmi A , & B , quantitates determinatæ. Ergo logarithmus A , ad logarithmum B , totuplex est, quotuplicata est A ad B . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 69. Prop. 74.

Rationes numerosæ logarithmicam inter se rationem habentes, logarithmicè sunt proportionales, ut earum logarithmi.

Hypoth.

Sunt numerosæ rationes A, B , logarithmicam inuicem rationem habentes: & esto rationis A , logarithmus a ; & rationis B , logarithmus b .

Dico A ad B , esse logarithmicè, sicut a ad b .

Prepar.

Rationis A , & quantitatis a , sumantur multiplicata ratio $3A$, & æquemultiplex quantitas $3a$: item rationis B , & quantitatis b , multiplicata $4B$, & æquemultiplex $4b$.

Demonstr.

| | |
|-------------------|---|
| <i>hypoth.</i> | Rationis A , logarithmus est a . |
| 73. <i>b.</i> | Rationis $3A$, logarithmus est $3a$. |
| <i>hypoth.</i> | Rationis B , logarithmus est b . |
| 73. <i>b.</i> | Rationis $4B$, logarithmus est $4b$. |
| 71. <i>b.</i> | Si $3A$, est altior, quàm $4B$; etiam $3a$, est maior, |
| 70. <i>b.</i> | quàm $4b$: si depressior; minor: si æqualta;
æqualis. |
| <i>def. 8. 4.</i> | A ad B , est logarithmicè, sicut a ad b . Quod &c.
Quare &c. |

Probl. 6. Prop. 75.

Data ratione, numerosam depressior inuenire.

Hypoth.

Esto data ratio a ad b : cuius maior terminus a , minor b .

Oportet numerosam inuenire depressiorem, quàm a ad b .

Constr.

Esto c , excessus $a - b$: & multiplicetur c , donec fiat maior, quàm b : & sit multiplicationis numerus d : cui addita vnitas faciat e .

Dico e ad d , depressiorem esse, quàm a ad b .

Demonstr.

Quoniam cd , maior est quàm b : ergo $cd + c$, maior est, quàm $b + c$; idest, maior, quàm a : & $cd + c$ ad c , maior est, quàm a ad c : ergo per conuersionem rationis cd

$+c$ ad cd , minor est, quàm a ad b . Sed $cd+c$ ad cd , est vt $d+u$ ad d : & e est $d+u$: ergo e ad d minor est, quàm a ad b : & est e maior, quàm d : ergo e ad d , est depresso-
rior, quàm a ad b . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 7. Prop. 76.

Datis duabus rationibus non æquealtis, logarithmicam rationem habentibus: inuenire numerosam rationem, depresso-riorem altiore datarum, & altiorem depresso-riore.

Hypoth.

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| a | g | e | h | b |
| | c | f | d | |
| | l | i | | k |

Sunto rationes datæ maioris inæqualitatis, a ad b al-
rior, & c ad d depresso-rior.

Oportet rationem numerosam inuenire, depresso-riorem,
quàm a ad b , & altiorem, quàm c ad d .

Constr.

Sumatur inter a, b , media proportionalis e : & inter c, d , media f . Et vt f ad c , ita fiat e ad g : & vt f ad d , ita c ad h : & erit ex æquali g ad h , vt c ad d : eritque g , ma-
ior, quàm h : & erunt g, e, b , tres continuè proportio-
nales: eritque g maior, quàm e ; & e , maior, quàm h .

Et quoniam sicut a ad b , duplicata est rationum a ad e , & e ad b ; sic g ad h , duplicata est rationum g ad e , &
 e ad h .

18. 4. e ad b : permutando erit sicut a ad b , altior, quàm g ad b ; sic a ad e , & e ad b , altior, quàm g ad e , & e ad b : suntque rationes maioris inæqualitatis: ergo a ad e , maior est, quàm g ad e : & a , maior, quàm g . item e ad b , maior est, quàm e ad h : & h , maior, quàm b .

Duarum quantitatum $h---b$, vel b , sumatur vna non maior, quàm altera: quæ sit $h---b$: cuius æqualiter diuisæ secundum quemlibet numerum particula sit i . & multiplicetur i , donec fiat primò maior, quàm b : & esto multiplicationis numerus k . Deinde multiplicetur i , donec fiat primò maior, quàm g : & sit multiplicationis numerus l .

Dico l ad k , depressiorem esse, quàm a ad b : altiolem, quàm c ad d .

Demonstr.

Maior est $h---b$, quàm i : sed $Ki---b$ non maior: ergo $h---b$, maior est, quàm $Ki---b$: & h , maior, quàm Ki : & est Ki maior, quàm b . Deinde a ad e , est vt e ad b : & e ad g , est vt h ad e : ergo ex æquali in perturbata, a ad g , est vt h ad b . & permutando a ad b , vt g ad b : & $a---g$ ad $h---b$ vt a ad g : sed a maior est, quàm g : ergo $a---g$, maior est, quàm $h---b$: sed $h---b$, maior est, quàm i : ergo $a---g$, maior est, quàm i . sed $li---g$, non maior est, quàm i . ergo $a---g$, maior est, quàm $li---g$: ergo a maior

ior est, quàm li . Ergo li ad ki , vel l ad k minor est, quàm a ad b : & sunt maioris inæqualitatis: ergo l ad K depressior est, quàm a ad b . Quod &c. Rursum li maior est, quàm g : & h maior est quàm Ki : Ergo li ad Ki , vel l ad K , maior est, quàm g ad h , vel quàm c ad d , & sunt maioris inæqualitatis rationes: ergo l ad K , altior est, quàm c ad d . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 8. Prop. 77.

Data quælibet non numerosa ratione, dataque altera quælibet ratione inæqualitatis: duas numerosas rationes inuenire altiorem & depressiorem, quàm data non numerosa; logarithmicè proportionales, vt numerus ad numerum; propiores æqualitati logarithmicæ, quàm sit data altera ratio.

Hypoth.

Sit data quælibet ratio non numerosa; cuius maior terminus a , minor b : & sit data altera ratio inæqualitatis; cuius maior terminus c , minor d .

Oportet inuenire duas rationes numerosas, altiorem, quàm a ad b , & depressiorem, quàm a ad b ; logarithmicè proportionales, vt numerus ad numerum: sed vt altior ad depressiorem logarithmicè sit minor, quàm vt c ad d .

Constr.

75. b . | Inueniatur ratio numerosa e ad f , depressior, quàm c ad d : sumaturque numerus g , pariter par,
ma-

53. 3. maior quàm e : & quotus est g , subtuplicata, rationis a ad b , ratio inueniatur h ad i : & inueniatur numerosa ratio K ad l , depressior, quàm h ad i : & rationis K ad l , sumantur duplicata, triplicata, & deinceps reliquæ multiplicatæ, donec fiat ratio M , primò altior, quàm a ad b : & sit multiplicationis numeris m : qui vnitate multatus, relinquatur n : & quotus est n , totuplicata, rationis K ad l , fiat ratio N .

Dico rationem N depressiorem esse, quàm a ad b : & M ad N logarithmicè minorem esse, quàm vt e ad d .

Demonstr.

Si enim ratio N , non esset depressior, quàm a ad b : esset vel æquealta, vel altior. Sed non est altior alioquin M , non esset primò altior, quàm a ad b . neque est æquealta, alioquin esset eadem, atque a ad b : & esset etiam a ad b ratio numerosa, contra hypothesim. Ergo ratio N , est depressior, quàm a ad b .

19. 4. Deinde quoniam K ad l , est depressior, quàm h ad i : & h ad i , totuplicata quotus est g , est a ad b : ergo K ad l , totuplicata quotus est g , est depressior, quàm a ad b . sed K ad l , totuplicata quotus est m , est altior, quàm a ad b . Ergo numerus m , maior est, quàm g : sed g , est maior, quàm e : ergo m , multò est maior, quàm e : & est m ad vnitatem, maior, quàm e ad eandem vnitatem: & per conuersionem rationis, m ad n , mi-

nor

constr. | nor est, quàm e ad f . Sed vt m ad n , ita logari-
 17. 4. | thmicè est ratio M ad rationem N . ergo ratio
 | M ad rationem N , minor est logarithmicè, quàm
 | vt e ad f . & multò minor, quàm vt c ad d . Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 70. Prop. 78.

Non numerosæ rationis vna tantùm. quantitas est lo-
 garithmus.

Hypoth. p.

Estò ratio a ad b non numerosa: sintque duæ quanti-
 tates inæquales, c maior, d minor: quarum vna c , esto lo-
 garithmus rationis a ad b .

Dico d , non esse logarithmum rationis a ad b .

Prepar.

77. b. | Inueniantur duæ rationes numerosæ, E altior,
 | quàm a ad b , & F depressior: vt sit E ad F , lo-
 | garithmicè sicut numerus ad numerum, & minor,
 | quàm vt c ad d . & assignentur ipsarum E , F ra-
 | tionum, logarithmi e , f .

Demonstr.

prepar. | E ; F : logarithmicè minor, quàm c ; d .

74. b. | E ; F : e ; f .

17. 4. | e ; f : minor, quàm c ; d .

def. 34b | e : maior, quàm c .

63. b. | f : maior, quàm d .

def. 34b | d , non est logarithmus rationis a ad b . Quod &c.

*Hypoth. 2.*Esto d , logarithmus rationis a ad b .Dico c , non esse logarithmum rationis a ad b .*Demonstr.*

sup. | e ; f : minor, quàm c ; d .
 $2.3.$ | f ; e : maior, quàm d ; c .
 def. 34b | f : minor, quàm d .
 $64. b.$ | e : minor, quàm c .
 def. 34b | c , non est logarithmus rationis a ad b . Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 71. Prop. 79.

Non numerosarum rationum, altioris maior est logarithmus, & depressioris minor.

Hypoth.

Sunt non numerosæ rationes, A altior, B depressior: & esto ipsius A , logarithmus a ; & ipsius B , logarithmus b .

Dico a , maiorem esse, quàm b .*Præpar.*

$76. b.$ | Inter A, B rationes, inueniatur numerosa ratio C , depressior, quàm A , altior quàm B : cuius logarithmus esto c .

Demonstr.

ef. 34b | a : maior est, quàm c .
 def. 34b | c : maior, quàm b .
 a : maior, quàm b . Quod &c. Quare &c.

Theor. 72. Prop. 80.

Multiplicatarum rationum, sunt æquemultiplices logarithmi.

Hypoth.

Est ratio *A* rationis *B* triplicata: & esto rationis *A*, logarithmus *a*; & rationis *B*, logarithmus *b*.

Dico *a* ad *b* triplicem esse.

Hypothesis contradictoria in primo casu.

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | <i>c</i> | | <i>d</i> | | | |
| <i>E</i> | <i>A</i> | <i>F</i> | | | <i>G</i> | <i>B</i> | <i>H</i> |
| <i>e</i> | <i>a</i> | <i>f</i> | | | <i>g</i> | <i>b</i> | <i>h</i> |

Esto si fieri potest *a* maior, quàm triplex ad *b*.

Prepar.

76. b. | Inter rationem *a* ad *b* altiorem, & rationem tri-
 77. b. | plicem depressiorem, ratio numerosa sumatur *c* ad
 | *d*, depressior, quàm *a* ad *b*, altior, quàm triplex,
 | & vt *a*, sit maior, quàm *c*; & *d*, maior, quàm *b*.
 | Et inueniantur duæ numerosæ rationes, *E* altior
 | quàm *A*, & *F* depressior: vt sit *E* ad *F* logari-
 | thmicè sicut numerus ad numerum, & minor, quàm
 77. b. | vt *a* ad *c*. Item inueniantur duæ numerosæ ratio-
 | nes, *G* altior quàm *B*; & *H* depressior; vt sit *G*
 | ad *H* logarithmicè sicut numerus ad numerum, &
 | minor quàm vt *d* ad *b*. Sint autem rationum *E*,
 | *F*, *G*, *H*, logarithmi *e*, *f*, *g*, *h*.

d r o s t y

E A F G B H
e a f g b

Demonstr.

- prepar.* A: altior, quàm F.
14. 4. A; B: logarithmicè maior, quàm F; B.
- prepar.* G: altior, quàm B.
14. 4. F; B: logarithmicè maior, quàm F; G.
17. 4. A; B: logarithmicè maior, quàm F; G.
- hypoth.* A; B: triplicata.
17. 4. F; G: depressior, quàm triplicata.
74. h. F; G: logarithmicè f; g.
17. 4. f; g: minor, quàm triplex.
- prepar.* E; F: logarithmicè minor, quàm a; c.
74. h. E; F: logarithmicè e; f.
17. 4. e; f: minor, quàm a; c.
- def. 34b* e: maior, quàm a.
63. h. f: maior, quàm c.
- prepar.* G; H: logarithmicè minor, quàm d; b.
74. b. g; h: logarithmicè G; H.
17. 4. g; h: minor, quàm d; b.
2. 3. h; g: maior, quàm b; d.
- def. 32b* h: minor, quàm b.
64. h. g: minor, quàm d.
67. h. f; g: maior, quàm c; d.
- prepar.* c; d: maior, quàm triplex.

f; g.

13. 5. | f g : maior, quàm triplex. } quæ sunt contradi-
 sup. | f g : minor, quàm triplex. } ctoria.

Ergo a ad b , non est maior, quàm triplex.

Hypoth. contrad. in secundo casu.

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| c | E | A | F | | G | B | H | d |
| | e | a | f | | g | b | h | |

Esto si fieri potest a minor, quàm triplex ad b .

Præpar.

76. b. | Inter rationem a ad b depressiorem, & ratio-
 nem triplicem altiorem ratio numerosa sumatur
 c ad d , depressior, quàm triplex; altior, quàm a
 ad b : & vt c sit maior quàm a : & b maior, quàm
 77. b. | d . Et inueniantur duæ numerosæ rationes, E al-
 tior quàm A , & F depressior; vt sit E ad F lo-
 garithmicè, sicut numerus ad numerum, & minor,
 77. b. | quàm vt c ad a . Item inueniantur duæ numero-
 sæ rationes; G altior, quàm B ; & H , depressior;
 vt sit G ad H , logarithmicè sicut numerus ad nu-
 merum, & minor, quàm vt b ad d . Sint autem ra-
 tionum E, F, G, H , logarithmi e, f, g, h .

Demonstr.

præpar. E : altior, quàm A .

14. 4. $E; H$: logarithmicè maior, quàm $A; H$.

præpar. B : altior, quàm H .

14. 4. $A; H$: logarithmicè maior, quàm $A; B$.

17. 4. $E; H$: logarithmicè maior, quàm $A; B$.

$A; B$:

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| E | A | F | | G | B | H |
| e | a | f | | g | b | h |

| | |
|-----------------|--|
| <i>hypoth.</i> | $A; B$: triplicata. |
| 17. 4. | $E; H$: maior, quàm triplicata. |
| 74. b. | $e; h$: logarithmicè vt $E; H$. |
| 17. 4. | $e; h$: maior, quàm triplex. |
| <i>prepar.</i> | $E; F$: minor, quàm $c; a$. |
| 74. b. | $E; F$: logarithmicè vt $e; f$. |
| 17. 4. | $e; f$: minor, quàm $c; a$. |
| 2. 3. | $f; e$: maior, quàm $a; c$. |
| <i>def. 34b</i> | f : minor, quàm a . |
| 64. b. | e : minor, quàm c . |
| <i>prepar.</i> | $G; H$: logarithmicè minor, quàm $b; d$. |
| 74. b. | $g; h$: logarithmicè, vt $G; H$. |
| 17. 4. | $g; h$: minor, quàm $b; d$. |
| <i>def. 32b</i> | g : maior, quàm b . |
| 63. b. | h : maior, quàm d . |
| 67. b. | $e; h$: minor, quàm $c; d$. |
| <i>prepar.</i> | $c; d$: minor, quàm triplex. |
| 13. 5. | $e; h$: minor, quàm triplex. } quæ sunt contradi- |
| <i>inp.</i> | $e; h$: maior, quàm triplex. } ctoria. |

Ergo a ad b , non est minor, quàm triplex.

Ergo a ad b est triplex. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 73. Prop. 81.

OMnifariam rationes, logarithmicam inter se rationem habentes, logarithmicè sunt proportionales, vt earum logarithmi. *Hypoth.*

Dico A ad B , esse logarithmicè, sicut a ad b .

Sunt rationes A , B , logarithmicam inuicem rationem habentes: & esto rationis A , logarithmus a ; & rationis B , logarithmus b .

Præpar.

Rationis A , & quantitatis a , sumantur multiplicata ratio $3A$, & æquemultiplex quantitas $3a$: item rationis B , & quantitatis b , multiplicata $4B$, & æquemultiplex $4b$.

Demonstr.

hypoth. | Rationis A , logarithmus est a .

80. *b.* | Rationis $3A$, logarithmus est $3a$.

hypoth. | Rationis B , logarithmus est b .

80. *b.* | Rationis $4B$, logarithmus est $4b$.

def. 34b | Si $3A$, est altior, quàm $4B$; etiam $3a$, est maior, quàm $4b$: si depressior; minor: si æquealta; æqualis.

def. 8.4. | A ad B , est logarithmicè, sicut a ad b . Quod &c. Quare &c.

Theor. 74. Prop. 82.

DVarum quarumlibet numerosarum rationum, hyperlogarithmus vnus ad hypologarithmum alterius, maior est, quàm vt logarithmus ad logarithmum.

De-

Demonstr.

def. 2. 4^{ta} | Est enim hyperlogarithmus vnus, eiusdem lo-
 8. 5. | garithmo maior: & est hypologarithmus alterius,
 p. 3. | minor eiusdem logarithmo. Ergo hyperlogari-
 | thmus ad logarithmum vnus, maior est, quàm vt
 | hypologarithmus ad logarithmum alterius. Quare
 | permutando, vnus hyperlogarithmus ad hypo-
 | logarithmum alterius, maior est, quàm vt logari-
 | thmus ad logarithmum.

Probl. 9. Prop. 83.

DVarum datarum non æquealtarum numerosarum
 rationum, datis terminis altioris: inuenire termi-
 nos depressioris, inter quos ad hyperlogarithmum, maior
 sit hyperlogarithmus altioris, quàm vt logarithmus ad lo-
 garithmum.

Hypoth.

Sint datæ duæ non æquealtæ numerosæ rationes, *A* al-
 tior, *B* depressior: sintque rationis *A*, dati termini *c*, *d*.

Oportet rationis *B* terminos inuenire, inter quos ad
 hyperlogarithmum, maior est hyperlogarithmus inter *c*,
d; quàm vt logarithmus *A* ad logarithmum *B*.

Constr.

Sumatur inter *c*, *d*, hyperlogarithmus *e*: & in-
 ter alios quoslibet eiusdem rationis *A* terminos
 74. b. | minores, quàm *c*, *d*, sumatur alius minor hyper-
 61. b. | logarithmus *f*: & inueniantur termini *g*, *h*, in ra-
 | tione

cione B , inter quos hyperlogarithmus i , ad hypologarithmum K , propior sit æqualitati, quàm vt e ad f .

Dico e ad i maiorem esse, quàm vt logarithmus rationis A , ad logarithmum rationis B .

Præpar.

Esto a , logarithmus rationis A : & b , logarithmus rationis B .

Demonstr.

def. 24b | f : maior est, quàm a .

B. 5. | e ; a : maior, quàm e ; f .

constr. | e ; f : maior, quàm i ; k .

def 24b. | b : maior, quàm k .

-B. 5. | i ; k : maior, quàm i ; b .

13. 5. | e ; a : maior, quàm i ; b .

p. 3. | e ; i : maior, quàm a ; b . Quod &c.

Quare &c.

Probl. 10. Prop. 84.

DVarum datarum non æquealtarum numerosarum rationum, datis terminis depressioris: inuenire terminos altioris, inter quos hyperlogarithmus, ad hyperlogarithmum depressioris, minor sit, quàm vt logarithmus ad logarithmum.

Hypoth.

Sint datæ duæ non æquealtæ numerosæ rationes, A altior, B depressior: sintque rationis B dati termini c , d .

Oportet rationis A terminos inuenire, inter quos hyper-

perlogarithmus, ad hyperlogarithmum inter c , d minor est, quàm vt logarithmus A ad logarithmum B .

Constr.

Sumatur inter c , d , hyperlogarithmus e & inter alios quoslibet minores terminos, quàm c , d , sumatur eiusdem rationis B alius minor hyperlogarithmus f : rationis autem A , inueniantur termini, g , h , inter quos hyperlogarithmus i , ad hypologarithmum k , minor sit, quàm vt e ad f .

Dico i ad e , minorem esse, quàm vt logarithmus A ad logarithmum B .

Præpar.

Esto a , logarithmus rationis A : & b , logarithmus rationis B .

Demonstr.

def. 24b | a : maior est, quàm K .
 8. 5. | i ; a : minor, quàm i ; K .
 constr. | i ; K : minor, quàm e ; f .
 def. 24b | b : minor, quàm f .
 8. 5. | e ; f : minor, quàm e ; b .
 13. 5. | i ; a : minor, quàm e ; b .
 p. 3. | i ; e : minor, quàm a ; b . Quod &c.
 Quare &c.

Probl. II. Prop. 85.

DVarum datarum non æquealtarum numerosarum rationum, datis terminis altioris: inuenire terminos

nos depressioris, inter quos ad hypologarithmum minor fit hypologarithmus altioris, quàm vt logarithmus ad logarithmum.

Hypoth.

Sint datae duae non aequaltae rationes numerosae, *A* altior, *B* depressior: sintque rationis *A* dati termini *c*, *d*.

Oportet rationis *B* terminos inuenire, inter quos ad hypologarithmum minor fit hypologarithmus inter *c*, *d*, quàm vt logarithmus *A* ad logarithmum *B*.

Constr.

Sumatur inter *c*, *d*, hypologarithmus *e*: & inter alios terminos eiusdem rationis *A*, minores quàm *c*, *d*, sumatur alius maior hypologarithmus *f*: & inueniantur in ratione *B*, termini *g*, *h*; inter quos hypologarithmus *i* ad hyperlogarithmum *k* maior sit, quàm vt *e* ad *f*.

Dico *e* ad *i*, minorem esse, quàm vt logarithmus *A* ad logarithmum *B*.

Prepar.

Esto *a*, logarithmus rationis *A*: & *b*, logarithmus rationis *B*.

Demonstr.

constr. | *c*; *f*: minor, quàm *i*; *K*.
p. 3. | *c*; *i*: minor, quàm *f*; *K*.
def. 24b | *K*: maior, quàm *b*.
8. 5. | *f*; *K*: minor, quàm *f*; *b*.
def. 24b | *a*: maior, quàm *f*.

- 8.5. | $f; b$: minor, quàm $a; b$.
 13.5. | $e; i$: minor, quàm $a; b$. Quod &c.
 Quare &c.

Probl. 12. Prop. 86.

DVarum datarum non æquealtarum numerosarum rationum, datis terminis depressioris: inuenire terminos altioris, inter quos hypologarithmus ad hypologarithmum depressioris, maior sit, quàm vt logarithmus ad logarithmum.

Hypoth.

Sint datæ duæ non æqualtæ numerosæ rationes, A altior, B depressior: sintque rationis B dati termini c, d .

Oportet rationis A terminos inuenire, inter quos hypologarithmus ad hypologarithmum inter c, d , maior est, quàm vt logarithmus A ad logarithmum B .

Constr.

Sumatur inter c, d , hypologarithmus e : & inter alios minores terminos, eiusdem rationis B , sumatur alius maior hypologarithmus f : & rationis A , inueniantur termini g, h , quos inter hypologarithmus i ad hyperlogarithmum K maior sit, quàm vt e ad f .

Dico i ad e , maiorem esse, quàm vt logarithmus A ad logarithmum B .

Præpar.

Esto rationis A , logarithmus a : & rationis B logarithmus b .

De

Demonstr.

constr. | $i; K$: maior est, quàm $e; f$.
p. 3. | $i; e$: maior, quàm $K; f$.
def. 2.4b | b : maior, quàm f .
8. 5. | $K; f$: maior, quàm $K; b$.
def. 2.4b | K : maior, quàm a .
8. 5. | $K; b$: maior, quàm $a; b$.
13. 5. | $i; e$: maior, quàm $a; b$. Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 75. Prop. 87.

A Rithmeticè dispositorum terminorum ratio, quàm habent bini minores ad inuicem; altior est ratione, quàm habent bini maiores.

Hypoth.

4. h. | Sint arithmeticè dispositæ quantitates a, b, c, d :
def. 5. b. | & sit a minor, quàm c . vnde quoniam permutando a, c, b, d , sunt arithmeticè dispositæ, etiam b est minor, quàm d .

Dico rationes terminorum a, b ad inuicem, altiores esse rationibus c, d ad inuicem.

Præpar.

Quoniam a, b sunt inæquales; esto a minor, quàm b : & sit defectus e .

Demonstr.

sup. | b : minor, quàm d .
8. 5. | $b; e$: minor, quàm $d; e$.

$b; a$

| | |
|-------------------|---|
| 3. 3. | b ; a : maior, quàm d ; c . |
| <i>hypoth.</i> | b : maior, quàm a . & d : maior, quàm c . |
| <i>def. p. 4.</i> | b ; a : altior, quàm d ; c . Quod &c. |
| 2. 3. | a ; b : minor, quàm c ; d . |
| <i>hypoth.</i> | a : minor, quàm b . & c : minor, quàm d . |
| <i>def. p. 4.</i> | a ; b : altior, quàm c ; d . Quod &c. |
| | Quare &c. |

Theor. 76. Prop. 88.

Harmonicè dispositum terminorum ratio, quàm habent bini maiores ad inuicem, altior est ratione, quàm habent bini minores.

Hypoth.

34. b. | Sint harmonicè dispositæ quantitates a, b, c, d :
def. 13b | & sit a maior, quàm c . vnde quoniam permutando
 | a, c, b, d , sunt harmonicè dispositæ, etiam b , est
 | maior, quàm d .

Dico rationes terminorum a, b ad inuicem, altiores esse rationibus c, d ad inuicem.

Prepar.

Sumatur vna quælibet quantitas e : & fiat

a ; e : e ; f .

b ; e : e ; g .

c ; e : e ; h .

d ; e : e ; i .

Demonstr.

33. *h.* | *f, g, g, i* sunt arithmetice ordinate.
constr. | *c; e; e; h. e; a; f; e.*
p. p. | *c; a; f; h.*
def. 5. h. | *c* minor, quam *a.* & *f* minor, quam *h.*
87. h. | *g* minor, quam *i.*
sup. | *f; g* altior, quam *h; i.* & *g; f* altior, quam *i; h.*
sup. | *f; g* *b; a.* & *g; f* *a; b.*
sup. | *h; i; d; c.* & *i; h; c; d.*
b; a altior, quam *d; c.* & *a; b* altior, quam
i; d. Quod &c. Quare &c.

Theor. 77. Prop. 89.

SI fuerint quotcunque magnitudines, & aliæ ipsis æquales numero; sitque maior proportio primæ priorum, ad primam posteriorum, quam secundæ, ad secundam; & hæc maior, quam tertiæ, ad tertiam: & sic deinceps: habebunt omnes priores simul, ad omnes posteriores simul, maiorem rationem, quam omnes priores, relicta prima, ad omnes posteriores, relicta quoque prima: & multò maiorem, quam omnes priores, relicta duabus primis, ad omnes posteriores, relicta duabus primis: & sic deinceps etiam maiorem, quam vltima, ad vltimam: sed minorem, quam omnes priores, relicta vltima, ad omnes posteriores, relicta etiam vltima: & multò minorem, quam omnes priores, relicta duabus vltimis, ad omnes posteriores, relicta pariter duabus vltimis: & sic deinceps etiam minorem, quam prima, ad primam.

Hy-

Hypoth.

a e
 b f
 c g
 d h

a ; e : maior, quàm b ; f .

b ; f : maior, quàm c ; g .

c ; g : maior, quàm d ; h .

Dico $a+b+c+d$; $e+f+g+h$: maiorem esse, quàm $b+c+d$; $f+g+h$.

Et $b+c+d$; $f+g+h$: maiorem, quàm $c+d$; $g+h$.

Et $c+d$; $g+h$: maiorem, quàm d ; h .

Dico etiam $a+b+c+d$; $e+f+g+h$: minorem esse, quàm $a+b+c$; $e+f+g$.

Et $a+b+c$; $e+f+g$: minorem, quàm $a+b$; $e+f$.

Et $a+b$; $e+f$: minorem, quàm a ; e .

Demonstr.

hypoth. c ; g : maior, quàm d ; h .

p. 3. c ; d : maior, quàm g ; h .

p. 3. $c+d$; d : maior, quàm $g+h$; h .

p. 3. $c+d$; $g+h$: maior, quàm d ; h . *Quod &c.*

3. 3. $c+d$; e : minor, quàm $g+h$; g .

2. 3. c ; $c+d$: maior, quàm g ; $g+h$.

p. 3. c ; g : maior, quàm $c+d$; $g+h$.

hypoth. b ; f : maior, quàm c ; g .

13. 5. b ; f : maior, quàm $c+d$; $g+h$.

p. 3. b ; $c+d$: maior, quàm f ; $g+h$.

 $b+c$

- p. 3. $b+c+d$; $c+d$: maior, quàm $f+g+h$; $g+h$.
- p. 3. $b+c+d$; $f+g+h$: maior, quàm $c+d$; $g+h$. Quod &c.
- sup. $a+b+c+d$; $e+f+g+h$: maior, quàm $b+c+d$; $f+g+h$. Quod &c.
- hypoth. a ; e : maior, quàm b ; f .
- p. 3. a ; b : maior, quàm e ; f .
- p. 3. $a+b$; b : maior, quàm $e+f$; f .
3. 3. $a+b$; a : minor, quàm $e+f$; e .
- p. 3. $a+b$; $e+f$: minor, quàm a ; e . Quod &c.
- sup. $a+b$; b : maior, quàm $e+f$; f .
- p. 3. $a+b$; $e+f$: maior, quàm b ; f .
- hypoth. b ; f : maior, quàm c ; g .
13. 5. $a+b$; $e+f$: maior, quàm c ; g .
- p. 3. $a+b$; c : maior, quàm $e+f$; g .
- p. 3. $a+b+c$; c : maior, quàm $e+f+g$; g .
3. 3. $a+b+c$; $a+b$: minor, quàm $e+f+g$; $e+f$.
- p. 3. $a+b+c$; $e+f+g$: minor, quàm $a+b$; $e+f$.
Quod &c.
- sup. $a+b+c+d$; $e+f+g+h$: minor, quàm $a+b+c$; $e+f+g$. Quod &c.
- Quare &c.

Theor. 78. Prop. 90.

E Serie harmonica naturali ab unitate, terminorum harmonicè dispositorum, altioris rationis maior terminus, ad maiorem depressioris, maior est, quàm ut hyperlogarithmus, ad hyperlogarithmum: & hyperlogarithmus,

Qq

thmus,

thmus, ad hyperlogarithmum, maior, quàm vt hypologarithmus, ad hypologarithmum : & hypologarithmus, ad hypologarithmum maior, quàm vt minor terminus, ad minorem.

Hypoth.

Sint è serie harmonica naturali ab vnitare, termini harmonicè dispositi a, b, c, d , quorum altior sit ratio a ad b , quàm c ad d . Sitque a , maior, quàm b : ideoque & c , maior, quàm d .

Quoniam a ad b , altior est, quàm c ad d : oportet a , maiorem esse, quàm c ; & b , quàm d . alioquin permutando, dispositorem harmonicè a, c, b, d , esset c maior, quàm a ; ideoque & d maior, quàm b ; & c ad d , altior ratio, quàm a ad b , contra *hypoth.*

Deinde quoniam a, b, c, d , sunt in serie harmonica naturali ab vnitare, harmonicè dispositi; sunt denominati à numeris arithmeticè dispositis: quorum denominator a , reciprocè minor est denominatore b , necnon reciprocè minor denominatore c . & quot sunt numeri omnes medij inter denominatores a, b , totidem sunt inter denominatores c, d : totidemque in serie harmonica sunt inter a, b ; totidemque etiam inter c, d .

Sint ergo inter a, b termini e, f : & inter c, d , totidem termini g, h : eritque $a+e+f$, hyperlogarithmus rationis a , ad b ; & $e+f+b$, hypologi-

garithmus eiusdem rationis, inter eosdem terminos a, b .
erit quoque $c+g+h$, hyperlogarithmus rationis c ad d ; &
 $g+h+d$, eiusdem hypologarithmus inter eosdem termi-
nos c, d .

Dico a ad c , maiorem esse, quàm $a+e+f$ ad $c+g+h$:

Et $a+e+f$ ad $c+g+h$, maiorem, quàm $e+f+b$ ad
 $g+h+d$.

Et $e+f+b$ ad $g+h+d$, maiorem, quàm b ad d .

Demonstr.

hypoth. | Quoniam a, e, f, b , necnon c, g, h, d , sunt
harmonice ordinati, in serie harmonica naturali
27. b. | ab unitate: ergo eorum denominatores, sunt arith-
metice ordinati, in serie arithmetica naturali ab
sup. | unitate: totidemque sunt a, e, f, b ; quot $c, g, h,$
def. 8. b. | d : ergo denominatores a, e, f, b ; sunt similiter
arithmetice dispositi, atque denominatores $c, g,$
16. h. | h, d : ergo etiam a, e, f, b sunt similiter harmoni-
def. 16b | ce dispositi, atque c, g, h, d : ergo a, e, c, g sunt
34. b. | harmonice dispositi: ergo permutando a, c, e, g ,
sunt harmonice dispositi. Similiter ostendetur,
quod e, g, f, h sunt harmonice dispositi: necnon
 f, h, b, d .

def. 19b | Rursum quoniam a, e, f, b sunt harmonice or-
dinati, & est a maior, quàm b : ergo a maior, est
quàm e ; & e , maior, quàm f : & f , quàm b : item
sup. | c , maior est quàm g ; g , quàm h ; h , quàm d . Et
hypoth. | quoniam a, c, e, g sunt harmonice dispositi, & est

def. 13b | a , maior, quàm c ; ergo & e , maior est, quàm g ;
 82. h. | item f , quàm h ; & b , quàm d . & est a ad e ratio
 def. p. 4. | altior, ideoque maior, quàm e ad g ; & e ad g , al-
 tior, & maior, quàm f ad h ; & f ad h , altior, &
 maior, quàm b ad d .

83. h. | Ergo a ad c maior est, quàm vt $a+e+f$ ad
 $c+g+h$. Quod &c. Et est $a+e+f$ ad $c+g+h$ ma-
 ior, quàm $e+f$ ad $g+h$; & $e+f$ ad $g+h$ maior,
 quàm $e+f+b$ ad $g+h+d$; ergo $a+e+f$ ad $c+g$
 $+h$, est maior, quàm $e+f+b$ ad $g+h+d$. Quod
 &c. Et est $e+f+b$ ad $g+h+d$, maior, quàm b
 ad d . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 79. Prop. 91.

SI quatuor quantitatuum prima ad secundam maior fue-
 rit, quàm tertia ad quartam: productus extremarum,
 maior est producto mediarum.

Hypoth.

a ; b : maior, quàm c ; d .

Dico *ad*: maiorem esse, quàm *bc*.

Prepar.

Fiat productus *bd*.

Demonstr.

9. b. | *ad*; *bd*: a ; b .

9. b. | *bc*; *bd*: c ; d .

hypoth. | a ; b : maior, quàm c ; d .

ad;

13. 5. | *ad; bd: maior, quàm bc; bd.*
 10. 5. | *ad: maior, quàm bc. Quod &c.*
 Quare &c.

Theor. 80. Prop. 92.

SI quatuor quantitatum productus extremarum maior fuerit producto mediarum: erit prima ad secundam maior, quàm vt tertia ad quartam.

Hypoth.

Sunt quatuor quantitates *a, b, c, d:* & est *ad* maior, quàm *bc.*

Dico *a; b;* maiorem esse, quàm *c; d.*

Prepar.

Assumatur productus *bd.*

Demonstr.

hypoth. | *ad: maior, quàm bc.*
 8. 5. | *ad; bd: maior, quàm bc; bd.*
 9. b. | *ad; bd: a; b.*
 9. b. | *bc; bd: c; d.*
 13. 5. | *a; b: maior, quàm c; d. Quod &c.*
 Quare &c.

Theor. 81. Prop. 93.

SI fuerit prima ad secundam, maior, quàm vt tertia ad quartam: fuerit autem & tertia ad quartam maior, quàm vt quinta ad sextam: item quinta ad sextam maior fuerit, quàm vt septima ad octauam: erit composita prima

CUM

cum tertia, ad compositam secundam cum quarta, maior, quàm ut composita quinta cum septima, ad compositam sextam cum octava.

Hypoth.

a b
c d
e f
g h

a; b: maior, quàm c; d.
c; d: maior, quàm e; f.
e; f: maior, quàm g; h.

Dico a+c; b+d: maiorem, quàm e+g; f+h.

Prepar.

Fiant producti af, ah, cf, ch, be, bg, de, dg.

Demonstr.

29. h. { af+ah: productus a per f+h.
 { cf+ch: productus c per f+h.
 { af+ah+cf+ch: productus a+c per f+h.
 { be+bg: productus b, per e+g.
 { de+dg: productus d, per e+g.
 { be+bg+de+dg, productus b+d, per e+g.

hypoth. a; b: maior, quàm c; d.

hypoth. c; d: maior, quàm e; f.

13. 5. a; b: maior, quàm e; f.

hypoth. e; f: maior, quàm g; h.

13. 5. a; b: maior, quàm g; h.

13. 5. c; d: maior, quàm g; h.

af:

93. b. $\left\{ \begin{array}{l} af: \text{ maior, quàm } be. \\ ab: \text{ maior, quàm } bg. \\ cf: \text{ maior, quàm } de. \\ ch: \text{ maior, quàm } dg. \end{array} \right.$
94. b. $\left\{ \begin{array}{l} af+ab+cf+ch: \text{ maior, quàm } be+bg+de+dg. \\ a+c; b+d: \text{ maior, quàm } e+g; f+h. \text{ Quod \&c.} \end{array} \right.$
- Quare &c.

Theor. 82. Prop. 94.

SI fuerint è serie harmonica naturali ab vnitare, quatuor termini harmonicè dispositi; & alij quatuor eorum submultipli: inter simplos terminos altioris rationis hyperlogarithmus, ad hyperlogarithmum depressioris, maiorem habebit rationem, quàm inter submultiplos. hypologarithmus verò inter simplos altioris, ad inter simplos depressioris, minorem habebit, quàm inter submultiplos.

Hypoth.

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1(3) | 1(4) | 1(5) | 1(6) | | | |
| 1(6) | 1(7) | 1(8) | 1(9) | 1(10) | 1(11) | 1(12) |
| 1(7) | 1(8) | 1(9) | 1(10) | | | |
| 1(14) | 1(15) | 1(16) | 1(17) | 1(18) | 1(19) | 1(20) |

Sint è serie harmonica naturali ab vnitare, quatuor termini harmonicè dispositi 1(3), 1(6), 1(7), 1(10): quorum 1(3), maior, quàm 1(6): ideo-

1(3) 1(4) 1(5) 1(6)
 1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12)

1(7) 1(8) 1(9) 1(10)
 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) 1(19) 1(20)

def. 13b | ideoq; & 1(7), maior, quàm 1(10). & esto altior
def. p. 4. | ratio 1(3) ad 1(6), quàm 1(7) ad 1(10): ideo-
36. h. | que etiam maior. sint autem & istorum æque-
15. 5. | submultipli, 1(6), 1(12), 1(14), 1(20), pa-
 riter harmonicè dispositi, & æquè cum prædictis
 proportionales. Sumantur etiam inter 1(3), 1-
 (6) medij omnes harmonici 1(4), 1(5): & inter
 1(7), 1(10), medij omnes 1(8) 1(9); quorum
 æque submultipli 1(8), 1(10), 1(16), 1(18).
def. 16b | Constat quod sicut 1(3), 1(4), 1(5), 1(6), &
def. 19b | similiter 1(7), 1(8), 1(9), 1(10) harmonicè
 sunt ordinati, sic 1(6), 1(8), 1(10), 1(12), &
15. 5. | similiter 1(14), 1(16), 1(18), 1(20) sunt har-
 monicè ordinati, & æquè cum prædictis propor-
 tionales. Deinde inter 1(6), 1(12), & inter
 1(14), 1(20) sumantur omnes reliqui medij har-
 monici 1(7), 1(9), 1(11), & 1(15), 1(17),
 1(19).

Dico primò $1(3) + 1(4) + 1(5)$ ad $1(7) + 1(8) + 1(9)$
 maiorem esse; quàm $1(6) + 1(7) + 1(8) + 1(9) + 1(10)$
 $+ 1(11)$ ad $1(14) + 1(15) + 1(16) + 1(17) + 1(18) + 1-$
 (19).
 De-

Demonstr.

sup. (I(3); I(7): I(6); I(14).

88. *b.* I(6); I(14): maior, quàm I(7); I(15).

89. *b.* I(6); I(14): maior, quàm I(6)+I(7); I(14)
+I(15).

13. 5. I(3); I(7): maior, quàm I(6)+I(7); I(14)
+I(15).

Similiter demonstrabitur.

sup. I(4); I(8): maior, quàm I(8)+I(9); I(16)
+I(17). Et

sup. I(5); I(9): maior, quàm I(10)+I(11); I(18)
+I(19).

89. *b.* I(6)+I(7); I(14)+I(15): maior, quàm I(8);
I(16).

sup. I(8); I(16): I(4); I(8).

13. 5. I(6)+I(7); I(14)+I(15): maior, quàm I(4);
I(8).

Similiter demonstrabitur.

sup. I(8)+I(9); I(16)+I(17): maior, quàm I(5);
I(9). Et

sup. I(6)+I(7)+I(8)+I(9); I(14)+I(15)+I(16)
+I(17): maior, quàm I(5); I(9).

93. *b.* I(3)+I(4); I(7)+I(8): maior, quàm I(6)+I(7)
+I(8)+I(9); I(14)+I(15)+I(16)
+I(17).

Similiter demonstrabitur.

93. *b.* I(3)+I(4)+I(5); I(7)+I(8)+I(9): maior,
quàm

1(3) 1(4) 1(5) 1(6)
 1(6) 1(7) 1(8) 1(9) 1(10) 1(11) 1(12)

1(7) 1(8) 1(9) 1(10)
 1(14) 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) 1(19) 1(20)

quàm 1(6)+1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11); 1(14)
 +1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19): Quod &c.

Dico secundò 1(4)+1(5)+1(6); 1(8)+1(9)+1(10):
 maiorem esse, quàm 1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11)
 +1(12); 1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)+1(20).

Demonstr.

89. b. { 1(7)+1(8); 1(15)+1(16): maior, quàm 1(4);
 1(8).
 1(4); 1(8): maior, quàm 1(9)+1(10); 1(17)
 +1(18).
 1(9)+1(10); 1(17)+1(18): maior, quàm 1(5);
 1(9).
 93. b. { 1(7)+1(8)+1(9)+1(10); 1(15)+1(16)+1(17)
 +1(18): maior, quàm 1(4)+1(5); 1(8)+1(9).
 89. b. { 1(4)+1(5); 1(8)+1(9): maior, quàm 1(11)
 +1(12); 1(19)+1(20).
 89. b. { 1(11)+1(12); 1(19)+1(20): maior, quàm
 1(6); 1(10).
 93. b. { 1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11)+1(12); 1-
 (15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)+1(20):
 maior, quàm 1(4)+1(5)+1(6); 1(8)+1(9)+1(10).

Quod

Quod è conuerso est demonstrandum.

Quare &c.

Theor. 83. Prop. 95.

SI fuerint eiusdem rationis duo hyperlogarithmi, alter ex paucioribus, alter ex terminis vno pluribus; & submultiplicati fuerint vtrorumque termini, per alterius multitudinem terminorum: submultiplicati eius, qui ex paucioribus, & submultiplicati eius, qui ex pluribus, primi sunt æquales; & reliqui deinceps sunt minores, hoc ordine; secundus eius, qui ex pluribus; & secundus eius, qui ex paucioribus; & tertius eius, qui ex pluribus; & tertius eius, qui ex paucioribus; & sic deinceps. Quod si fuerint hypologarithmi: submultiplicati eius, qui ex paucioribus, & submultiplicati eius, qui ex pluribus, vltimi sunt æquales; & reliqui deinceps sunt maiores, hoc ordine; penultimus eius, qui ex pluribus; & penultimus eius, qui ex paucioribus; & tritultimus eius, qui ex pluribus; & tritultimus eius, qui ex paucioribus; & sic deinceps.

Hypoth.

| | | |
|---------|---------|---------|
| $1(a)$ | $1(b)$ | $1(c)$ |
| $1(d)$ | $1(e)$ | $1(f)$ |
| $1(3a)$ | $1(3b)$ | $1(3c)$ |
| $1(2d)$ | $1(2e)$ | $1(2f)$ |

Sint earundem rationum $1(a)$, ad $1(c)$, & $1(d)$. ad $1(g)$
 duo hyperlogarithmi; vnus ex duobus terminis $1(a)$, $1(b)$;

R r 2 alter

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1(a) | 1(b) | 1(c) |
| 1(d) | 1(e) | 1(f) |
| 1(3a) | 1(3b) | 1(3c) |
| 1(2d) | 1(2e) | 1(2f) |
| | | 1(2g) |

alter ex tribus 1(d), 1(e), 1(f): item duo hypologarithmi, ex duobus 1(b), 1(c), & ex tribus 1(e), 1(f), 1(g). & subtriplici accipiuntur 1(3a), 1(3b), 1(3c), necnon subdupli 1(2d), 1(2e), 1(2f), 1(2g).

Dico 1(3a), 1(2d) esse æquales: necnon 1(3c), 1(2g) esse æquales: & hoc ordine, priores maiores esse, & posteriores minores 1(3a), 1(2e), 1(3b), 1(2f), 1(3c).

Demonstr.

| | |
|--------|---|
| 24. b. | 1(a); 1(c): 1(d); 1(g): c; a; g; d |
| p. p. | c; g: a; d: c--a; g--d. |
| 27. b. | c--a: 2. g--d: 3. |
| 11. 5. | c; g: a; d: 2; 3. |
| 31. b. | 3c: 2g. 3a: 2d. |
| 10. b. | 1(3c): 1(2g). 1(3a): 1(2d). Quæ &c. |
| 6. b. | 2g--2f: 2f--2e: 2e--2d: 2. |
| 6. b. | 3c--3b: 3b--3a: 3. |
| | 3a, 2e, 3b, 2f, 3c sunt, hoc ordine, minores, & deinceps maiores. |
| 10. b. | 1(3a), 1(2e), 1(3b), 1(2f), 1(3c) sunt, hoc ordine, maiores, & deinceps minores. Quod &c. |
| | Quare &c. |

Theor. 84. Prop. 96.

SL fuerint è serie harmonica naturali ab vnitate, quatuor termini harmonicè dispositi; & alij quatuor eorum subdupli; alijque subtripli; & subquadrupli, & sic deinceps in infinitum: inter simplos terminos altioris, rationis hyperlogarithmus ad hyperlogarithmum depressois maiorem habet rationem, quàm inter subduplos: & inter subduplos, maiorem, quàm inter subtriplos; & sic deinceps. hypologarithmus verò inter simplos altioris, ad inter simplos depressois, minorem habet rationem, quàm inter subduplos; & inter subduplos, minorem, quàm inter subtriplos; & sic deinceps.

Hypoth.

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 1(3) | : | 1(4) | : | 1(5) | : | 1(16) |
| 1(6) | 1(7) | : | 1(8) | 1(9) | 1(10) | 1(11) 1(12) |
| 1(9) | 1(10) | 1(11) | 1(12) | 1(13) | 1(14) | 1(15) 1(16) 1(17) 1(18) |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 1(7) | | 1(8) | | 1(9) | | 1(10) |
| 1(14) | 1(15) | 1(16) | 1(17) | 1(18) | 1(19) | 1(20) |
| 1(21) | 1(22) | 1(23) | 1(24) | 1(25) | 1(26) | 1(27) 1(28) 1(29) 1(30) |

Sint è serie harmonica naturali ab vnitate, quatuor termini harmonicè dispositi 1(3), 1(6), 1(7), 1(10); quorum 1(3) maior, quàm 1(6); ideoque, & 1(7) maior, quàm 1(10). Et esto altior ratio 1(3) ad 1(6), quàm 1(7) ad 1(10). Sint autem istorum subdupli 1(6), 1(12), 1(14), 1(20): & subtripli 1(9), 1(18), 1(21), 1(30). inter quos accipiantur medij harmonici, & ex his Hyper-

loga-

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1(3) | | 1(4) | | 1(5) | | 1(16) |
| 1(6) | 1(7) | 1(8) | 1(9) | 1(10) | 1(11) | 1(12) |
| 1(9) | 1(10) | 1(11) | 1(12) | 1(13) | 1(14) | 1(15) |
| | | 1(8) | | 1(9) | | 1(10) |
| | 1(15) | 1(16) | 1(17) | 1(18) | 1(19) | 1(20) |
| 1(21) | 1(22) | 1(23) | 1(24) | 1(25) | 1(26) | 1(27) |
| | | | | 1(28) | 1(29) | 1(30) |

logarithmi, & Hypologarithmi.

94. b. | Constat primo, quòd inter simplos, maior est
 | hyperlogarithmus altioris, ad hyperlogarithmum
 | depressioris, quàm inter subduplos: & hypologa-
 | rithmus minor.

Dico $1(6)+1(7)+1(8)+1(9)+1(10)+1(11); 1(14)$
 $+1(15)+1(16)+1(17)+1(18)+1(19)$: maiorem esse,
 quàm $1(9)+1(10)+1(11)+1(12)+1(13)+1(14)+1(15)$
 $+1(16)+1(17); 1(21)+1(22)+1(23)+1(24)+1(25)$
 $+1(26)+1(27)+1(28)+1(29)$.

Præpar.

Sumantur ipsorum $1(6), 1(7), 1(4), 1(5)$ subtripli: &
 $1(9), 1(10), 1(11), 1(21), 1(22), 1(23)$ subdupli.

Demonstr.

95. b. | $1(18), 1(20), 1(21), 1(22)$ sunt maiores, & de-
 | inceps minores.

95. b. | $1(42), 1(44), 1(45), 1(46)$ sunt maiores, & de-
 | inceps minores.

40. b. | $1(18), 1(20), 1(21), 1(22); \& 1(42), 1(44), 1(45),$
 | $1(46)$ sunt similiter harmonicè dispositi.

$1(18),$

88. b. } $1(18)$; $1(42)$: maior, quàm $1(20)$; $1(44)$.
 } $1(20)$; $1(44)$: maior, quàm $1(21)$; $1(45)$.
 } $1(21)$; $1(45)$: maior, quàm $1(22)$; $1(46)$.

36. b. } $1(18)$, $1(22)$, $1(42)$, $1(45)$ similiter proportio-
 nales, atque $1(6)$, $1(7)$, $1(14)$, $1(15)$.
 } $1(18)$, $1(20)$, $1(22)$, $1(42)$, $1(44)$, $1(46)$ simi-
 liter proportionales, atque $1(9)$; $1(10)$, $1(11)$,
 $1(21)$, $1(22)$, $1(23)$.

89. b. } $1(6)$; $1(14)$: maior, quàm $1(9) + 1(10)$; $1(21) + 1(22)$.

89. b. } $1(9) + 1(10)$; $1(21) + 1(22)$: maior quàm $1(7)$;
 $1(15)$.

13. 5. } $1(7)$; $1(15)$: maior, quàm $1(11)$; $1(23)$.

} $1(11)$; $1(23)$: maior, quàm $1(8)$; $1(16)$.

} $1(8)$; $1(16)$: maior, quàm $1(12) + 1(13)$; $1(24)$

sup.

} $1(12) + 1(13)$; $1(24) + 1(25)$: maior, quàm $1(9)$;
 $1(17)$.

(Et sic deinceps quoad fuerint termini.

93. b. } $1(6) + 1(7) + 1(8) + 1(9) + 1(10) + 1(11)$; $1(14) + 1(15) + 1(16) + 1(17) + 1(18) + 1(19)$: maior, quàm

$1(9) + 1(10) + 1(11) + 1(12) + 1(13) + 1(14) + 1(15) + 1(16) + 1(17)$; $1(21) + 1(22) + 1(23) + 1(24) + 1(25) + 1(26) + 1(27) + 1(28) + 1(29)$.

Quod sic!

Dico etiam $1(7) + 1(8) + 1(9) + 1(10) + 1(11) + 1(12)$; $1(15) + 1(16) + 1(17) + 1(18) + 1(19) + 1(20)$: minorem esse,
 quàm $1(10) + 1(11) + 1(12) + 1(13) + 1(14) + 1(15)$

$- 1(16)$

$I(3)$ $I(4)$ $I(5)$ $I(6)$
 $I(6)$ $I(7)$ $I(8)$ $I(9)$ $I(10)$ $I(11)$ $I(12)$
 $I(9)$ $I(10)$ $I(11)$ $I(12)$ $I(13)$ $I(14)$ $I(15)$ $I(16)$ $I(17)$ $I(18)$

$I(7)$ $I(8)$ $I(9)$ $I(10)$
 $I(14)$ $I(15)$ $I(16)$ $I(17)$ $I(18)$ $I(19)$ $I(20)$
 $I(21)$ $I(22)$ $I(23)$ $I(24)$ $I(25)$ $I(26)$ $I(27)$ $I(28)$ $I(29)$ $I(30)$

$+I(16) + I(17) + I(18); I(22) + I(23) + I(24) + I(25)$
 $+ I(26) + I(27) + I(28) + I(29) + I(30).$

Demonstr.

$I(10); I(22)$: maior, quàm $I(7); I(15)$.

$I(7); I(15)$: maior, quàm $I(11) + I(12); I(13)$
 $+ I(14).$

sup. $I(11) + I(12); I(23) + I(24)$: maior, quàm $I(8);$
 $I(16).$

$I(8); I(16)$: maior, quàm $I(13); I(25).$

Et sic deinceps, quoad fuerint termini.

$93. b.$ $I(10) + I(11) + I(12) + I(13) + I(14) + I(15) + I(16)$
 $+ I(17) + I(18); I(22) + I(23) + I(24)$
 $+ I(25) + I(26) + I(27) + I(28) + I(29) + I(30)$
 : maior, quàm $I(7) + I(8) + I(9) + I(10)$
 $+ I(11) + I(12); I(15) + I(16) + I(17) + I(18)$
 $+ I(19) + I(20).$ Quod est probandum &c.

Quare &c.

Theor. 85. Prop. 97.

Eiusdem rationis numerosæ inter maiores terminos, maior est hyperlogarithmus ad hypologarithmum, quàm inter minores.

Demonstr.


4. h.
 7. h.
 6. h.
 8. s.

 Nam sunt maiores, & deinceps minores, hoc ordine, hyperlogarithmus inter maiores terminos, hyperlogarithmus inter minores, hypologarithmus inter minores, & hypologarithmus inter maiores. Quare inter maiores, hyperlogarithmus ad hypologarithmum, maior est, quàm inter minores.

Theor. 86. Prop. 98.

E serie harmonica naturali ab unitate, terminorum, harmonicè dispositorum, altioris rationis logarithmus ad logarithmum depressoris, minor est, quàm ut hyperlogarithmus ad hyperlogarithmum; & maior, quàm ut hypologarithmus ad hypologarithmum.

Hypoth. commun.



Sint è serie harmonica naturali ab unitate, quatuor termini *A, B, C, D*, harmonicè dispositi: quorum ratio *A* ad *Ss*

A

B

C

D

G

H

N

O

R

S

P

Q

E

F

ad B , alior, quàm C ad D . Et sit rationis A ad B , logarithmus E : & rationis C ad D , logarithmus F . Sint autem inter A , B , C , D , vel inter æqueproportionales numeros terminos hyperlogarithmi, & hypologarithmi: rationis quidem A ad B , hyperlogarithmus G , & hypologarithmus H : & rationis C ad D , hyperlogarithmus I , & hypologarithmus K .

Dico E ad F minorem esse, quàm G ad I ; maiorem, quàm H ad K .

Præpar.

62. b. Esto, si potest, E ad F , maior, quàm G ad H : & sumatur L ad M ratio, quæ cum ratione G ad H , componit rationem, E ad F . Et quoniam minor, quàm E , est ad F , ut G ad H : L ad M , est ut E ad minorem, quàm E : quare L , maior est, quàm M . Inueniatur rationis C ad D hyperlogarithmus N , qui sit minor ad hypologarithmum O , quàm ut L ad M . Quod si termini, inter quos censentur N , O , non sunt minores, quàm inter quos H , K ; sumantur alij minores æqueproportionales ad C , D , nec non alij æque-

æque proportionales ad A & B : inter quos rationis quidem C ad D sint hyperlogarithmus P , & hypologarithmus Q ; & rationis A ad B hyperlogarithmus R , & hypologarithmus S .

Demonstr.

96. h. | R ; P : minor est, quàm G ; H .
 97. h. | P ; Q : minor, quàm N ; O : & minor, quàm L ; M .
 4. 3. | R ; Q : minor, quàm G ; H ; + L ; M .
suppos. | E ; F : G ; H ; + L ; M .
 13. 5. | R ; Q : minor, quàm E ; F . *contra* 82. h.

Ergo E ad F , non est maior, quàm G ad H .

Præpar.

Esto E ad F , eadem, quæ G ad H , si potest: & inter minores terminos, quàm quos inter sunt hyperlogarithmi G , H , sumantur abj R , P :

Demonstr.


96. h. | G ; H : maior, quàm R ; P .
suppos. | E ; F : G ; H .
 13. 5. | E ; F : maior, quàm R ; P . *contra demonstrata superius.*

Ergo E ad F , non est, vt G ad H .

Ergo E ad F , est minor, quàm vt G ad H . Quod &c.

Præpar.

Esto deinde E ad F , minor, quàm I ad K : & sumatur L ad M ratio, quæ cum E ad F , rationem I ad K componit. Et quoniam maior, quàm E , ad F , est vt I ad K : L ad M , est vt maior, quàm E , ad E : & L , ma-



ior est, quàm M . Deinde fiant eadem, quæ supra.

Demonstr.

- | | | |
|---------|--|---|
| 82. b. | | $S; P$: minor est, quàm $E; F$. |
| prepar. | | $P; Q$: minor, quàm $L; M$. |
| 4 3. | | $S; Q$: minor, quàm $E; F, +L; M$. |
| suppos. | | $I; K$: $E; F, +L; M$. |
| 13. 5. | | $S; Q$: minor, quàm $I; K$: contra 96. b. |

Prepar.

Ergo E ad F non est minor, quàm I ad K .

Prepar.

Esto E ad F , eadem, quæ I ad K : & inter minores terminos, quàm quos inter sunt hypologarithmè I, K , sumantur alij S, Q .

Demonstr.

- | | | |
|---------|--|--|
| suppos. | | $E; F$: $I; K$. |
| 96. b. | | $I; K$: minor est, quàm $S; Q$. |
| 13. 5. | | $E; F$: minor, quàm $S; Q$: contra superius demonstrata. |

Ergo E ad F , non est eadem, quàm I ad K .

Ergo E ad F , est maior, quàm I ad K . Quod Sc.

Quare &c.

Theor. 87. Prop. 99.

Quatuor terminorum à serie harmonica naturali unitate dispositorum harmonicè, altioris rationis maior terminus ad maiorem depressioris, maior est, quàm ut logarithmus ad logarithmum: & logarithmus ad logarithmum, maior, quàm ut minor ad minorem.

Hypoth.

Sint è serie harmonica naturali ab unitate, quatuor termini a, b, c, d , harmonicè dispositi: quorum ratio a ad b , altior, quàm c ad d : & a , maior, quàm b : ideoque etiam c , maior, quàm d . Et esto rationis a ad b , logarithmus e : & rationis c ad d , logarithmus f .

Dico $a; c$: maiorem, quàm $e; f$.

Et $e; f$: maiorem, quàm $b; d$.

Prepar.

Rationis a ad b , si manent hyperlogarithmus g , & hypologarithmus h : & rationis c ad d , hyperlogarithmus l , & hypologarithmus m .

Demonstr.

90. b. | $a; c$: maior, quàm $g; l$

98. b. | $g; h$: maior, quàm $e; f$.

98. b. | $e; f$: maior, quàm $h; m$.

90. b. | $h; m$: maior, quàm $b; d$.

13. 5. | $a; c$: maior, quàm $e; f$. Quod &c.

13. 5. | $e; f$: maior, quàm $b; d$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 88. Prop. 1. 10.

Quatuor numerorum arithmetice dispositorum, ratio primi ad secundum, totuplicata, quotus est primus, maior est, quam tertij ad quartum totuplicata, quotus est quartus: atque totuplicata ratio primi ad secundum, quotus est secundus, minor est, quam totuplicata tertij ad quartum, quotus est tertius.

Hypoth.

Sint quatuor numeri arithmetice dispositi a, b, c, d .

Dico rationem a ad b totuplicatam, quotus est a , maiorem esse, ratione c ad d , totuplicata, quotus est d : & rationem a ad b totuplicatam, quotus est b , minorem esse, ratione c ad d totuplicata, quotus est c .

Preparatio.

Sumantur in serie harmonica naturali ab unitate termini æqueordinati cum numeris a, b, c, d , in serie arithmetica naturali: nempe unitates denominatæ ab ipsis: $1(a), 1(b), 1(c), 1(d)$. Et esto rationis c ad b , logarithmus e : & rationis c ad d , logarithmus f .

Demonstr. p.

Terminus a , vel minor est, vel maior, quam b : & rursum a , vel minor est, vel maior, quam c . Esto a , minor, quam b : & minor, quam c .

hypoth. | a, b, c, d : arithmetice dispositi.

14. *b.* | $1(a), 1(b), 1(c), 1(d)$: harmonicè dispositi;

sup. | $1(a)$: maior, quam $1(b)$: & maior, quam $1(c)$.

88. *b.* | $1(a); -1(b)$: altior, & maior, quam $1(c); -1(d)$.

$1(a);$

65. b. $I(a); I(b)$: logarithmus a .
65. b. $I(c); I(d)$: logarithmus f .
12. b. $I(a)$: maior, quàm $I(b)$.
- def. 13 b $I(c)$: maior, quàm $I(d)$.
8. 5. $I(a); I(d)$: maior, quàm $I(a); I(c)$.
69. b. $I(a); I(e)$: maior, quàm $c; f$.
99. b. $c; f$: maior, quàm $I(b); I(d)$.
8. 5. $I(b); I(d)$: maior, quàm $I(b); I(e)$.
13. 5. $I(a); I(d)$: maior, quàm $c; f$.
13. 5. $c; f$: maior, quàm $I(b); I(c)$.
12. b. $I(a); I(d)$: $d; a$.
12. b. $I(b); I(c)$: $c; b$.
13. 5. $d; a$: maior, quàm $c; f$.
13. 5. $c; f$: maior, quàm $c; b$.
91. b. df : maior, quàm ac .
91. b. eb : maior, quàm fc .
- hypoth. Et quoniam f , logarithmus est rationis c ad d :
 73. b. ergo df , logarithmus est rationis c ad d , totu-
 hypoth. plicatæ, quotus est d . item quoniam e , logari-
 73. b. thmus est rationis a ad b : ergo ac , logarithmus
 est rationis a ad b totuplicatæ, quotus est e . Et
 74. b. vt ac ad df , ita est ratio a ad b totuplicata, quo-
 71. b. tus est a , ad rationem c ad d totuplicatam quo-
 tus est d . est autem ac , minor, quàm df : ergo ra-
 71. b. tio a ad b totuplicata, quotus est a , depressior
 hypoth. est a ratione c ad d totuplicata, quotus est d . est
 def. 5. b. autem a minor, quàm b ; & c , minor, quàm d :

Ergo

def. 2. 4. Ergo maior est ratio a ad b totuplicata, quotus est a , quàm c ad d totuplicata, quotus est d .
Quod &c.

73. h. Similiter ostendetur, quod eb , logarithmus est rationis a ad b , totuplicata, quotus est b : & si

sup. logarithmus c ad d totuplicata, quotus est c : sed

71. b. est eb , maior, quàm fc : ergo ratio a ad b totuplicata quotus est b , altior est, quàm c ad d totu-

hypoth. plicata quotus est c . & est a minor, quàm b ; & c minor, quàm d : ergo minor est ratio a ad b to-

def. 5. b. tuplicata, quotus est b , quàm ratio c ad d totu-
def. p. 4. plicata, quotus est c . Quod &c.

Demonstr. 2.

hypoth. Esto a , minor, quàm b : & maior, quàm c .
def. 5. b. ergo c, d, a, b , sunt quatuor numeri arithmetice

sup. dispositi; quorum c , minor est, quàm d ; & minor, quàm a . Et ratio c ad d totuplicata, quo-

tus est c , maior est, quàm a ad b totuplicata, quotus est b : & c ad d totuplicata, quotus est d ,

minor, quàm a ad b totuplicata, quotus est a .
Quod &c.

Demonstr. 3.

hypoth. Esto a , maior, quàm b , & minor, quàm c .
def. 5. b. Ergo b, a, d, c , sunt quatuor numeri arithmetice

sup. dispositi; quorum b , minor, quàm a ; & minor, quàm d . Et ratio b ad a totuplicata, quo-

tus est b , maior, quàm d ad c totuplicata, quo-

2.3.

tus est c & b ad a totuplicata, quotus est a , minor, quàm d ad c totuplicata, quotus est d . Et conuertendo a ad b totuplicata, quotus est a , maior, quàm c ad d , totuplicata, quotus est d : & a ad b totuplicata, quotus est b , minor, quàm c ad d totuplicata, quotus est c . Quod &c.

Demonstr. 4.

def. 5. h.
sup.

2.3.

Esto a maior vtrisque b , & c : eritque d minor vtrisque c , & b . Sunt ergo quatuor numeri d , c , b , a dispositi arithmeticè: quorum ratio d ad c totuplicata, quotus est d , maior, quàm b ad a totuplicata, quotus est a : & d ad c totuplicata, quotus est c , minor, quàm b ad a totuplicata, quotus est b . Et conuertendo, c ad d totuplicata, quotus est d , minor, quàm a ad b totuplicata, quotus est a : & c ad d totuplicata, quotus est c , maior, quàm a ad b totuplicata, quotus est b .
Quod &c. Quare &c.

Theor. 89. Prop. 101.

SI fuerint quatuor numeri arithmeticè dispositi, & primus maior secundo; fuerint autem & alij duo numeri, quintus ad sextum, maior quàm vt primus ad quartum: erit primi ad secundum totuplicata ratio, quotus est quintus, maior, quàm tertij ad quartum totuplicata ratio, quotus est sextus.

Hypoth.

def. 5. h. | Sint quatuor arithmeticè dispositi numeri $a, b,$
 c, d : & sit primus a , maior secundo b ; ideoque
 etiam tertius c , maior quarto d : & sint alij duo,
 | quintus e ad sextum f , maior quàm a ad d .

Dico rationem a ad b totuplicatam, quotus est e , ma-
 iorem esse ratione c ad d totuplicata, quotus est f .

Prepar.

Rationis a ad b , logarithmus assumatur g : & rationis
 c ad d , logarithmus h .

Demonstr.

100. h. | Ratio a ad b totuplicata, quotus est a , maior
 est ratione c ad d totuplicata, quotus est d : &
hypoth. | ambæ sunt maioris inæqualitatis: ergo ratio a ad
def p. 4. | b totuplicata, quotus est a , altior est, quàm c ad
 d totuplicata, quotus est d . Est autem rationis a
73. h. | ad b totuplicatæ, quotus est a , logarithmus ag :
 & rationis c ad d totuplicatæ, quotus est d , loga-
hypoth. | rithmus hd : ergo ag maior est, quàm hd . Et quo-
p. 3. | niam e ad f maior est, quàm vt a ad d : permu-
9. h. | tando, e ad a , maior est, quàm vt f ad d . Sed e
 ad a , est vt eg ad ag : & f ad d , vt fh ad dh .
13. 5. | Ergo eg ad ag , maior est, quàm vt fh ad dh : &
p. 3. | permutando, eg ad fh , maior, quàm vt ag ad dh .
73. h. | Et est eg , logarithmus rationis a ad b totuplica-
 tæ, quotus est e : & fh , logarithmus rationis c ad
71. h. | d totuplicatæ, quotus est f . ergo ratio a ad b

totu-

hypoth. | totuplicata, quotus est e , altior est ratione c ad d
def. p. 4. | totuplicata, quotus est f . Et vtraque maioris est
 inæqualitatis. Ergo ratio a ad b totuplicata, quo-
 tus est e , maior est ratione c ad d totuplicata,
 quotus est f . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 90. Prop. 102.

SI fuerint quatuor numeri arithmeticè dispositi, & pri-
 mus minor secundo; fuerint autem & alij duo numeri,
 quintus ad sextum, minor, quàm vt primus ad quartum: :
 erit primi ad secundum totuplicata ratio, quotus est quin-
 tus, maior, quàm tertij ad quartum totuplicata ratio, quo-
 tus est sextus.

Hypoth.

def. 5. b. | Sint quatuor numeri arithmeticè dispositi, $a, b,$
 c, d : & sit a , minor, quàm b : ideoque etiam c ,
 minor, quàm d : & sit e , ad f , minor, quàm vt a
 ad d .

Dico a ad b totuplicatam rationem, quotus est e , ma-
 iorem esse ratione c ad d totuplicata, quotus est f .


Demonstr.

hypoth. | Sunt enim d, c, b, a , arithmeticè dispositi: & est
 2. 3. | d , maior, quàm c : & f ad e , maior, quàm d ad a :
 101. b. | ergo d ad c totuplicata, quotus est, f maior est,
 quàm b ad a totuplicata, quotus est e : & conuer-
 2. 3. | tendo c ad d . totuplicata, quotus est f , minor,

quàm a ad b totuplicata, quotus est e . Quod &c.
Quare &c.

Probl. 13. Prop. 103.

Data quantitate, dataque ratione inæqualitatis, inuenire terminos in data ratione, quorum differentia est quantitas data.



Sit data quantitas AB , dataque ratio c ad d ; & esto c , maior, quàm d .

Oportet inuenire terminos in ratione c ad d , quorum excessus AB .

Constr.

Fiat $c - d$; d : AB ; BE .

Dico AE ; EB : c ; d .

Demonstr.

constr. | AB ; BE : $c - d$; d .

2. p. | AE ; EB : c ; d . Quod &c.


Quare &c.

Theor. 91. Prop. 104.

Si quatuor quantitatum non numerosas rationes habentium, harmonicè dispositarum, prima maior fuerit, quàm vtralibet secunda, & tertia; logarithmus rationis pri-

primæ ad secundam ad logarithmum tertiæ ad quartam, non erit maior, quàm vt prima ad tertiam, nec minor, quàm vt secunda ad quartam:

Hypoth.



Sunto quatuor quantitates harmonicè dispositæ, a, b, c, d : quarum a , maior, quàm b , & maior, quàm c . & sunt a ad b , & c ad d , rationes non numerosæ. & rationis a ad b , esto logarithmus e : rationis autem c ad d , logarithmus f :

Dico e ad f , non maiorem esse, quàm vt a ad b ; nec minorem, quàm vt c ad d .

Supposito falsa alternativa.

Esto, si fieri potest, vel maior e ad f , quàm vt a ad b , ratione g ad h , maioris inæqualitatis, vel minor, quàm vt c ad d , ratione g ad h , maioris inæqualitatis.

Præpar.

Fiat $g; i; i; h$.

Sumatur quantitas K .


Fiat $a; K; K; l$.

$b; K; K; m$.

$c; K; K; n$.

$d; K; K; o$.

Da-



77. *h.* Datis non numerosis rationibus a ad b , & c ad d , vel m ad l , & o ad n : dataque ratione g ad i , vel i ad h , maioris inæqualitatis, quatuor inueniantur numerosæ rationes, p ad q , altior, quàm l ad m ; & r ad s depressior: propiores æqualitati logarithmicæ, quàm vt in ratione g ad i , vel i ad h .
88. *h.* Et quoniam a ad b , ratio est altior, quàm c ad d : & sunt l, m, n, o , reciprocè, sicut a, b, c, d : etiam l ad m , ratio est altior, quàm n ad o . Itaq; si forte contingeret r ad s , non altior, quàm n ad o : inueniatur altera r ad s , depressior quidem, quàm l ad m ; sed ei propior; atque altior, quàm n ad o . Et similiter inueniatur t ad u , depressior, quàm r ad s ; altior, quàm n ad o : nec non inueniatur x ad y , depressior, quàm n ad o ; vt fiant t ad u , & x ad y , propiores æqualitati logarithmicæ, quàm vt in ratione g ad i , vel i ad h .
103. *h.* Dataque differentia l, m : datis quoque rationibus p , ad q , r ad s , t ad u , x ad y , inueniantur

tur

tur earumdem termini p, q, r, s, t, u, x, y , eafdem habentes rationes, & earumdem differentiam l, m .

Fiat $p; K: K; \epsilon$.

$r; K: K; \beta$.

$q: K: K; \delta$.

$s; K: K; \iota$.

$t; K: K; \theta$.

$x; K: K; \lambda$.

$u; K: K; \mu$.

$y; K: K; \xi$.

Et rationis z ad δ , logarithmus esto π .

rationis β ad ι , logarithmus ϕ .

rationis θ ad μ , logarithmus ψ .

rationis λ ad ξ , logarithmus ω .

Demonstr. commun.

hypoth. a, b, c, d , sunt harmonicè dispositæ.

33. b. l, m, n, o , arithmeticè dispositæ.

hypoth. a , maior, quàm b : & maior, quàm c .

24. b. l , minor, quàm m : & minor, quàm n .


constr. $p, q; l, m; r, s; t, u; n, o; x, y$: binæ, & binæ sunt arithmeticè dispositæ, antecedentes minores consequentibus.

def. 34. b. π : maior, quàm e . & e ; maior, quàm ϕ .

ψ : maior, quàm f . & f : maior, quàm ω .

constr. Et quoniam g , ad i , maior est logarithmicè, quàm ut ratio z ad δ , ad rationem β ad ι : ratio autem z ad δ , ad rationem β ad ι , logarithmicè

maior



81. b. maior est, quàm vt ad rationem a ad b : & ratio
 z ad δ , ad rationē a ad b , est logarithmicè, vt π ad
 13. 5. e : ergo g ad i est maior, quàm vt π ad e . Simi-
 liter ostendetur g ad i , maior, quàm e ad ϕ : &
 maior, quàm ψ ad f : & maior, quàm f ad ω .

constr. Deinde quoniam p ad q , vel z ad δ ratio est
 sup. altior, quàm l ad m , vel a ad b ; & sunt z , δ ,
 bypoth. a , b harmonicè dispositæ; & est a , maior, quàm
 7. 5. b : oportet z , & δ maiores esse, quàm a , b . si e-
 nim essent æquales; esset ratio z ad δ , æqualta
 rationi a ad b : si verò esset z , minor, quàm a ;
 def. 13 b ideoque & δ , minor, quàm b ; esset ratio z ad δ ,
 88. b. depressior, quàm a ad b : contra assumptum. Si-
 militer ostendetur, quòd a , maior est, quàm ϵ ; &
 b , quàm ι : item θ , maior, quàm c ; & μ , quàm
 d : & c , quàm λ ; & d , quàm ξ .

Suppositio falsa prima.

Esto e ad f , maior, quàm a ad c : si potest.

Demonstr. p.

prepar. $e; f; a; c; +g; i; +i; h.$
def. 5. 60. $e; p; +p; \psi; +\psi; f; +g; f.$
II. 5. $e; \phi; +\phi; \psi; +\psi; f; a; c; +g; i; +i; h.$
sup. $e; \phi$: minor, quàm g ;
sup. $\psi; f$: minor, quàm i ; h .
4. 3. $\phi; \psi$: ut maior, quàm a ; c . si enim esset eadem,
 vel minor: esset $e; f$: minor, quàm $a; c; +g; h$.
 contra assumptum.
prepar. Sunt autem $\beta, \epsilon, \theta, \mu$, harmonice dispositæ
25. b. quantitates, numerosasque habentes rationes; &
 proportionales sicut quidam termini è serie har-
prepar. monica naturali ab unitate: quorum rationis β ad
 ϵ , logarithmus est ϕ ; & rationis θ ad μ , loga-
sup. 60. rithmus est ψ . Est autem sicut ϵ ad θ ratio altior,
 quàm ϵ ad μ : sic β ad ϵ , altior, quàm θ ad μ : &
sup. est β , maior, quàm ϵ ; ideoque & θ , maior,
99. b. quàm μ . Ergo β ad θ , maior est, quàm ϵ ad ψ .
13. 51. Ergo β ad θ , maior est, quàm a ad c . *contr. 8. 7.*
 Ergo ϵ ad f , non maior est, quàm a ad c . Quod &c.

Suppos. fals. 2.

Esto e ad f , minor, quàm b ad d , si potest.

Demonstr. 2.

prepar. $e; f; +g; h; b; d.$
sup. $\pi; e$: minor, quàm $g; i$.
sup. $f; \omega$: minor, quàm $i; h$.
sup. $\pi; \omega$: minor, quàm $e; f; +g; h$.

13. 5. π ; ω : minor, quàm b ; d .
 Sunt autem z , δ , λ , ξ , harmonicè dispositæ,
 prepar. numerosas rationes habentes; & proportionales,
 25. b. sicut quidam termini è serie harmonica naturali
 prepar. ab unitate: quorum rationis z ad δ , logarithmus
 est π ; & rationis λ ad ξ , logarithmus est ω : &
 est z ad δ ratio altior, quàm a ad b ; sicut p ad
sup. q , altior, quàm l ad m : & l ad m altior, quàm
 n ad o , vel c ad d ; & c ad d , altior, quàm λ ad
 ξ ; sicut n ad o , altior, quàm x ad y : ergo z ad
 δ , altior est, quàm λ ad ξ : & est z , maior, quàm
 29. b. δ ; & λ , maior, quàm ξ : Ergo π ad ω maior
 33. 5. est, quàm δ ad ξ . Ergo d ad ξ minor est, quàm
 b ad d . *contra* 8. 5.
 Ergo e ad f , non minor est, quàm b ad d : Quod &c.
 Quare &c.

Theor. 92. Prop. 105.

Quatuor arithmeticè dispositarum quantitatum, si
 prima ad ultimam, fuerit vt numerus ad numerum:
 erit primæ ad secundam totuplicata ratio, quotus
 est homologus primæ, maior, quàm tertix ad quartam to-
 tuplicata ratio, quotus est homologus quartæ. quòd si se-
 cunda ad tertiam fuerit vt numerus ad numerum: erit pri-
 mæ ad secundam totuplicata ratio, quotus est homologus
 secundæ, minor, quàm tertix ad quartam totuplicata, quo-
 tus est homologus tertix.

Hypoth.

Sunto quattuor arithmetice dispositæ quantitates A, B, C, D . & esto, vel alterutrum, vel utrumque istorum, videlicet: A ad D , vt numerus a , ad numerum d : & B ad C , vt numerus b , ad numerum c .

Dico rationem A ad B totuplicatam, quotus est a , maiorem esse ratione C ad D totuplicata, quotus est d : & rationem A ad B totuplicatam, quotus est b , minorem ratione C ad D totuplicata, quotus est c .

Præpar. commun.

Sumatur rationalis u : & per quantitates denominetur arithmetice dispositas, vt fiant fractiones

13.h. $u(A), u(B), u(C), u(D)$, harmonicè dispositæ.

Sicque rationis A ad B logarithmus e : & rationis C ad D , logarithmus f .

Demonstr. p.

Quantitatum A, B, C, D , vel duæ tantum extremæ A, D , erunt vt numeri; vel duæ tantum mediæ B, C : vel binæ tantum extremæ inuicem A, D ; & mediæ inuicem B, C : vel tres inuicem sunt vt numeri.

4.8. Sunt tres inuicem A, B, C , vt numeri: & as-

sumantur tres numeri g, b, i proportionales, vt

def. 5. h. A, B, C : quod si A , minor est, quàm B ; etiam C ,

2.p. minor est, quàm D ; & g minor, quàm h . & per

homologiam, est defectus g, h , ad i , vt defectus

A, B , ad C : addatur defectus g, b , numero i , &

2.p. fiat numerus l , erit ergo componendo vt l ad i ,

def. 5. h. ita D ad C . Si verò A , maior est, quàm B : profecto C , maior est, quàm $C \dashv D$, vel quàm $A \dashv B$: & per homologiam, sicut C , maior est, quàm $A \dashv B$, ita i , maior est, quàm $g \dashv h$. Auferatur itaque $g \dashv h$, ab i numero; & relinquatur l : & erit, dividendo, C ad D , ut i ad l .

Quare A , B , C , D sunt proportionales inuicem, ut numeri, g , h , i , l : & numeri g , h , i , l sunt arithmeticè dispositi: quorum ratio g ad h totuplicata, quotus est g , maior est, quàm ratio i ad l totuplicata, quotus est l : & ratio g ad h totuplicata, quotus est h , minor, quàm ratio i ad l totuplicata, quotus est i . Sed g ad h totuplicata ratio, quotus est g , ad eandem totuplicatam, quotus est a , est logarithmicè, ut g ad a : & i ad l totuplicata, quotus est l , est logarithmicè ad eandem totuplicatam, quotus est d ; ut l ad d . Et quoniam g ad l est ut A ad D : & A ad D , ut a ad d : ergo g ad l , est ut a ad d : & permutando g ad a , ut l ad d . Ergo ratio g ad h totuplicata, quotus est g , ad eandem totuplicatam, quotus est a , est ut i ad l totuplicata, quotus est l , ad eandem totuplicatam, quotus est d . Ergo si g ad h totuplicata, quotus est g , altior est, quàm i ad l totuplicata, quotus est l , etiam g ad h totuplicata, quotus est a , altior est, quàm i ad l totuplicata, quotus est d : si depressior, depressior.

ergo

100. b. | ergo sicut g ad b totuplicata; quotus est g , ma-
 def. 5. b. | ior est, quàm i ad l totuplicata, quotus est l ; siue
 deff. 1. | sint g ad b , & i ad l rationes maioris inæquali-
 & 2. 4. | tatis, siue sint minoris ambæ: erit & g ad b totu-
 | plicata, quotus est a , maior, quàm i ad l totupli-
 | cata, quotus est d . Et est g ad b , eadem, quæ A
 | ad B : & i ad l , eadem, quæ C ad D . ergo A ad
 | B totuplicata ratio, quotus est a , maior est, quàm
 | C ad D totuplicata, quotus est d . Quod &c.

Simili prorus demonstratione ostendetur, quòd ratio
 A ad B totuplicata, quotus est b , minor est, quàm C ad
 D totuplicata, quotus est c . Quod &c.

Demonstr. 2.

Sunto vel duo tantum extremi A, D , vt numeri; vel
 duo tantum medij C, D ; vel bini, & bini A, D , & B, C ;
 non autem tres, aut quatuor. profectò vel est quantitas A ,
 minor, quàm B , vel maior: & rursus quantitas A , minor,
 quàm C , vel maior.

Esto A , minor, quàm B , & minor, quàm C .

- 14. b. | $u(A), u(B), u(C), u(D)$, sunt harmonice dispositi.
- 12. b. | $u(A)$: maior, quàm $u(B)$.
- 12. b. | $u(A)$: maior, quàm $u(C)$.
- 88. b. | $u(A); u(B)$: altior, & maior, quàm $u(C); u(D)$.
- 78. b. | $u(A); u(B)$: logarithmus e .
- 78. b. | $u(C); u(D)$: logarithmus f .
- def. 13 b | $u(C)$: maior, quàm $u(D)$.
- 8. 5. | $u(A); u(D)$: maior, quàm $u(A); u(C)$.

$u(A);$

104. *b.* $u(A); u(C)$: non minor, quàm $e; f$.

104. *b.* $e; f$: non minor, quàm $u(B); u(D)$.

8. 5. $u(B); u(D)$: maior, quàm $u(B); u(C)$.

13. 5. $u(A); u(D)$: maior, quàm $e; f$.

13. 5. $e; f$: maior, quàm $u(B); u(C)$.

12. *b.* $u(A); u(D)$: $D; A: d; a$.

12. *b.* $u(B); u(C)$: $C; B: c; b$.

13. 5. $d; a$: maior, quàm $e; f$.

13. 5. $e; f$: maior, quàm $c; b$.

91. *b.* df : maior, quàm ac .

91. *b.* eb : maior, quàm fc .

prepar. Et quoniam f , logarithmus est rationis C ad

80. *b.* D : ergo df , logarithmus est rationis C ad D to-

tuplicata, quotus est d . item quoniam e , logari-

thmus est rationis A ad B : ergo ac , logarithmus

est rationis A ad B totuplicata, quotus est a . Si-

militer fc , logarithmus est rationis C ad D totu-

plicata, quotus est c : & eb , logarithmus, ratio-

81. *b.*

nis A ad B totuplicata, quotus est b . Sicut er-

go ac , minor est, quàm df : sic depressior est A

ad B totuplicata, quotus est a , quàm C ad D to-

tuplicata, quotus est d . Item sicut eb , maior est,

quàm fc : sic A ad B totuplicata, quotus est b , al-

tior est, quàm C ad D totuplicata, quotus est c .

hypoth.

deff. 1. &

2. 4.

Sunt autem A ad B , & C ad D , minoris iniqua-

littatis rationes, quarum depressior altiore maior

est. Ergo A ad B totuplicata, quotus est a , ma-

ior est, quàm C ad D totuplicata, quotus est d : & A ad B totuplicata, quotus est b , minor, quàm C ad D totuplicata, quotus est c . Quod &c.

Demonstr. 3.

def. 5. b.
sup. Esto A minor, quàm B , & maior, quàm C .
Ergo C, D, A, B , sunt quatuor quantitates arithmetice dispositæ; quarum C , minor, quàm D , & minor, quàm A . Et ratio C ad D totuplicata, quotus est c , maior est, quàm A ad B totuplicata, quotus est b . & C ad D totuplicata, quotus est d , minor, quàm A ad B totuplicata, quotus est a . Quod &c.

Demonstr. 4.

def. 5. b.
sup. Esto A , maior, quàm B , & minor, quàm C .
Ergo B, A, D, C , sunt quatuor quantitates arithmetice dispositæ, quarum B minor, quàm A ; & minor, quàm D . ideoque B ad A totuplicata ratio, quotus est b , maior est, quàm D ad C totuplicata, quotus est c : & B ad A totuplicata, quotus est a , minor, quàm D ad C totuplicata, quotus est d . Ergo conuertendo, A ad B totuplicata, quotus est b , minor est, quàm C ad D totuplicata, quotus est c : & A ad B totuplicata, quotus est a , maior, quàm C ad D totuplicata, quotus est d . Quod &c.

Demonstr. 5.

Esto A maior, quàm B , & maior, quàm C . Ergo D ,
 C, B, A ,

C, B, A , sunt quantitates arithmetice dispositæ,
def. 5. h. quarum D minor, quàm C , & minor, quàm B .
sup. quarum ratio D ad C totuplicata, quotus est d ,
 maior est, quàm B ad A totuplicata, quotus est
 a : & D ad C totuplicata, quotus est c , minor,
 quàm B ad A totuplicata, quotus est b : Ergo
 2. 3. conuertendõ, C ad D totuplicata, quotus est d ,
 minor est, quàm A ad B totuplicata, quotus est
 a : & C ad D totuplicata, quotus est c , maior, quàm
 A ad B totuplicata, quotus est b . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 93. Prop. 106.

Si fuerint quatuor quantitates arithmetice dispositæ, &
 prima minor secunda; fuerint autem & duo numeri
 prior ad posteriorem, minor, quàm vt prima quantitas ad
 quartam: erit primæ ad secundam totuplicata ratio, quo-
 tus est prior numerus, maior, quàm tertiæ ad quartam to-
 tuplicata, quotus est posterior.

Hypoth.

Sint quatuor quantitates arithmetice dispositæ, $A, B,$
 C, D : & sit A , minor, quàm B : ideoque etiam C , minor,
 quàm D : & sit e numerus ad numerum f , minor, quàm
 vt A ad D .

Dico A ad B totuplicatam, quotus est e , maiorem ef-
 fe, quàm C ad D totuplicata, quotus est f .

Prepar.

Denominetur u , per quantitates arithmetice dispositas A, B, C, D , ut fiant fractiones harmonice dispositæ, $u(A), u(B), u(C), u(D)$. Et esto rationis $u(A)$ ad $u(B)$, logarithmus g : & rationis $u(C)$ ad $u(D)$, logarithmus h .

Demonstr.

Vel $u(A)$, maior est, quàm $u(C)$; vel minor.

def. 13. b.

Si $u(A)$, maior est, quàm $u(C)$: etiam $u(B)$, maior est, quàm $u(D)$: & $u(A)$ ad $u(B)$, ratio est al-

88. b.

tior, & maior, quàm $u(C)$ ad $u(D)$. Ergo g ad h

def. p. 4.

non maior est, quàm ut $u(A)$ ad $u(C)$.

104. b.

$u(A); u(C): C; A$.

12. b.

$u(A); u(C): C; A$.

12. b.

C : maior, quàm A .

13. 5.

$g; h$: non maior, quàm $C; A$.

8. 5.

$D; A$: maior, quàm $C; A$.

13. 5.

$g; h$: minor: quàm $D; A$.

2. 3.

$f; e$: maior, quàm $D; A$.

13. 5.

$g; h$: minor, quàm $f; e$.

91. b.

ge : minor, quàm fh .

Est autem g logarithmus rationis $u(A)$ ad

12. b.

$u(B)$, vel B ad A : ideoque ge , logarithmus est

30. b.

rationis B ad A totuplicatæ, quotus est e . item

81. b.

fh ; logarithmus est rationis D ad C totuplicatæ,

quotus est f . Ergo sicut ge , minor est, quàm fh :

sic totuplicata ratio B ad A , quotus est e , depre-

sior est, quàm totuplicata D ad C , quotus est f .

byoth. & est B , maior, quàm A , & D maior, quàm C :
def. p. 4. ergo totuplicata ratio B ad A , quotus est e , mi-
 nor est, quàm totuplicata D ad C , quotus est f .
 2. 3. & conuertendo, totuplicata A ad B , quotus est
 e , maior, quàm totuplicata C ad D , quotus est f .
 Quod &c.

def. 13. b. Si $u(A)$, minor est, quàm $u(C)$: etiam $u(B)$, mi-
 28. h. nor est, quàm $u(D)$: & est ratio $u(C)$ ad $u(D)$, al-
 tior, quàm $u(A)$ ad $u(B)$: & est $u(C)$, maior vtra-
 libet $u(D)$, & $u(A)$.

104. v. $h; g$: non minor, quàm $u(C)$; $u(A)$.

12. h. $u(C)$; $u(A)$: A ; C .

13. 5. $h; g$: non minor, quàm A ; C .

8. 5. A ; C : maior, quàm A ; D .

byoth. A ; D : maior, quàm e ; f .

13. 5. $h; g$: maior, quàm e ; f .

91. h. hf : maior, quàm eg .

sup. Totuplicata A ad B , quotus est e , maior, quàm
 totuplicata C ad D , quotus est f . Quod &c.

Quare &c.

Theor. 94. Prop. 107.

SI fuerint quatuor quantitates arithmetice dispositæ,
 & prima, maior, quàm secunda: fuerint autem & duo
 numeri, prior ad posteriorem maior, quàm vt prima quan-
 titas ad quartam: erit primæ ad secundam totuplicata ra-
 tio, quotus est prior numerus, maior, quàm tertiæ ad quar-
 tam.

tam totuplicata, quotus est posterior.

Hypoth.

Sint quatuor quantitates A, B, C, D , arithmeticè dispositæ: & sit A , maior, quàm B ; ideoque etiam C , maior, quàm D : & sit e numerus ad numerum f , maior, quàm ut A ad D .

Dico A ad B totuplicatam, quotus est e , maiorem esse, quàm C ad D totuplicata, quotus est f .

Demonstr.

Sunt enim quatuor quantitates arithmeticè dispositæ D, C, B, A : & est D minor, quàm C :
 2. 3. & f ad e , minor est, quàm ut D ad A . ergo D
 106. h. ad C totuplicata ratio, quotus est f , maior est,
 2. 3. quàm B ad A totuplicata, quotus est e . Et conuertendo, C ad D totuplicata, quotus est f , minor, quàm A ad B totuplicata, quotus est e .
 Quod &c.

Quare &c.





Perillust. & Excellentiss. D. Io. Dominico Cassino
Astronomo D. S. Petrus Mengolus S. D.




*N*unquam mihi satis credo, Vir Excellentiss. cum publicanda conscribo; ideoque merito nec omnino scholaribus credendum puto: quorum licet ope me fateor plurimum profecisse; non tamen auctoritate oportuit confirmari. Tu vero, qui scis, & potes, tuis in me multis hucusque positis, hoc adhas officium velim: prava, si qua sunt, emendes primam: in ijs, quae male posita sunt, consilio adiunes; in ceteris, mihi duplices intellectum. Quod ut praestes facilius, retexam breuiter huiusce operis narrationem: quam cum legeris, praefationemque ad lectorem percurreris; plurima quidem cursim praetereundo intelligere; paucis vero difficilioribus lectis attentius, demonstratisq;, possis de toto volumine sententiam ferre.

Ante annos duodecim, occasione cuiusdam problematis mihi propositi à D. Io. Antonio Rocca Regiensi, de figura unilinea describenda, quae secaret ellipsim in duobus punctis innumerabiles eiusmodi figuras excogitari, quas tunc per Geometriam indivisibilem quadrabam, adhibita tamen prius hoc lemmate.


Lemma.

Data recta linea, diuisa primùm bifariam, deinde non bifariam in duobus punctis, vtrinq; à medio puncto æqualiter distantibus: assignatisque vnus eiusdem gradus potestatis abscissarum; necnon alius eiusdem gradus potestatis residuarum: inuenire cui sit æquale aggregatum ex duobus productis synonymis, sub potestatibus abscissarum assignatis, per suarum assignatas potestates residuarum.

Est autem hoc lemma affine illi, quod recitat Bonauentura Cauallerius b. m. præceptor meus ex Io. Beugrand: quod idcirco in expositione placet imitari.



Sit recta AR , diuisa bifariam in T , & non bifariam in punctis C, B , æqualiter hinc inde à T distantibus. Oportet inuenire, cui sit æquale aggregatum productorum synonymorum sub potestatibus partium inæqualium AB, BR , & AC, CR . Vt autem breviori via id optineamus, procedemus per Algebram Speciosam, partes AT, TR , vocantes t : & partes BT, TC , vocantes a . Erunt ergo $AB, CR, t - a$: & erunt $AC, BR, t + a$. Assignatis itaque primis potestatibus abscissarum AB, AC , necnon primis residuarum BR, CR ; volens inuenire cui æquetur summa productorum sub primis potestatibus ABR, ACR , statim ducendo $t - a$ per $t + a$ produco vnum: & ducendo



do $t+a$ per $t-a$, produco alterum, quorum summa, $2t2$
 $2a2$.

Exemplum primum in Vnprimis.

| | | | |
|---------|-------|------------|-------|
| $AB:$ | $t-a$ | $AC:$ | $t+a$ |
| $BR:$ | $t+a$ | $CR:$ | $t-a$ |
| $ABR:$ | | $ACR:$ | |
| $t2-a2$ | | $t2-a2$ | |
| | | $t2-a2$ | |
| | | $ABR+ACR:$ | |
| | | $2t2-2a2$ | |

Vnde sequitur aggregatum productorum sub primis potestatibus ABR , ACR , equale esse, duplæ secundæ potestati AT , dempta dupla secunda TC .

Quod si assignatis secundis potestatibus abscissarum AB , AC , & primis residuarum BR , CR , velim scire cui æquetur summa productorum sub potestatibus secunda AB , & prima BR , & sub secunda AC & prima CR : effingo secundam potestatem à radice $t-a$, quàm duco in primam $t+a$; vt fiat vnus productus: item effingo secundam $t+a$, quàm duco in primam $t-a$; vt fiat alter productus: quorum summam inuenio $2t2 - 2a2$.

Exem-

Exemplum 2. in Biprimis.

$$AB: 12 - 21a + a2$$

$$BR: 1 - a$$

$$13 - 212a + 1a2$$

$$+ 12a - 21a2 + a3$$

$$ABR: 13 - 12a - 1a2 + a3$$

$$AC: 12 + 21a + a2$$

$$CR: 1 - a$$

$$13 + 212a + 1a2$$

$$- 12a - 21a2 - a3$$

$$ACR: 13 + 12a - 1a2 - a3$$

$$13 - 12a - 1a2 + a3$$


$$ABR + ACR: 213 - 21a2.$$

Vnde manifestum est aggregatum productorum sub potestatibus, secunda AB & prima BR , & sub secunda AC & prima CR , æquale esse duplæ potestati tertiæ AT , dempto duplo producto sub prima AT , & secunda TC .

Similiter in cuiuslibet appellationis proportionalibus progrediendo, consequemur optatum: ut exemplis subiectis liquidò apparet.

Exem-

ELEMENTVM



Exemplum 3. in Triprimis.

$$AB: t_3 - 3t_2a + 3t_2a^2 - a^3$$

$$BR: t - a$$

$$t_4 - 3t_3a + 3t_2a^2 - ta^3$$

$$+ t_3a - 3t_2a^2 + 3ta^3 - a^4$$

$$ABR: t_4 - 2t_3a + 2ta^3 - a^4$$

$$AC: t_3 + 3t_2a + 3t_2a^2 + a^3$$

$$CR: t - a$$

$$t_4 + 3t_3a + 3t_2a^2 + ta^3$$

$$- t_3a - 3t_2a^2 - 3ta^3 - a^4$$

$$ACR: t_4 + 2t_3a - 2ta^3 - a^4$$

$$t_4 - 2t_3a + 2ta^3 - a^4$$

$$ABR + ACR: 2t_4 - 2a^4$$

Exemplum 4. in Bisecundis.

$$AB: t_2 - 2ta + a^2$$

$$BR: t_2 + 2ta + a^2$$

$$t_4 - 2t_3a + t_2a^2$$

$$+ 2t_3a - 4t_2a^2 + 2ta^3$$

$$+ t_2a^2 - 2ta^3 + a^4$$

$$ABR: 14 - 212a2 + a4$$

$$\text{Similiter } ACR: 14 - 212a2 + a4$$

$$ABR + ACR: 214 - 412a2 + 2a4.$$

Exemplum 3. in Quadriprimis.

$$AB: 14 - 413a + 612a2 - 41a3 + a4$$

$$BR: 1 + a$$

$$15 - 414a + 613a2 - 412a3 + 1a4$$

$$+ 14a - 413a2 + 612a3 - 41a4 + a5$$

$$ABR: 15 - 314a + 213a2 + 212a3 - 31a4 + a5$$

$$AC: 14 + 413a + 612a2 + 41a3 + a4$$

$$CR: 1 - a$$


$$15 + 414a + 613a2 + 412a3 + 1a4$$

$$- 14a - 413a2 - 612a3 - 41a4 - a5$$

$$ACR: 15 + 314a + 213a2 - 212a3 - 31a4 - a5$$

$$15 - 314a + 213a2 + 212a3 - 31a4 + a5$$

$$ABR + ACR: 215 + 413a2 - 61a4.$$



Exemplum 6. in Trifecundis.

$$AB: t_3 - 3t_2a + 3ta_2 - a_3$$

$$BR: t_2 + 2ta + a_2$$

$$\begin{aligned} & t_5 - 3t_4a + 3t_3a_2 - t_2a_3 \\ & + 2t_4a - 6t_3a_2 + 6t_2a_3 - 2ta_4 \\ & + t_3a_2 - 3t_2a_3 + 3ta_4 - a_5 \end{aligned}$$

$$ABR: t_5 - t_4a - 2t_3a_2 + 2t_2a_3 + ta_4 - a_5.$$

$$AC: t_3 + 3t_2a + 3a_2 + a_3$$

$$CR: t_2 - 2ta + a_2$$

$$\begin{aligned} & t_5 + 3t_4a + 3t_3a_2 + t_2a_3 \\ & - 2t_4a - 6t_3a_2 - 6t_2a_3 - 2ta_4 \\ & + t_3a_2 + 3t_2a_3 + 3ta_4 + a_5. \end{aligned}$$

$$ACR: t_5 + t_4a - 2t_3a_2 - 2t_2a_3 + ta_4 + a_5$$

$$t_5 - t_4a - 2t_3a_2 + 2t_2a_3 + ta_4 - a_5$$

$$ABR + ACR: 2t_5 - 4t_3a_2 + 2ta_4.$$

Similiter in Quintiprimis.

$$ABR + ACR: 2t_6 + 10t_4a_2 - 20t_2a_4 - 2a_6.$$

S E X T V M.

355

In Quadrifecundis.

$$ABR+ACR: 216---214a2---212a4+2a6.$$

In Tritertijs.

$$ABR+ACR: 216---614a2+612a4---2a6.$$

In Sextiprimis.

$$ABR+ACR: 217+1815a2--1013a4--101a6.$$

In Quintifecundis.

$$ABR+ACR: 217+215a2--1013a4+81a6.$$

In Quadrifertijs.

$$ABR+ACR: 217---615a2+613a4--21a6.$$

In Septimiprimis.

$$ABR+ACR: 218+2816a2--2812a6--2a8.$$

In Sextifecundis.

$$ABR+ACR: 218+816a2--3014a4+812a6+2a8.$$

In Quinitertijs.

$$ABR+ACR: 218--416a2+412a6--2a8.$$

In Quadriquartis.

$$ABR+ACR: 218--816a2+1214a4--812a6+2a8.$$

In Octauiprimis.

$$ABR+ACR: 219+4017a2+2815a4--5613a6--141a8.$$

In Septimifecundis.


$$ABR+ACR: 219+1617a2--2815a4+101a8.$$

In Sextitertijs.

$$ABR+ACR: 219--1215a4+1613a6--61a8.$$

In Quintiquartis.

$$ABR+ACR: 219--817a2+1215a4--813a6+21a8.$$



In Nonisprimis.

$$ABR+ACR: 2t10 + 54t8a2 + 84t6a4 - 84t4a6 - 54t2a8 - 2a10.$$

In Octavisecundis.

$$ABR+ACR: 2t10 + 26t8a2 - 28t6a4 - 28t4a6 + 26t2a8 + 2a10.$$

In Septimitertijs.

$$ABR+ACR: 2t10 + 6t8a2 - 28t6a4 + 28t4a6 - 6t2a8 - 2a10.$$

In Sextiquartis.

$$ABR+ACR: 2t10 - 6t8a2 + 4t6a4 + 4t4a6 - 6t2a8 + 2a10.$$

In Quiniquintis.

$$ABR+ACR: 2t10 - 10t8a2 + 20t6a4 - 20t4a6 + 10t2a8 - 2a10.$$

Propositio.

In parallelogrammo ducta diametro, regula basi: omnes sexcuplæ vniprimæ sub triangulis, sunt æquales omnibus secundis potestatibus parallelogrammi.

Et omnes duodecuplæ biprimæ, omnibus tertijs potestatibus parallelogrammi.

Et omnes 20plæ triprimæ: necnon omnes 30plæ bisecundæ; omnibus quartis potestatibus.

Et

Et omnes 3 oplæ quadriprimæ : necnon omnes 6 oplæ trisecundæ; omnibus quintis potestatibus .

Et omnes 42 plæ quintiprimæ; item omnes 105 plæ quadrifecundæ : & omnes 14 oplæ tritertiæ ; omnibus sextis potestatibus .

Et omnes 56 plæ sextiprimæ; item omnes 168 plæ quintifecundæ; item omnes 28 oplæ quadritertiæ; omnibus septimis potestatibus .

Et omnes 72 plæ septimiprimæ : item omnes 252 plæ sextifecundæ; necnon omnes 504 plæ quintitertiæ; & omnes 63 oplæ quadriquantæ; omnibus octavis potestatibus .

Et omnes 90 plæ octauprimæ : & omnes 360 plæ septimifecundæ : & omnes 840 plæ sextitertiæ : & omnes 1260 plæ quintiquartæ ; omnibus nonis potestatibus .


Et omnes 110 plæ noniprimæ : & omnes 495 plæ octauiifecundæ : & omnes 1320 plæ septimitertiæ : & omnes 2310 plæ sextiquartæ : & omnes 2772 plæ quintiquintæ ; omnibus decimis potestatibus .

Et sic deinceps in infinitum iuxta numeros tabule quadratricum, vel quadraturarum, cōtinuatę quātūm oportet.

Meth. Demonstr.

Affinis est hæc propositio, tribus propositionibus, quas loco citato refert Cauallerius ex eodem Beugrand *Exerc. 4. prop. 25, 26, & 27*: Eademque illarum methodo demonstretur, ex Lemmate præcedenti. Porrò satis puto ad ostensionem eiusdem methodi, ex decem propositis, tria tantūm demonstrare .

Hy-

Hypoth.

Esto parallelogrammum AB , cuius diameter CD : dividaturque CD bifariam in E : ducanturque per E , rectæ FG , IH , parallelogrammi AB lateribus parallelæ: ducanturque hinc inde ab E distantes quantumlibet, sed æqualiter, & intra quadratum, duæ $KLMN$, & $OPQR$.

Dico sub triangulis ACD , BCD , omnes sextuplas vniprimas, æquales esse, omnibus secundis potestatibus parallelogrammi AB .

Demonstr. p.

Quoniam aggregatum ex vniprimis KMN , OPR , est æquale duplæ secundæ potestati KL , dempta dupla secunda potestate LM : & KN ducta est vtcunque. Ergo ex omnibus vniprimis, sub trapezio $A FEC$, & sub triangulo CEG , & ex omnibus, sub triangulo EFD , & sub trapezio $EDBG$, aggregatum; quod est omnes vniprimæ


mæ sub triangulis ACD , BCD : est æquale omnibus duplis secundis potestatibus parallelogrammi AE , demptis omnibus duplis secundis potestatibus trianguli, IEC ; idest omnibus simplicis secundis potestatibus parallelogrammi AH , demptis omnibus secundis potestatibus, vtrorumq; triangulorum IEC , DEH .

Sed qualium trianguli IEC omnes secundæ potestates, sunt vnitas: talium parallelogrammi AE , sunt 3. Ideoq; qualium omnes secundæ potestates triangulorum IEC , DEH , sunt 2: talium omnes secundæ potestates parallelogrammi AH , sunt 6. Et omnes vniprimæ sub triangulis ACD , BCD , sunt vtrorumque differentia, nempe 4: & omnes sexcuplæ vniprimæ, sub triangulis ACD , BCD , sunt 24. Item qualium omnes secundæ potestates AH , sunt 6: talium omnes secundæ potestates AB , sunt 24. Ergo omnes sextuplæ vniprimæ, sub triangulis ACD , BCD , sunt æquales, omnibus secundis potestatibus AB .
Quod &c.

Dico sub triangulis ACD , BCD , omnes duodecuplas biprimas, æquales esse, omnibus tertijs potestatibus parallelogrammi AB .

Demonstr. 2.

Quoniam aggregatum ex biprimis KMN , OPR , est æquale duplæ tertiæ potestati KL , dempta dupla vnifecunda KL (idest, dempto duplo producto sub potestatibus, prima KL , & secunda LM). Ostendetur similiter vt supra, quòd omnes biprimæ sub triangulis ACD , BCD ,
sunt



sunt æquales omnibus tertijs potestatibus parallelogrammi AH , demptis omnibus vnifecundis sub potestatibus primis eiusdem AH , & sub secundis vtrorumque triangulorum IEC , DEH .

Qualium autem omnes secundæ potestates trianguli IEC , sunt vnitas: talium omnes secundæ potestates parallelogrammi sunt 3: ideoque qualium omnes vnifecundæ sub parallelogrammo AE , & sub triangulo IEC , sunt vnitas: talium omnes tertix potestates parallelogrammi AE , sunt 3. & qualium omnes vnifecundæ sub parallelogrammo AH , & sub vtrisque triangulis IEC , DEH , sunt 2: talium omnes tertix potestates AH , sunt 6: & omnes biprimæ sub triangulis ACD , BCD , sunt vtrorumque differentia, nempe 4: & omnes duodecuplę biprimæ sub triangulis ACD , BCD , sunt 48. item qualium omnes tertix potestates AH , sunt 6: talium omnes tertix

tia potestates AB , sunt 48. Ergo omnes duodecuplæ biprimæ, sub triangulis ACD , BCD , sunt æquales omnibus tertijs potestatibus AB . Quod &c.


Dico sub triangulis ACD , BCD , omnes 60plas triseundas, æquales esse, omnibus quintis potestatibus parallelogrammi AB .

Demonstr. 3.

Quoniam aggregatum ex trisecondis KMN , OPR , est æquale duplæ quintæ potestati KL , dempta quadrupla triseconda KLM , addita dupla vniquarta KLM . ostenditur similiter vt supra, quod omnes trisecondæ sub triangulis ACD , BCD , sunt æquales omnibus quintis potestatibus parallelogrammi AH ; demptis omnibus duplis trisecondis, sub potestatibus tertijs AH , & sub secundis vtrorumque triangulorum IEC , DEH , additis omnibus vniquartis sub potestatibus primis AH , & sub quartis vtrorumque triangulorum IEC , DEH .

Qualium autem omnes secundæ potestates trianguli IEC , sunt 5: talium omnes secundæ potestates parallelogrammi AE , sunt 15. ideoque qualium omnes trisecondæ sub tertijs potestatibus parallelogrammi AE , & sub secundis trianguli IEC , sunt 5: talium omnes quintæ potestates parallelogrammi AE , sunt 15: atque talium omnes duplæ trisecondæ sub AE , & sub IEC , sunt 10: atque differentia vtrarumque, est 5.

Rursum, qualium omnes quartæ potestates trianguli IEC , sunt 3: talium omnes quartæ potestates AE , sunt



15. ideoque qualium omnes vniquartæ, sub primis, AE , & quintis IEC potestatibus, sunt 3: talium omnes quintæ potestates AE , sunt 15. sed talium ostensæ sunt omnes quintæ AE , demptis omnibus duplis trisecundis, sub AE , & sub IEC , esse 5: ergo additis omnibus vniquartis, sub AE , & sub IEC , sunt 8.

Sed qualium omnes quintæ AE , sunt 15: talium omnes quintæ AH sunt 30: & omnes quintæ AH , demptis omnibus duplis trisecundis, sub AH , & sub vtrisque IEC , DEH , additisque omnibus vniquartis, sub AH , & sub vtrisque IEC , DEH , sunt 16; nempe omnes trisecundæ, sub triangulis ACD , BCD , sunt 16: & omnes 60plæ trisecundæ sub iisdem, sunt 960. & qualium omnes quintæ potestates AH , sunt 30: talium omnes quintæ potestates AB , sunt 960. Ergo omnes 60plæ trisecundæ, sub triangulis ACD , BCD , sunt æquales, omnibus quintis potestatibus parallelogrammi AB . Quod &c. Quare &c.

His

His demonstratis, cogitabam si possent alia quadraturæ inueniri ex inuentis compositæ, in quas insignis aliqua resolueretur; quemadmodum in triangulo, parabolam Archimedes resoluit. Et quæsum primam de omnibus figuris, in quibus ordinatæ ad basim, sunt omnes potestates abscissarum, prima, secunda, tertia, & deinceps in infinitum: quas ex demonstratis à Cavalierio loco citato, deprehendebam esse in serie harmonica naturali ab Unitate earumque summam demonstravi excrecere in infinitum, in præfatione ad meum libellum, cui titulus, *Nouæ Quadraturæ Arithmetica, seu de Additione Fractorum*.

Deinde tenui, si possent in unam colligi summam figuræ, in quibus ordinatæ ad basim, sunt abscissæ primæ, & producti sub primis abscissis, & residuarum potestatibus omnifariam, id est, abscissæ primæ, uniprimæ, uniseconde, unitertia, uniquartæ, & deinceps in infinitum: quas colligere mihi successit feliciter, & æquales inuenire parallelogrammo, cuius ad eandem basim ordinatæ, sunt omnes totæ; ut potest facile colligi ex supra demonstratis, & ex 17. p. *Nou. Quadr.*

Item si possent colligi figuræ, in quibus ordinatæ ad basim sunt abscissæ secundæ, & producti sub abscissis secundis, & residuarum potestatibus omnifariam, id est, abscissæ secundæ, biprimæ, bisecondæ, bicartiæ, biquartæ, & deinceps in infinitum: quas etiam colligere mihi successit, & æquales inuenire triangulo, cuius ordinatæ sunt omnes abscissæ. Ut patet ex supra demonstratis, & ex 8.2. *Nou. Quadr.*

Et generaliter inueni figuram, in qua ordinatæ sunt omnes potestates abscissarum, & deinceps omnes figuras, in quibus ordi-

natæ sunt productæ sub iisdem poteſtatibus abſciſſarum, & ſub reſiduarum poteſtatibus omniſariam, ſimul aggregatas, æquales eſſe figuræ, in qua ordinatæ, ſunt omnes poteſtates abſciſſarum ordinis proximè inferioris. Verbi gratia, omnes abſciſſas tertias, additis omnibus triprimis, omnibus triſecundis, omnibus tritertijs, alijsque omnibus triquotis; eſſe æquales, omnibus abſciſſis ſecundis. Item omnes abſciſſas quartas, additis omnibus quadriprimis, omnibus quadriſecundis, omnibus quadritertijs, omnibus quadriquartis, alijsque omnibus quadriquotis; eſſe æquales omnibus abſciſſis tertijs, quod ita generaliter ut enunciatur eſt, & ex ſupra demonſtratis, & ex 5. 3. Non. Quadr. poteſt ma- ni- feſtari.

Ipsam interim acceſſionem, quam Geometriæ Indiuiſibilem fecerant, præteriti: veritus eorum auctoritatem, qui falſum pu- tant ſuppoſitum, omnes rectas figuræ planæ infinitas, ipſam eſſe figuram planam: non quaſi hanc ſequens partem; ſed illam quaſi non proſus indubiam deuians: tentandi animo, ſi poſſent de- mum eandem indiuiſibilem methodum, aut aliam æquivalen- tem nouis, & indubijs proſus conſtituere fundamentis.

Mechanicis deinde ac Muſicis hucusque imperfectis occupa- tus lucubratiombus, in eas quandoque veni demonſtrandarū con- cluſionum anguſtias, ut per omniſariam hæc noſtra elementa, no- uorum indigerem argumentorum. quæ priuatis tradita ſcripſis deliteſcebant, non inculca ſolum, ſed & ita perperam poſita, ut quaſi ſpecialia Lemmata quorundam mathematicum, non vade- rent ad aliud. Animaduertebam etiam me non poſſe multum in Mechanicis proficere, quas liberaliter profiteor; niſi ex uberiore

Geometria, quàm quæ hucusque ab Euclide, Apollonio, alijsque posterioribus tradita esset.

Nuperrimè hoc anno, Adm. R. P. Fr. Stephanus de Angelis Iesuatus, meus condiscipulus, de indivisibilium Præceptoris nostri Geometria omnium optimè meritis, cuius intellectus copiam, & felicitatem, nunquam satis à me cõmendari posse verbis existimo, mittebat ad me libellum suum De Infinitis Parabolis &c. legendum: cuius ex eruditione mirabili, melior, & cæterior factus Geometra; maximum hoc emolumentum percepi: ut præterita studia reuertentur in mentem; ordinemque, inter plura deinceps inuenta, postularent. & illud tandem mihi, opinor, successisse feliciter, quod duodecim ante annos desideraueram: ijs etiam, quibus deuincior, Mechanicarum studiorum obligationibus oportunum. super qua mea opinione, Vir Excellentissime, hisce lucubrationibus perlectis; & quatenus oportuerit ad correctionem natatis: tuam sinceram mixtè rogans, postulo & expecto sententiam. Vale.



Tabula Formosa.

FO.n.

FO.a. FO.r.

FO.a2. FO.ar. FO.r2.

FO.a3. FO.a2r. FO.ar2. FO.r3.

FO.a4. FO.a3r. FO.a2r2. FO.ar3. FO.r4.

Tabula Subquadraturarum.

FO.n.

FO.a. FO.r.

FO.a2. FO.2ar. FO.r2.

FO.a3. FO.3a2r. FO.3ar2. FO.r3.

FO.a4. FO.4a3r. FO.6a2r2. FO.4ar3. FO.r4.

Tabula Quadraturarum.

FO.n.

FO.2a. FO.2r.

FO.3a2. FO.6ar. FO.3r2.

FO.4a3. FO.12a2r. FO.12ar2. FO.4r3.

FO.5a4. FO.20a3r. FO.30a2r2. FO.20ar3. FO.5r4.




GEOMETRIÆ SPECIOSÆ

ELEMENTVM SEXTVM.

DEFINITIONES.

RECAPITULATIO

- 1  Sumatur inter lineas, vna quælibet quantitas; quæ, Rationalis, dicitur.
- 2 Et exponatur quædam recta linea, rationali æqualis; quæ dicitur, Tota:
 3. Sitque data positione; quæ dicitur, *Basis*.
 4. Eiusque alterum extremorum punctorum, dicitur, *Finis abscissarum*.
 5. Alterum, *Finis residuarum*.
 6. Et ab vnoquoque puncto in basi sumpto, vsque ad finem abscissarum, quatenus ipsa basis extenditur, quantitas dicitur *Abscissa*.
 7. Ideoque tota dicitur etiam, *Maxima abscissarum*.
 8. Item ab vnoquoque puncto in basi sumpto, vsque ad finem residuarum, quatenus basis extenditur, quantitas dicitur *Residua*.

9. Ideo-

9. Ideoque tota dicitur etiam, *Máxima residuarum.*

10. Super basi describatur quadratum: & ab vno quolibet puncto in basi sumpto, recta ducatur, vsque ad oppositum latus, reliquis lateribus quadrati parallela: quæ dicitur, *Ordinata in quadrato.*

11. Quæ cum sit æqualis rationali, & totæ, dicitur *Rationalis*, & *Tota*, & *Maxima abscissarum*, & *Maxima residuarum.*

12. Et quadratum, per suas ordinatas extensum, dicitur, *Forma omnes rationales*, & *Forma omnes totæ.* & significabitur characteribus *FO.ii.* & *FO.i.*

13. Immò quoniam tota est æqualis rationali, & reliquæ omnes potestates totæ, sunt inter se, & rationali æquales: ordinata in quadrato dicitur etiam, *Tota secunda*, *Tota tertia*, *Tota quarta*, & deinceps.

14. Et quadratum, dicitur, *Forma omnes totæ secundæ*, *Forma omnes totæ tertiæ*, *Forma omnes totæ quartæ*. aptisque significabitur characteribus, *FO.12.*, *FO.13.*, *FO.14.* & sic deinceps.

15. A fine abscissarum ducta diameter quadrati, facit femiquadratum triangulum: cuius ab vno quolibet puncto in basi sumpto recta ducatur, vsque ad prædictam diametrum, alteri lateri parallela, quæ dicitur, *Ordinata in triangulo.*

16. Quæ cum sit æqualis abscissæ, dicitur, *Abscissa.*

17. Ipsumque triangulum per suas ordinatas extensum, dicitur, *Forma omnes abscissæ.* & significabitur characteribus, *FO.a.*

18. Si-

18. Similiter à fine residuarum ducta diameter quadrati, facit semiquadratum triangulum: cuius vnaquælibet ordinata, cum sit æqualis residuæ, dicetur Residua.

19. Et per ordinatas residuas extensum triangulum, dicetur, Forma omnes residuæ. & significabitur caractere, *FO.r.*

20. Si super basi concipiatur figura extensa non nisi per ordinatas in quadrato: sed in qua, vnaquælibet ordinata, est abscissa secunda, dicetur, Forma omnes abscissæ secundæ. & significabitur caractere *FO.a2.*

21. Item, in qua, vnaquælibet ordinata, est vniprimæ, dicetur, Forma omnes vniprimæ. & significabitur caractere, *FO.a.*

22. Et in qua, vnaquælibet ordinata, est residua secundæ, dicetur Forma omnes residuæ secundæ. & significabitur caractere, *FO.r2.*

23. Et generaliter, si super basi concipiatur figura, extensa non nisi per ordinatas in quadrato: & in qua, vnaquælibet ordinata, est assumpta quædam in tabula proportionalium: dicetur, Forma omnes tales proportionales. aptoque significabitur caractere. vt Forma omnes abscissæ tertix, *FO.a3*: Forma omnes biprimæ, *FO.a2r*: Forma omnes vnifecundæ, *FO.a2*: Forma omnes residuæ tertix, *FO.r3*. & sic deinceps.

24. Itaque ad instar tabulæ proportionalium, & specierum, alia tabula ordinabitur formarum, quæ dicetur, Formosa.

25. Quod si vna quælibet ordinata in forma, est assumpta quædam in tabula nominum: dicetur, Forma omnes totuplæ tales proportionales, aptoque significabitur caractere. vt, Forma omnes duplæ vniprimæ, *FO. 2ar*. Forma omnes triplæ biprimæ, *FO. 3ar*. Forma omnes triplæ vnifecundæ, *FO. 3ar2*. & sic deinceps.

26. Ideoque ad instar tabulæ nominum, & subquadratricum, alia tabula ordinabitur, quæ dicetur, Tabula subquadraturarum.

27. In qua digestæ formæ, dicentur, Subquadraturæ.

28. Item ad instar tabulæ quadratricum, alia tabula ordinabitur, quæ dicetur, Tabula Quadraturarum.

29. In qua digestæ formæ, dicentur, Quadraturæ.

30. Denique si vnaquælibet ordinata, in forma, est assumptæ proportionalis multipla, vel submultipla, vel multiplæ submultipla: dicetur, Forma omnes totuplæ tales proportionales, vel subtotuplæ, vel totuplarum subtotuplæ. aptisque significabitur caracteribus. vt Forma omnes quintuplæ bitertiæ, *FO. 5ar3*: & Forma omnes biprimæ subtriplæ, *FO. ar(3)*: & Forma omnes quadruplæ triquartæ subseptulæ, *FO. 4ar4(7)*. & sic deinceps.

31. Si basis diuisa fuerit in partes æquales; ductæque fuerint per extrema & media diuisionum puncta parallelæ ordinatæ in forma; & super partibus basis æqualibus, inter parallelas completa fuerint parallelogramma maxima intra formam iacentia: figura ex parallelogrammis composita, dicetur, Inscripta formæ.

32. Quod si completa fuerint parallel ogramma minima formam includentia: figura ex parallel ogrammis composita, dicitur, *Circumscripta formæ*.

33. Figura vero ex tot parallelogrammis, quot sunt ordinatæ per puncta divisionum, & ad ipsas ordinatas iacentibus composita, dicitur, *Adscripta formæ*.

34. *Speciosa, & Formosa* tabulis congruentibus, *Massæ, & Formæ*, quarum in utriusque sunt eedem appellationes, & iidem characteres, dicentur inuicem *Homonymæ*.

35. Item *Homonymarum æquemultiplices*, dicentur *Homonymæ*.

36. Ideoque etiam in duabus subquadraticum, & subquadraturarum, aut quadraticum, & quadraturarum tabulis, *Massæ, & Formæ*, dicentur *Homonymæ*.



Theor. I. Prop. I.

TAbulæ formosæ primi lateris, in tertia, quarta, & reliquis deinceps formis, in singulis ordinatæ, pro maioribus abscissis, sunt maiores; & pro maxima abscissarum, est maxima, & ipsi basi æqualis: item vltimi lateris in formis, pro maioribus residuis, sunt maiores; & pro maxima residuarum, est maxima, & ipsi basi æqualis.

Hypoth.



Esto basis AR : in qua finis abscissarum, A ; finis residuarum, R . & sint abscissæ, AB minor, AC maior, AR maxima; & residuæ, RC minor, AB maior, RA maxima: & esto in primo latere tabulæ formosæ, tertia $FO.12$; & in vltimo, tertia $FO.2$.

Dico in $FO.12$, ordinatam per C , maiorem esse ordinatam per B : & per R , maximam esse ordinatarum, & æqualem ipsi AR .

Item in $FO.2$, ordinatam per B , maiorem esse ordinatam per C : & per A , maximam esse ordinatarum, & æqualem ipsi RA .

Demonstr.

def. 206 Basis RA , ad ordinatam per B , duplicatam, habet rationem eius, quàm habet ad AB : & ad ordinatam per C , duplicatam eius, quàm habet ad AC :

4. 3.

AC: & ad ordinatam per *R*, duplicatam æqualitatis, quàm habet ad *AR*. Sed *RA* ad *AB*, maior est, quàm vt ad *AC*: & ad *AC*, maior, quàm vt æqualis ad *AR*. Ergo ad ordinatam per *B*, maior est, quàm vt ad ordinatam per *C*: & ad ordinatam per *C*, maior, quàm vt ad ordinatam per *R*. Ergo ordinata per *B*, minor est, quàm quæ per *C*: & vtralibet per *B*, & per *C*, minor, quàm quæ per *R*: & ordinata per *R*, est maxima; ad quàm *RA* duplicatam habet rationem æqualitatis, nempe eandem habet æqualitatis rationem: ergo per *R* ordinata, est ipsi *AR* æqualis. Quæ &c.

Simili prorsus demonstratione ostendetur, quòd in *FO. r2*, ordinata per *B*, maior est, quàm quæ per *C*: & vtralibet per *B*, & per *C*, minor, quàm quæ per *A*: & per *A* ordinata est maxima, & ipsi *AR* æqualis. Quæ &c.
Quare &c.

Theor. 2. Prop. 2.

IN singulis formosæ tabule, non primi, nec ultimi lateris formis, ordinatarum maxima, minor est, quàm tota: & facit abscissam, & residuam, proportionales, vt numeri, à quibus ipsa forma denominatur: reliquarum verò ex vtralibet parte, propior maximæ remotiore maior est.

Hypoth.

Esto basis AR ; in qua, finis abscissarum, A ; finis residuarum R : & esto in tabula formosa, non in primo, nec in ultimo latere, forma omnes bitertia, quàm denominant numeri 2, 3, cuius character, $FO. a2r3$. & diuidatur AR in B , vt abscissa AB , ad residuam BR sit proportionalis, sicut 2 ad 3: sumanturque alie abscissæ minores, quàm BA , nempe DA , CA : & alie residuæ minores, quàm BR , nempe ER , FR .


Dico in $FO. a2r3$, ordinatam per B minorem esse, quàm AR ; & ordinatarum esse maximam: & ordinatam per D , maiorem esse, quàm quæ per C : & ordinatam per E , maiorem, quàm quæ per F .

Demonstr.

6. p. | Rationalis u , ad $a2r3$, rationem habet compo-
 def. 8. p. | sitam ex rationibus, u ad $a2$, & u ad $r3$: id est
 compositam ex duplicata u ad a , & ex triplicata
 u ad r . Est autem AR ad AB , vt u ad a : & AR
 ad BR , vt u ad r : & ad ordinatam per B , est vt
 u ad $a2r3$. Ergo AR . ad ordinatam per B , ha-
 bet rationem compositam ex rationibus, duplica-
 ta AR ad AB , atque triplicata AR ad RB . Sed
 AR ad AB , & AR ad RB , sunt maioris inequa-
 litatis

litatis rationes, quæ tùm multiplicatæ, tùm compositæ, faciunt maioris inæqualitatis rationem. Quare AR maior est, quàm ordinata per B . Quod &c.

Simili prorsus demonstratione ostendetur, quod ordinata per D ad AR , habet rationem compositam ex duplicata AD ad AR , & ex triplicata DR ad AR . Ergo ex æquali, ordinata per D ad ordinatam per B , rationem habet compositam, ex duplicata DA ad AB , & ex triplicata DR ad RB . Sunt autem DA , AB , BR , RD , quatuor arithmetice dispositæ, quarum secunda AB ad tertiam BR est vt 2 ad 3. Ergo duplicata ratio DA ad AB minor est, quàm triplicata BR ad RD . Habet autem secunda potestas DA ad secundam AB duplicatam rationem eius, quàm habet DA ad AB : & tertia potestas BR ad tertiam RD triplicatam BR ad RD . Ergo secunda potestas DA ad secundam AB minor est, quàm vt tertia potestas BR ad tertiam RD : ergo productus sub secunda potestate AD , & sub tertia DR , minor est producto, sub secunda AB , & sub tertia BR . Sed productus sub secunda potestate AD , & sub tertia DR , ad productum sub secunda AB , & sub tertia BR , compositam habet ex rationibus secundæ potestatis AD ad secundam AB , & tertiæ DR ad tertiam BR : nempe compositam ex duplicata AD ad AB , & triplicata DR ad RB :



RB : nempe eandem quàm ordinata per D ad ordinatam per B . Ergo ordinata per D , minor est quàm ordinata per B . Similiter ostendetur, quòd & ordinatae per E , per C , per F , singulae sunt minores, quàm ordinata per B . Ergo ordinata per B est maxima. Quod &c.

Simili prorsus demonstratione ostendetur, quod ordinata per C ad ordinatam per D , est vt productus sub secunda potestate AC , & sub tertia CR , ad productum sub secunda AD , & sub tertia DR : & quod rationem habet compositam ex rationibus, duplicata CA ad AD , & triplicata CR ad RD . Sunt autem DA , AC , CR , RD , quatuor arithmetice dispositae quarum DA maior est, quàm AC ; & sunt duo numeri 2 ad 3, vt AB ad BR , maiorem scilicet rationem habentes, quàm AD ad DR . Ergo maior est DA ad AC duplicata ratio, quàm CR ad RD triplicata: & è conuerso minor est CA ad AD duplicata, quàm DR ad RC triplicata: & minor est secunda potestas CA ad secundam AD , quàm vt potestas tertia DR ad tertiam RC : & minor est productus sub secunda potestate AC , & sub tertia CR , quàm sub secunda potestate AD , & sub tertia DR : & minor

107. 5.
2. 3.
3. p.
91. 5.


minor est ordinata per C , quàm ordinata per D . Similiter ostendetur, quòd ordinata per F , minor est, quàm ordinata per E . Quod &c. Γ

Quare &c.

Probl. I. Prop. 3.

Formæ propositæ, in data basi, per datum punctum, ordinatam inuenire.

Hypoth.




Esto proposita $FO.10a2r3$, super data basi AR , in qua datum punctum B .

Oportet per B ordinatam inuenire.

Constr.

Data AR , datisque AB , BR , inueniatur recta BC , ad quàm AR , rationem habet compositam ex datis rationibus, AR ad AB duplicata, AR ad BR triplicata, & ex ratione subdecupla: & collocetur BC perpendiculariter ad AR .

Dico BC , esse ordinatam per B , in $FO.10a2r3$.



Demonstr.

Ratio AR ad BC , componitur ex rationibus AR ad AB duplicata, AR ad BR triplicata, & ex subdecupla: sed AR , est u ; AB , est a ; BR , est r : Ergo AR ad BC ratio, componitur ex rationibus u ad a duplicata, u ad r triplicata, & ex subdecupla: sed ex iisdem componitur u ad $10a2r3$: ergo AR ad BC est u ad $10a2r3$: Sed AR est u : ergo BC , est $10a2r3$: ergo BC est ordinata per B , in $FO.10a2r3$. Quod &c.


Quare &c.

Probl. 2. Prop. 4.

SVper data basi propositæ formæ primi vel ultimi lateris, per datum numerum diuisa in partes æquales, tres figuras ex parallelogrammis describere, inscriptam, circumscriptam, & adscriptam: & ostendere, quod inscripta & adscripta sunt æquales: & quod circumscripta excedit inscriptam quantitate reſtanguuli sub maxima ordinata, & sub vna æqualium basis partium.

Hy-

Hypoth.




Esto propositæ formæ data basis AB , diuisa in datas partes æquales AC, CD, DB .

Oportet describere inscriptam, circumscriptam, & adscriptam.

Constr.

- p. h. | Assumatur alterum extremorum A, B , nempe
- 3. h. | B , per quod ordinata est maxima: & inueniantur ordinatæ per data puncta C, D, B , rectæ CE, DF, BG : & compleantur parallelogramma ED, FB, AE, CF, DG .

Dico inscriptam esse ex DE, BF : circumscriptam, ex AE, CF, DG : adscriptam, ex AE, CF , vel ex DE, BF : & adscriptam inscriptæ æqualem esse: & circumscriptam excedere inscriptam quantitate rectanguli DG .



Demonstr.

p. h. Ordinatarum per omnia BD puncta, maxima est per B , minima per D : ergo parallelogrammorum inter ordinatas per D , & B , intra propositam formam iacentium, maximum est BF ; & includentium formam, minimum est DG : excedit autem DG , ipsum FB , spatio FG . Similiter ostenditur, parallelogrammum inter ordinatas per C , & D , infra propositam formam iacentium, maximum esse DE ; & includentium formam, minimum esse CF : excedit autem CF , ipsum DE , spatio EF . Item quoniam CE , maxima est ordinatarum per omnia AC puncta; per A verò nulla est ordinata: ergo parallelogrammorum, inter ordinatam per C , & eius parallelam per A , includentium formam, minimum est AE ; nullum verò est, intra formam iacentium. Ergo inscripta est,

def. 31b

ex

def. 33b

ex DE, BF composita: & circumscripta, ex AE, EF, DG composita: & excedit circumscripta inscriptam spatio ex AE, EF, FG parallelogrammis composito. Sed ex AE, EF, FG compositum spatium parallelogrammo DG est æquale. ergo excedit circumscripta inscriptam quantitate DG . Et quoniam CE, DF , sunt ordinatæ per divisionem puncta C, D quibus totidem adiacent parallelogramma, vel AE, CF , vel DE, BF . Ergo adscripta est ex DE, BF , vel ex AE, CF . sunt autem AE, CF , ipsis DE, BF æqualia, ex quibus componitur inscripta. Ergo adscripta est æqualis inscriptæ. Quæ &c.


Quare &c.

Probl. 3. Prop. 1.

SVper data basi propositæ formæ non primi neque ultimi lateris, per datum numerum diuisa in partes æquales; tres figuras ex parallelogrammis describere, inscriptam, circumscriptam, & adscriptam: & ostendere, quod circumscripta excedit adscriptam, quantitate rectanguli sub maxima ordinatarum, & sub vna æqualium basis partium: & quod adscripta excedit inscriptam, non maiori quantitate.

Hypoth.

Esto propositæ formæ data basis AB , diuisa in datas partes æquales AC, CD, DE, EF, FB : & esto A , finis abscissarum; & B , finis residuarum. Opor-



Oportet describere inscriptam, circumscriptam, & adscriptam.

Costr.

Assumantur numeri denominantes formam propositam, secundum quos diuidatur AB in partes proportionales in G , ut abscissa AG , ad residuam GB , sic se habeat, sicut denominantium numerorum prior ad posteriorem. Constat per G punctum, esse maximam ordinatam. Inueniantur per C, D, E, G, F , ordinatæ CH, DI, EK, GL, FM ; & esto MF , minor, quàm EK : & compleantur parallelogramma $AH, CI, DK, ELF, MB, HD, IE, EM, KF$.

Dico inscriptam esse ex HD, IE, EM : circumscriptam ex AH, CI, DK, ELF, MB : adscriptam ex AH, CI, DK, EM , vel ex HD, IE, KF, MB : & circumscriptam excedere adscriptam, quantitate rectanguli ELF : & adscriptam excedere inscriptam non maiori, quàm rectanguli ELF quantitate.

Demonstr.

Ordinarum per omnia BF puncta, maxima est per F , nulla per B : ergo inter ordinatam per F , & parallelam per B , minimum parallelogrammorum includentium formam est MB , ideoque ad circumscriptam pertinens figuram: nullum verò est intra formam iacentium. Item ordinarum per omnia EF puncta maxima est per G ; & per F , minor, quàm quæ per E , est minima: & inter ordinatas EK, FM minimum parallelogrammorum includentium formam, est ELF , & intra formam iacentium maximum EM ; ideoque ad circumscriptam pertinet ELF ; ad inscriptam verò EM . Similiter ostendetur, quod DK, CI, AH pertinent ad circumscriptam; & HD, IE ad inscriptam. Quare inscripta est ex HD, IE, EM : & circumscripta AH, CI, DK, ELF, MB . Et quoniam CH, DI, EK, FM sunt ordinatæ, quibus adjacent parallelogramma AH, CI, DK, EM , vel HD, IE, KF, MB : manifestum est adscriptam ex AH, CI, DK, EM , vel ex HD, IE, KF, MB compositam esse. Excedit autem circumscripta adscriptam spatij, AH, HI, IK , & excelsu ELF , supra KF ; vel spatij KLM, MB : quæ utralibet sunt æqualia vni rectangulo ELF : excedit ergo circumscripta adscriptam, quantitate rectanguli ELF . Adscripta vero excedit inscriptam spa-

spatijs AH, HI, IK ; vel spatijs KM, MB : quæ vtralibet non maiora sunt rectangulo ELF : excedit ergo adscripta inscriptam, non maiori quantitate, quàm sit ELF : Quæ &c. Quare &c.

Probl. 4. Prop. 6.

Inuenire numerum, per quem propositæ formæ data basis diuidatur, vt circumscripta, & inscripta sint propiores æqualitati, quàm in data ratione inæqualitatis.

Hypoth.

1. Est data basis B , dataque ratio maioris inæqualitatis c ad d .

2. Oportet numerum inuenire, per quem cum diuisa fuerit B , & figuræ circumscripta & inscripta descriptæ fuerint, circumscripta ad inscriptam, minor sit, quàm vt c ad d .

Constr.

| | |
|-------|--|
| 5. b. | Assumatur quilibet numerus, per quem diuidatur B : & inscripta describatur figura E : & inueniatur quantitas F , ad quàm E , maior est, |
| 2. b. | quàm vt c ad $c---d$. Assignetur etiam, in ipsa B , |
| 3. b. | punctum: per quod maxima ordinarum inueniatur G : & ad G applicetur quantitas F , vt fiat latitudo H : & sumatur ipsius H multiplex L , maior quàm dupla B : & quotuplex est L ad H , totus numerus esto M . |

Dico M , esse numerum, per quem, cum diuisa fuerit B ; & figuræ circumscripta, & inscripta, fuerint descriptæ:

cir-

circumscripta ad inscriptam minor est, quàm vt c ad d .

Præpar.

5. h. Quotus est M , tota pars ipsius B accipiatur
 N . & diuisa basi per numerum M , sit inscripta
 figura Q , circumscripta R , adscripta S .

Demonstr.

2. p. Quoniam B ad N ; est vt M ad vnitatem, vel
 vt L ad H : permutando B ad L , est vt N ad
 P. P. H : & $2B$ ad L , vt $2N$ ad H . Sed $2B$, minor
 est, quàm L : ergo $2N$, minor est, quàm H : er-
 go $2GN$ rectangulum, minus est rectangulo GH .
 sed rectangulum GH , est æquale ipsi spatio F : er-
 go $2GN$, minus est, quàm F . Et est E ad $2GN$,
 ratio maior, quàm E ad F . Sed E ad F ratio,
 maior est, quàm c ad $c---d$: ergo E ad $2GN$
 ratio, maior est, quàm c ad $c---d$. Est autem R , ma-
 ior, quàm E : ergo R ad $2GN$ ratio, maior est,
 5. h. quàm c ad $c---d$. Est autem $R---S$, æqualis ipsi
 GN : & $S---Q$, non maior est, quàm $2GN$: er-
 go R ad $R---Q$, maior est, quàm c ad $c---d$:
 3. 3. ergo, per conuersionem rationis, R ad Q , mi-
 nor est, quàm vt c ad d . Ergo M est numerus
 per quem &c. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 3. Prop. 7.

Adscripta, & forma, sunt quasi æquales.

C c c

De-

Demonstr.


6. b. | Nam data qualibet inæqualitatis ratione, pos-
 5. b. | sunt inueniri, circumscripta formæ, & inscripta,
 67. 5. | propiores æqualitati: est autem vtralibet adscripta,
 def. 3. 3. | & forma, minor, quàm circumscripta, & maior,
 | quàm inscripta: ergo potest inueniri adscripta ad
 | formam propior æqualitati, quàm in data qualibet
 | inæqualitatis ratione. Quare adscripta, & forma,
 | sunt quasi æquales.

Theor. 4. Prop. 8.

Adscripta cuiusque formæ, ad formam in vertice for-
 mosa tabulæ, est vt à radice numero partium basis,
 massa homonyma, ad totam vnitatem plus ordinatâ, quàm
 sit basis tabulæ speciosæ, ad quam pertinet massa.

Hypoth.

def. 12. b. | Sunt duæ formæ, vna in vertice formosæ
 | $FO.u$, quæ est quadratum AB ; altera $FQ.1042r3$,
 | super eadem basi AR ; in qua finis abscissarum A ;
 | finis residuarum R . Et esto AR diuisa in partes
 | æquales, mediâibus pûctis D, E, F, G, H, I ; per quæ
 | ordinatæ sunt, in altera forma, rectæ $DK, EL, FM,$
 | GN, HO, IP ; & in quadrato, sint $DQ, ER, FS,$
 | GT, HX, IY . & sint $AK, DL, EM, FN, GO,$
 | HP parallelogramma, ex quibus componitur ad-
 | scripta, quæ vocetur S : & $AQ, DR, ES, FT,$
 | GX, HY, IB parallelogramma æqualia, in quæ di-
 | uiditur



uiditur quadratum AB . Assumatur etiam numerus t , partium æqualium ipsius AR : & à radice t , massa $O.10a2r3$, quæ ad quintam basim pertinet speciosæ tabulæ: sumaturque ab eadem radice t , tota sexta 16 .

Dico: AB ad S , esse vt 16 ad $O.10a2r3$, à radice t .

Demonstr.

Quoniam AR ad DK , rationem habet compositam, ex duplicata AR ad AD , & ex triplicata AR ad RD , & ex subdecupla: videlicet pro abscissa vnitare a , compositam ex 12 ad $a2$, & ex 13 ad $r3$, & ex subdecupla: idest,

Ccc 2

eamdem,

eandem, quàm t_5 ad $10a2r3$, pro abscissa vnitare. sed AQ ad AK , est vt AR ad DK : ergo AQ ad AK , est vt t_5 ad $10a2r3$, pro abscissa vnitare. Similiter DR ad DL , est vt t_5 ad $10a2r3$ pro abscisso binario: necnon similiter pro reliquis abscissis numeris. Sunt autem tot parallelogramma componentia ascriptam S , quot ordinatæ per puncta D, E, F, G, H, I ; totidemque, quot ipsa puncta: & vnitare pauciores, quàm numerus partium ipsius AR ; nempe totidem, quot sunt eiusdem numeri t abscissiones, & abscissæ. Ergo per homologiam, æquemultiplicato vtrimque antecedente per t , collectisque consequentibus, quadratum AB , ad adscriptam S , est vt t , ad $O.10a2r3$. Quod &c.

Quare &c.

Theor. 5. Prop. 9.

Forma omnes multiplæ, ad formam omnes simplas eandem proportionales, super eadem basi iacentem, est æquemultiplica.

Hypoth.

Esto A forma omnes duplæ: & esto B forma omnes simplæ eandem proportionales, super communi basi iacentes.

Dico A ad B duplam esse.

Demonstr.

Diuisa enim communi basi, per quemlibet numero def. 30 b | merum, in partes æquales, ordinate per puncta diuisio-

uisionum in A , duplæ sunt ordinarum per eadem puncta in B , singulæ singularum: & adiacentia parallelogramma, quæ adscriptas componunt, dupla sunt singula singulorum; & simul omnia simul omnium: & adscripta A , adscriptæ B est dupla: sed adscripta B quasi est æqualis ad suam formam B : ergo adscripta A , quasi est dupla formæ B : sed forma A quasi est æqualis adscriptæ A : & sunt formæ A , B , quantitates determinatæ. Ergo A ad B est dupla. Quod &c. Quare &c.

Theor. 6. Prop. 10.

OMnes quadraturæ super eadem basi constitutæ, sunt inter se æquales.

Demonstr.

8. b. Nam adscripta cuiuslibet quadraturæ, ad formam in vertice formosæ tabulæ iacentem, est ut quadratrix homonyma, ad totam unitate plus ordinatam, quàm in qua basi est quadratrix in sua tabulâ: sed quadratrix ad huiusmodi totam, quasi est æqualis: ergo adscripta quadraturæ, ad formam in vertice formosæ iacentem, quasi est æqualis: sed & ad suam quadraturam quasi est æqualis: ergo quadratura ad formam in vertice formosæ iacentem, est æqualis. Quare omnes quadraturæ, cum eadem determinatæ formæ sint æquales, inter se sunt æquales.

Theor. 7. Prop. 11.

IN vna quasque basi tabulæ subquadraturarum, subquadraturæ sunt æquales: & simul omnes, componunt quantitatem formæ, in vertice formosæ tabulæ iacentis.

Demonstr.

def. 28b

9. h.

10. b.

Nam in vnaquaque basi tabulæ subquadraturarum, quadraturæ sunt æquemul tiplæ. Sed æquales, ipsæ sunt inter se quadraturæ: ergo æquales etiam sunt inter se subquadraturæ.

10. b.

Deinde in vnaquaque basi tabulæ subquadraturarum, quotupla est quadratura vna vnus, tot sunt subquadraturæ: atque totupla est summa omnium subquadraturarum, ad vnâ tantum. quare summa omnium subquadraturarum, vni quadraturæ est æqualis: sed vnaquælibet quadratura æqualis est formæ in vertice formosæ tabulæ iacenti. Quare in vnaquaque basi tabulæ subquadraturarum, summa omnium, æqualis est vni formæ, in vertice formosæ tabulæ iacenti.

Porro in Tabula Formosa, in ipsius formis; præter ea, que in epistola ad Excellentissimum Casinum commemorauit ex meo libello Nouarum Quadraturarum aliâ inueni duo, que hîc pro coronide recensebo: aliâs publicanda cum demonstratione, si Deus otium, & vltiorem fortunam concesserit.

Vnum de mixtilineis angulis, & de cornibus formarum; & de angulorum quantitibus, videlicet.

Secundæ basis secunda & penultima forma, est binangula, cuius angulorum sinus rectus duplus versi. tertiæ verò, & quartæ, ac reliquarum deinceps omnium basium formæ, prima & vltima, secunda & penultima, sunt vnicornes, & vnangulæ; quarum sinus rectus angulorum, ad versum totuplus est, quotus est ordo basis: in tertia, triplus; in quarta, quadruplus; in quinta quintuplus, & sic deinceps. reliquæ demum formæ omnes, sunt bicornes. ②

Alterū de centrīs grauitatum bipartitum. cuius prima pars est.

Cuiusque formæ in tabula formosa, recta linea per centrum grauitatis ordinata, facit partes basis reciprocè proportionales, abscissam ad residuam; sicut eius ordinum numeri in sua basi à prima, & ab vltima. Exempli gratia. Formæ in quarta basi, secundæ tritultimæ per centrum ordinata, facit partes basis, abscissam ad residuam proportionales, vt 3 ad 2, ordo tritultimæ ad ordinem secundæ.

Secunda pars est. In vnaquaque forma, linea ex centro grauitatis ducta ordinatam ad basim, à basi, & centro finita, dicetur, Altitudo centralis. Itaque formarum in tabula formosa, centrales altitudines habent reciprocam rationem compositam ex rationibus numerorum, qui quadraturas ex formis producant; ex directâ iacentium in iisdem basibus, & lateribus tabulæ quadraturarum, & ex conuersa iacentium in basibus duplordinatis, & in lateribus vnitatis minùs, quàm duplordinatis. Exempli gratia. Centralis altitudo $FO.472$. formæ in sexta basi tertiæ quintultimæ, ad centram altitudinem $FO.4376$, formæ in nona basi

basi septimæ quartultimæ, rationem habet compositam ex rationibus numerorum quadraturas producentium ex formis; ex ratione, inquam, 105, tertij quintultimi in sexta basi, ad 840, septimum quartultimum in nona basi; & ex ratione 352716, tredecimi septimultimi in decima octava basi, ad 6435, quintum nonultimum in duodecima basi.

Vel aliter. Altitudines centrales formarum in tabula formosa iacentium, rationem habent compositam, cum ex ratione earundem formarum conuersa, tum etiam ex directâ aliarum in eadem tabula in basibus duplordinatis, & in lateribus unitate minùs quàm duplordinatis. Exempli

gratia. Centralis altitudo $FO.442$, ad centram

$FO.436$, rationem habet compositam, ex

rationibus, $FO.436$, ad $FO.442$; &

$FO.484$, ad $FO.4612$.



DEO GRATIAS.

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11